# Barra do Turvo — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC 294 • 76 meses medidos (2018-08 a 2026-10)

**Atenção à série curta:** apenas 4 anos com os 12 meses fechados — referência do período medido, não padrão consolidado.

**Leia antes de usar:** os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

**Aplicação prática:** este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, as janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

| Chuva anual média | Mês mais chuvoso | Mês mais seco |
|---|---|---|
| **1.377 mm/ano** | **166 mm** | **49 mm** |
| em todo o ano | em janeiro | em julho |

| Temperatura média | Mês mais quente | Mês mais frio |
|---|---|---|
| **21,4 °C** | **27,2 °C** | **17,0 °C** |
| média dos 12 meses | em março | em julho |

**Tabela 1: Chuva média por mês do ano**

| mês | chuva (mm) | perfil | t mín | t méd | t máx |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 166 | | 16,0 | 20,4 | 24,9 |
| fevereiro | 157 | | 18,1 | 23,4 | 28,7 |
| março | 127 | | 21,2 | 27,2 | 33,2 |
| abril | 80 | | 19,1 | 24,7 | 30,4 |
| maio | 60 | | 16,4 | 22,1 | 27,8 |
| junho | 71 | | 14,6 | 20,0 | 25,4 |
| julho | 49 | | 9,1 | 17,0 | 24,8 |
| agosto | 71 | | 14,4 | 20,5 | 26,5 |
| setembro | 90 | | 14,3 | 19,0 | 21,0 |
| outubro | 156 | | 15,9 | 18,4 | 21,0 |
| novembro | 122 | | 19,7 | 20,9 | 22,1 |
| dezembro | 151 | | 21,8 | 22,6 | 23,4 |
| ano | 1.377 | | | 21,4 | |

**Tabela 2: Chuva por estação do ano**

| estação | meses | total (mm) | % do ano | média/mês | maior mês | menor mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verão | dez–fev | 475 | 34% | 158 | 166 (jan) | 151 (dez) |
| Outono | mar–mai | 267 | 19% | 89 | 127 (mar) | 60 (mai) |
| Inverno | jun–ago | 191 | 14% | 64 | 71 (ago) | 49 (jul) |
| Primavera | set–nov | 368 | 27% | 123 | 156 (out) | 90 (set) |

**Antes dos solstícios** (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 591 mm (43% do ano) • verão: junho a novembro somam 559 mm (41% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

### Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 49 e 90 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 475 mm, 34% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: março tem a maior média (27,2 °C) e julho a menor (17,0 °C, com mínima média de 9,1 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

### Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal medida; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#barra-do-turvo`. Umidade relativa omitida: a fonte usa `0` para "sem sensor". médias do período 2018–2026 (6.3 anos de dado). 1 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 1); o banco as preserva. Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.