# Pariquera-Açu 2 — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC 299 • 97 meses medidos (2018-08 a 2026-10)

**Atenção à série curta:** apenas 5 anos com os 12 meses fechados — referência do período medido, não padrão consolidado.

**Leia antes de usar:** os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

**Aplicação prática:** este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, as janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

| Chuva anual média | Mês mais chuvoso | Mês mais seco |
|---|---|---|
| **1.520 mm/ano** | **256 mm** | **38 mm** |
| em todo o ano | em janeiro | em julho |

| Temperatura média | Mês mais quente | Mês mais frio |
|---|---|---|
| **23,5 °C** | **27,7 °C** | **19,0 °C** |
| média dos 12 meses | em janeiro | em julho |

**Tabela 1: Chuva média por mês do ano**

| mês | chuva (mm) | perfil | t mín | t méd | t máx |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 256 | | 21,6 | 27,7 | 33,7 |
| fevereiro | 249 | | 21,7 | 27,5 | 33,4 |
| março | 184 | | 21,0 | 26,9 | 32,8 |
| abril | 72 | | 18,4 | 24,4 | 30,3 |
| maio | 96 | | 15,7 | 21,7 | 27,7 |
| junho | 71 | | 14,2 | 20,1 | 25,9 |
| julho | 38 | | 12,8 | 19,0 | 25,3 |
| agosto | 64 | | 13,9 | 19,7 | 25,5 |
| setembro | 67 | | 16,5 | 21,6 | 26,7 |
| outubro | 105 | | 18,3 | 22,7 | 27,1 |
| novembro | 107 | | 18,7 | 24,2 | 29,8 |
| dezembro | 162 | | 20,6 | 26,5 | 32,3 |
| ano | 1.520 | | | 23,5 | |

**Tabela 2: Chuva por estação do ano**

| estação | meses | total (mm) | % do ano | média/mês | maior mês | menor mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verão | dez–fev | 667 | 44% | 222 | 256 (jan) | 162 (dez) |
| Outono | mar–mai | 352 | 23% | 117 | 184 (mar) | 72 (abr) |
| Inverno | jun–ago | 174 | 11% | 58 | 71 (jun) | 38 (jul) |
| Primavera | set–nov | 279 | 18% | 93 | 107 (nov) | 67 (set) |

**Antes dos solstícios** (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 857 mm (56% do ano) • verão: junho a novembro somam 453 mm (30% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

### Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 38 e 96 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de dezembro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 667 mm, 44% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (256 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: janeiro tem a maior média (27,7 °C) e julho a menor (19,0 °C, com mínima média de 12,8 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

### Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal medida; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#pariquera-acu-2`. Umidade relativa omitida: a fonte usa `0` para "sem sensor". médias do período 2018–2026 (8.1 anos de dado). 2 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 1, tmax 1); o banco as preserva. Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.