Sete Barras — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC 80 • 320 meses medidos (2000-03 a 2026-10)

25 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, as janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.511 mm/ano	**266 mm**	**56 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
23,2 °C	**27,2 °C**	**19,0 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	266		21,6	26,7	31,9
fevereiro	168		21,8	27,2	32,6
março	168		21,0	26,1	31,2
abril	95		19,4	24,4	29,3
maio	86		16,3	21,2	26,1
junho	75		15,1	19,8	24,6
julho	84		13,9	19,0	24,1
agosto	56		14,8	19,9	25,0
setembro	104		16,6	21,2	25,8
outubro	138		18,4	22,8	27,3
novembro	128		19,3	24,3	29,4
dezembro	161		20,8	26,1	31,4
ano	1.511			23,2	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	595	39%	198	266 (jan)	161 (dez)
Outono	mar–mai	350	23%	117	168 (mar)	86 (mai)
Inverno	jun–ago	215	14%	72	84 (jul)	56 (ago)
Primavera	set–nov	371	25%	124	138 (out)	104 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 784 mm (52% do ano) • verão: junho a novembro somam 585 mm (39% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho e agosto a chuva média fica entre 56 e 95 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 595 mm, 39% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (266 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (27,2 °C) e julho a menor (19,0 °C, com mínima média de 13,9 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal medida; chuva é o total do mês. Painel: climalitoralsul.netlify.app/#sete-barras. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". médias do período 2000–2026 (26.7 anos de dado; parte da série não validada). Gerado a partir de dados.json de 2026-10-30.