Apiaí — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:117 • 189 meses (2011-01 a 2026-10)

14 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.510 mm/ano	**206 mm**	**64 mm**
em todo o ano	em janeiro	em julho

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
18,8 °C	**22,6 °C**	**14,5 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	206		17,4	22,5	27,5
fevereiro	154		17,5	22,6	27,7
março	149		16,6	21,5	26,4
abril	81		14,6	19,7	24,8
maio	85		11,6	16,8	22,0
junho	110		9,6	14,9	20,3
julho	64		8,5	14,5	20,6
agosto	77		9,8	15,6	21,4
setembro	110		12,1	17,6	23,1
outubro	170		14,0	18,7	23,5
novembro	138		14,8	19,6	24,5
dezembro	168		16,7	21,8	26,8
ano	1.510			18,8	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	528	35%	176	206 (jan)	154 (fev)
Outono	mar–mai	315	21%	105	149 (mar)	81 (abr)
Inverno	jun–ago	250	17%	83	110 (jun)	64 (jul)
Primavera	set–nov	418	28%	139	170 (out)	110 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 675 mm (45% do ano) • verão: junho a novembro somam 668 mm (44% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em julho e agosto a chuva média fica entre 64 e 77 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência. Como até o mês mais seco passa de 60 mm, o solo raramente seca: a janela vale para entrar com máquina, não para preparo em solo seco.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 528 mm, 35% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (206 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (22,6 °C) e julho a menor (14,5 °C, com mínima média de 8,5 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#apiai`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". médias do período 2011–2026 (15.8 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.