Barra do Turvo — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:294 • 76 meses (2018-08 a 2026-10)

Atenção à série curta: apenas 4 anos com os 12 meses fechados — referência do período medido, não padrão consolidado.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.377 mm/ano	**166 mm**	**49 mm**
em todo o ano	em janeiro	em julho

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
21,4 °C	**27,2 °C**	**17,0 °C**
média dos 12 meses	em março	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	166		16,0	20,4	24,9
fevereiro	157		18,1	23,4	28,7
março	127		21,2	27,2	33,2
abril	80		19,1	24,7	30,4
maio	60		16,4	22,1	27,8
junho	71		14,6	20,0	25,4
julho	49		9,1	17,0	24,8
agosto	71		14,4	20,5	26,5
setembro	90		14,3	19,0	21,0
outubro	156		15,9	18,4	21,0
novembro	122		19,7	20,9	22,1
dezembro	151		21,8	22,6	23,4
ano	1.377			21,4	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	475	34%	158	166 (jan)	151 (dez)
Outono	mar–mai	267	19%	89	127 (mar)	60 (mai)
Inverno	jun–ago	191	14%	64	71 (ago)	49 (jul)
Primavera	set–nov	368	27%	123	156 (out)	90 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 591 mm (43% do ano) • verão: junho a novembro somam 559 mm (41% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 49 e 90 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 475 mm, 34% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: março tem a maior média (27,2 °C) e julho a menor (17,0 °C, com mínima média de 9,1 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#barra-do-turvo`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 1 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 1); o banco as preserva. médias do período 2018–2026 (6.3 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.