Cajati — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:120 • 185 meses (2011-02 a 2026-10)

13 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.207 mm/ano	**190 mm**	**47 mm**
em todo o ano	em janeiro	em julho

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
22,6 °C	**26,6 °C**	**18,2 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	190		21,4	26,4	31,5
fevereiro	161		21,5	26,6	31,8
março	145		20,8	25,4	30,1
abril	75		18,7	23,6	28,6
maio	71		15,9	20,7	25,5
junho	83		14,3	18,9	23,5
julho	47		13,1	18,2	23,4
agosto	53		14,0	19,1	24,1
setembro	59		16,1	20,8	25,4
outubro	111		18,0	22,1	26,2
novembro	121		18,8	23,2	27,7
dezembro	131		20,7	25,7	30,6
ano	1.207			22,6	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	482	40%	161	190 (jan)	131 (dez)
Outono	mar–mai	290	24%	97	145 (mar)	71 (mai)
Inverno	jun–ago	183	15%	61	83 (jun)	47 (jul)
Primavera	set–nov	292	24%	97	121 (nov)	59 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 642 mm (53% do ano) • verão: junho a novembro somam 475 mm (39% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 47 e 83 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de novembro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 482 mm, 40% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (26,6 °C) e julho a menor (18,2 °C, com mínima média de 13,1 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#cajati`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". médias do período 2011–2026 (15.4 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.