Cananéia — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:15 • 321 meses (2000-01 a 2026-10)

25 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
2.113 mm/ano	**319 mm**	**79 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
22,0 °C	**26,0 °C**	**18,3 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em junho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	319		20,8	25,2	29,7
fevereiro	284		21,6	26,0	30,5
março	265		20,9	25,1	29,3
abril	203		19,4	23,5	27,7
maio	128		16,3	21,0	25,6
junho	93		14,7	18,3	23,8
julho	91		13,9	18,3	22,8
agosto	79		14,6	18,9	23,2
setembro	111		16,2	19,9	23,7
outubro	151		17,8	21,4	24,9
novembro	167		18,9	22,7	26,5
dezembro	201		20,1	24,3	28,4
ano	2.113			22,0	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	803	38%	268	319 (jan)	201 (dez)
Outono	mar–mai	597	28%	199	265 (mar)	128 (mai)
Inverno	jun–ago	263	12%	88	93 (jun)	79 (ago)
Primavera	set–nov	429	20%	143	167 (nov)	111 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 1.199 mm (57% do ano) • verão: junho a novembro somam 692 mm (33% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em junho, julho e agosto a chuva média fica entre 79 e 93 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência. Como até o mês mais seco passa de 60 mm, o solo raramente seca: a janela vale para entrar com máquina, não para preparo em solo seco.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 803 mm, 38% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (319 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (26,0 °C) e junho a menor (18,3 °C, com mínima média de 13,9 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#cananeia`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 3 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmin 1, tmed 1, tmax 1); o banco as preserva. médias do período 2000–2026 (26.8 anos de dado; parte da série não validada). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.