# Iguape — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:296 • 219 meses (2004-01 a 2026-10)

**17 anos com os 12 meses fechados** — médias do período medido, não previsão do tempo.

**Leia antes de usar:** os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

**Aplicação prática:** este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

| Chuva anual média | Mês mais chuvoso | Mês mais seco |
|---|---|---|
| **1.983 mm/ano** | **273 mm** | **97 mm** |
| em todo o ano | em janeiro | em agosto |

| Temperatura média | Mês mais quente | Mês mais frio |
|---|---|---|
| **22,2 °C** | **26,2 °C** | **18,2 °C** |
| média dos 12 meses | em fevereiro | em julho |

**Tabela 1: Chuva média por mês do ano**

| mês | chuva (mm) | perfil | t mín | t méd | t máx |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 273 | | 21,2 | 25,6 | 30,0 |
| fevereiro | 230 | | 21,3 | 26,2 | 31,1 |
| março | 211 | | 20,7 | 25,2 | 29,7 |
| abril | 157 | | 18,6 | 23,3 | 27,9 |
| maio | 133 | | 15,6 | 20,5 | 25,4 |
| junho | 112 | | 14,2 | 19,1 | 24,0 |
| julho | 124 | | 13,2 | 18,2 | 23,2 |
| agosto | 97 | | 14,1 | 18,9 | 23,6 |
| setembro | 134 | | 15,8 | 20,2 | 24,6 |
| outubro | 171 | | 18,0 | 21,7 | 25,4 |
| novembro | 150 | | 18,8 | 23,0 | 27,1 |
| dezembro | 193 | | 20,3 | 24,8 | 29,4 |
| ano | 1.983 | | | 22,2 | |

**Tabela 2: Chuva por estação do ano**

| estação | meses | total (mm) | % do ano | média/mês | maior mês | menor mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verão | dez–fev | 696 | 35% | 232 | 273 (jan) | 193 (dez) |
| Outono | mar–mai | 500 | 25% | 167 | 211 (mar) | 133 (mai) |
| Inverno | jun–ago | 333 | 17% | 111 | 124 (jul) | 97 (ago) |
| Primavera | set–nov | 455 | 23% | 152 | 171 (out) | 134 (set) |

**Antes dos solstícios** (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 1.004 mm (51% do ano) • verão: junho a novembro somam 788 mm (40% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

### Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em agosto a chuva média fica em 97 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência. Como até o mês mais seco passa de 60 mm, o solo raramente seca: a janela vale para entrar com máquina, não para preparo em solo seco.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de setembro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 696 mm, 35% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (273 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (26,2 °C) e julho a menor (18,2 °C, com mínima média de 13,2 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

### Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#iguape`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 2 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 1, tmax 1); o banco as preserva. médias do período 2004–2026 (18.2 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.