Itaóca — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:116 • 184 meses (2011-01 a 2026-10)

12 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.182 mm/ano	**169 mm**	**47 mm**
em todo o ano	em janeiro	em julho

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
21,9 °C	**26,4 °C**	**17,4 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	169		19,8	26,0	32,2
fevereiro	119		20,1	26,4	32,6
março	112		17,8	23,2	28,6
abril	66		17,0	23,0	29,0
maio	75		13,9	19,6	25,3
junho	86		12,2	17,9	23,5
julho	47		11,5	17,4	23,2
agosto	75		12,3	18,6	24,9
setembro	80		14,6	20,7	26,8
outubro	130		16,2	21,9	27,6
novembro	114		17,1	23,1	29,1
dezembro	127		19,0	25,5	32,0
ano	1.182			21,9	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	414	35%	138	169 (jan)	119 (fev)
Outono	mar–mai	252	21%	84	112 (mar)	66 (abr)
Inverno	jun–ago	207	18%	69	86 (jun)	47 (jul)
Primavera	set–nov	325	27%	108	130 (out)	80 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 540 mm (46% do ano) • verão: junho a novembro somam 532 mm (45% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 47 e 86 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 414 mm, 35% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (26,4 °C) e julho a menor (17,4 °C, com mínima média de 11,5 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#itaoca`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 5 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 2, tmax 2, urmed 1); o banco as preserva. médias do período 2011–2026 (15.3 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.