# Juquiá — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:107 • 158 meses (2008-05 a 2026-10)

**10 anos com os 12 meses fechados** — médias do período medido, não previsão do tempo.

**Leia antes de usar:** os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

**Aplicação prática:** este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

| Chuva anual média | Mês mais chuvoso | Mês mais seco |
|---|---|---|
| **1.686 mm/ano** | **246 mm** | **77 mm** |
| em todo o ano | em janeiro | em maio |

| Temperatura média | Mês mais quente | Mês mais frio |
|---|---|---|
| **22,9 °C** | **27,1 °C** | **18,5 °C** |
| média dos 12 meses | em fevereiro | em julho |

**Tabela 1: Chuva média por mês do ano**

| mês | chuva (mm) | perfil | t mín | t méd | t máx |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 246 | | 20,8 | 26,5 | 32,1 |
| fevereiro | 213 | | 21,4 | 27,1 | 32,7 |
| março | 187 | | 20,6 | 25,9 | 31,2 |
| abril | 111 | | 18,6 | 23,7 | 28,9 |
| maio | 77 | | 15,9 | 21,2 | 26,5 |
| junho | 88 | | 12,6 | 19,1 | 25,6 |
| julho | 80 | | 13,1 | 18,5 | 24,0 |
| agosto | 79 | | 15,0 | 19,9 | 24,8 |
| setembro | 124 | | 16,1 | 21,0 | 25,9 |
| outubro | 154 | | 17,6 | 22,0 | 26,5 |
| novembro | 132 | | 19,1 | 24,0 | 29,0 |
| dezembro | 162 | | 20,2 | 25,8 | 31,4 |
| ano | 1.686 | | | 22,9 | |

**Tabela 2: Chuva por estação do ano**

| estação | meses | total (mm) | % do ano | média/mês | maior mês | menor mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verão | dez–fev | 622 | 37% | 207 | 246 (jan) | 162 (dez) |
| Outono | mar–mai | 374 | 22% | 125 | 187 (mar) | 77 (mai) |
| Inverno | jun–ago | 246 | 15% | 82 | 88 (jun) | 79 (ago) |
| Primavera | set–nov | 410 | 24% | 137 | 154 (out) | 124 (set) |

**Antes dos solstícios** (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 833 mm (49% do ano) • verão: junho a novembro somam 656 mm (39% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

### Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em maio, junho, julho e agosto a chuva média fica entre 77 e 88 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência. Como até o mês mais seco passa de 60 mm, o solo raramente seca: a janela vale para entrar com máquina, não para preparo em solo seco.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de setembro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 622 mm, 37% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (246 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (27,1 °C) e julho a menor (18,5 °C, com mínima média de 12,6 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

### Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#juquia`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 4 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 2, tmax 2); o banco as preserva. médias do período 2008–2026 (13.2 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.