Miracatu — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:43 • 323 meses (1990-01 a 2026-10)

25 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.316 mm/ano	**221 mm**	**47 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
22,8 °C	**26,7 °C**	**18,8 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	221		21,0	26,4	31,8
fevereiro	181		20,8	26,7	32,6
março	141		19,8	25,7	30,3
abril	81		18,4	23,8	29,1
maio	70		15,2	20,7	26,2
junho	64		14,0	19,3	24,7
julho	62		13,1	18,8	24,4
agosto	47		14,0	19,7	25,3
setembro	88		15,9	21,0	26,0
outubro	97		17,6	22,5	27,4
novembro	107		18,5	23,9	29,4
dezembro	151		20,1	25,7	31,3
ano	1.316			22,8	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	552	42%	184	221 (jan)	151 (dez)
Outono	mar–mai	293	22%	98	141 (mar)	70 (mai)
Inverno	jun–ago	173	13%	58	64 (jun)	47 (ago)
Primavera	set–nov	291	22%	97	107 (nov)	88 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 694 mm (53% do ano) • verão: junho a novembro somam 464 mm (35% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro a chuva média fica entre 47 e 97 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de dezembro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 552 mm, 42% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (221 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (26,7 °C) e julho a menor (18,8 °C, com mínima média de 13,1 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#miracatu`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 3 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 2, tmax 1); o banco as preserva. médias do período 1990–2026 (26.9 anos de dado; parte da série não validada). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.