Pedro de Toledo — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:300 • 99 meses (2018-08 a 2026-10)

Atenção à série curta: apenas 7 anos com os 12 meses fechados — referência do período medido, não padrão consolidado.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.240 mm/ano	**219 mm**	**34 mm**
em todo o ano	em janeiro	em julho

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
23,9 °C	**27,9 °C**	**20,2 °C**
média dos 12 meses	em janeiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	219		22,5	27,9	33,4
fevereiro	187		21,8	27,5	33,3
março	163		22,0	27,2	32,4
abril	78		19,3	24,7	30,1
maio	90		15,9	21,9	28,0
junho	63		15,5	21,1	26,7
julho	34		14,2	20,2	26,2
agosto	46		15,5	20,9	26,2
setembro	56		17,6	22,5	27,4
outubro	79		19,2	23,5	27,8
novembro	121		19,6	24,6	29,6
dezembro	129		18,1	25,1	32,6
ano	1.240			23,9	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	535	43%	178	219 (jan)	129 (dez)
Outono	mar–mai	331	27%	110	163 (mar)	78 (abr)
Inverno	jun–ago	143	12%	48	63 (jun)	34 (jul)
Primavera	set–nov	256	21%	85	121 (nov)	56 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 736 mm (59% do ano) • verão: junho a novembro somam 400 mm (32% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro a chuva média fica entre 34 e 90 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de novembro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 535 mm, 43% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (219 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: janeiro tem a maior média (27,9 °C) e julho a menor (20,2 °C, com mínima média de 14,2 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#pedro-de-toledo`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 6 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 3, tmax 3); o banco as preserva. médias do período 2018–2026 (8.2 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.