Registro — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:63 • 379 meses (1994-11 a 2026-10)

29 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.510 mm/ano	**248 mm**	**59 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
22,7 °C	**26,8 °C**	**18,5 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	248		21,9	26,5	31,1
fevereiro	207		22,0	26,8	31,5
março	161		21,3	25,7	30,1
abril	81		19,5	24,0	28,4
maio	82		16,6	20,9	25,3
junho	77		15,1	19,3	23,5
julho	71		14,2	18,5	22,9
agosto	59		14,6	19,2	23,8
setembro	102		16,5	20,7	24,8
outubro	123		18,2	22,1	26,0
novembro	122		19,1	23,5	27,9
dezembro	162		21,0	25,6	30,2
ano	1.510			22,7	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	617	41%	206	248 (jan)	162 (dez)
Outono	mar–mai	324	21%	108	161 (mar)	81 (abr)
Inverno	jun–ago	207	14%	69	77 (jun)	59 (ago)
Primavera	set–nov	347	23%	116	123 (out)	102 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 780 mm (52% do ano) • verão: junho a novembro somam 554 mm (37% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho e agosto a chuva média fica entre 59 e 82 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 617 mm, 41% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (248 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (26,8 °C) e julho a menor (18,5 °C, com mínima média de 14,2 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#registro`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". médias do período 1994–2026 (31.6 anos de dado; parte da série não validada). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.