Iguape — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:296 • 220 meses (2004-01 a 2026-11)

17 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.983 mm/ano	**273 mm**	**97 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
22,2 °C	**26,2 °C**	**18,2 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	273		21,2	25,6	30,0
fevereiro	230		21,3	26,2	31,1
março	211		20,7	25,2	29,7
abril	157		18,6	23,3	27,9
maio	133		15,6	20,5	25,4
junho	112		14,2	19,1	24,0
julho	124		13,2	18,2	23,2
agosto	97		14,1	18,9	23,6
setembro	134		15,8	20,2	24,6
outubro	172		18,0	21,7	25,4
novembro	143		18,9	23,1	27,2
dezembro	193		20,3	24,8	29,4
ano	1.983			22,2	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	696	35%	232	273 (jan)	193 (dez)
Outono	mar–mai	500	25%	167	211 (mar)	133 (mai)
Inverno	jun–ago	333	17%	111	124 (jul)	97 (ago)
Primavera	set–nov	449	23%	150	172 (out)	134 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 1.004 mm (51% do ano) • verão: junho a novembro somam 782 mm (39% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em agosto a chuva média fica em 97 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência. Como até o mês mais seco passa de 60 mm, o solo raramente seca: a janela vale para entrar com máquina, não para preparo em solo seco.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de setembro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 696 mm, 35% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (273 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (26,2 °C) e julho a menor (18,2 °C, com mínima média de 13,2 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#iguape`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 2 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 1, tmax 1); o banco as preserva. médias do período 2004–2026 (18.3 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-11-06.