Iporanga — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:118 • 185 meses (2011-01 a 2026-11)

14 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.470 mm/ano	**187 mm**	**66 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
22,3 °C	**26,2 °C**	**17,7 °C**
média dos 12 meses	em janeiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	187		20,5	26,2	32,0
fevereiro	171		20,4	26,2	28,1
março	147		19,8	25,1	30,4
abril	86		17,8	23,4	28,9
maio	79		15,2	20,4	25,7
junho	104		13,5	18,2	22,9
julho	68		12,5	17,7	23,0
agosto	66		13,6	19,1	24,5
setembro	88		15,2	20,5	25,8
outubro	149		17,0	22,0	26,9
novembro	135		17,9	23,1	28,3
dezembro	161		19,7	25,4	31,2
ano	1.470			22,3	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	520	35%	173	187 (jan)	161 (dez)
Outono	mar–mai	313	21%	104	147 (mar)	79 (mai)
Inverno	jun–ago	238	16%	79	104 (jun)	66 (ago)
Primavera	set–nov	373	25%	124	149 (out)	88 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 672 mm (46% do ano) • verão: junho a novembro somam 611 mm (42% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 66 e 88 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência. Como até o mês mais seco passa de 60 mm, o solo raramente seca: a janela vale para entrar com máquina, não para preparo em solo seco.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 520 mm, 35% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: janeiro tem a maior média (26,2 °C) e julho a menor (17,7 °C, com mínima média de 12,5 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#iporanga`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 6 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 4, tmax 2); o banco as preserva. médias do período 2011–2026 (15.4 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-11-06.