Jacupiranga — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:33 • 311 meses (2000-03 a 2026-11)

23 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.479 mm/ano	**263 mm**	**50 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
21,9 °C	**25,7 °C**	**17,7 °C**
média dos 12 meses	em janeiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	263		20,9	25,7	30,5
fevereiro	170		19,8	24,8	29,9
março	171		20,3	25,1	29,9
abril	82		18,5	23,3	28,0
maio	78		14,8	20,1	25,4
junho	63		13,8	18,6	23,5
julho	73		12,5	17,7	22,8
agosto	50		13,5	18,7	23,9
setembro	99		15,3	19,9	24,6
outubro	120		17,3	21,5	25,6
novembro	116		18,4	22,9	27,5
dezembro	155		19,0	23,9	28,8
ano	1.479			21,9	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	588	40%	196	263 (jan)	155 (dez)
Outono	mar–mai	330	22%	110	171 (mar)	78 (mai)
Inverno	jun–ago	186	13%	62	73 (jul)	50 (ago)
Primavera	set–nov	335	23%	112	120 (out)	99 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 763 mm (52% do ano) • verão: junho a novembro somam 521 mm (35% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 50 e 99 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 588 mm, 40% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (263 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: janeiro tem a maior média (25,7 °C) e julho a menor (17,7 °C, com mínima média de 12,5 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#jacupiranga`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 3 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmin 1, tmed 1, tmax 1); o banco as preserva. médias do período 2000–2026 (25.9 anos de dado; parte da série não validada). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-11-06.