Registro Unesp — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:109 • 192 meses (2009-09 a 2026-11)

14 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.310 mm/ano	**191 mm**	**58 mm**
em todo o ano	em janeiro	em julho

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
21,4 °C	**26,1 °C**	**16,6 °C**
média dos 12 meses	em janeiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	191		20,4	26,1	31,8
fevereiro	175		19,9	25,5	27,9
março	141		19,2	24,0	25,8
abril	84		17,0	22,1	24,6
maio	83		13,4	18,7	24,0
junho	101		12,2	17,0	21,8
julho	58		11,4	16,6	21,8
agosto	64		12,4	17,5	22,7
setembro	76		15,1	20,9	24,2
outubro	123		15,2	21,4	25,0
novembro	104		17,2	22,1	27,0
dezembro	146		19,1	24,4	29,7
ano	1.310			21,4	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	511	39%	170	191 (jan)	146 (dez)
Outono	mar–mai	308	23%	103	141 (mar)	83 (mai)
Inverno	jun–ago	222	17%	74	101 (jun)	58 (jul)
Primavera	set–nov	303	23%	101	123 (out)	76 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 673 mm (51% do ano) • verão: junho a novembro somam 526 mm (40% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 58 e 76 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 511 mm, 39% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: janeiro tem a maior média (26,1 °C) e julho a menor (16,6 °C, com mínima média de 11,4 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#registro-unesp`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 8 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmin 3, tmed 3, tmax 2); o banco as preserva. médias do período 2009–2026 (16.0 anos de dado; parte da série não validada). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-11-06.