Tapiraí — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC ciiagro:82 • 232 meses (2005-08 a 2026-11)

15 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO/IAC. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.592 mm/ano	**222 mm**	**65 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
18,5 °C	**22,9 °C**	**14,0 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	222		18,0	22,8	27,6
fevereiro	185		17,9	22,9	28,0
março	157		16,7	21,4	26,1
abril	100		14,8	19,5	24,2
maio	81		11,6	16,7	21,9
junho	81		9,6	15,2	20,7
julho	80		7,3	14,0	20,8
agosto	65		9,6	14,1	21,2
setembro	118		11,6	15,6	22,1
outubro	135		13,3	17,4	21,6
novembro	163		15,3	19,9	24,4
dezembro	185		17,1	21,8	26,5
ano	1.592			18,5	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	591	37%	197	222 (jan)	185 (fev)
Outono	mar–mai	337	21%	112	157 (mar)	81 (mai)
Inverno	jun–ago	226	14%	75	81 (jun)	65 (ago)
Primavera	set–nov	416	26%	139	163 (nov)	118 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 743 mm (47% do ano) • verão: junho a novembro somam 642 mm (40% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho e agosto a chuva média fica entre 65 e 100 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência. Como até o mês mais seco passa de 60 mm, o solo raramente seca: a janela vale para entrar com máquina, não para preparo em solo seco.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 591 mm, 37% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (222 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (22,9 °C) e julho a menor (14,0 °C, com mínima média de 7,3 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#tapirai`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". 3 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmin 2, chuva 1); o banco as preserva. médias do período 2005–2026 (19.3 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-11-06.