Barra do Chapéu — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC 293 • 99 meses medidos (2018-08 a 2026-10)

Atenção à série curta: apenas 7 anos com os 12 meses fechados — referência do período medido, não padrão consolidado.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, as janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.261 mm/ano	**184 mm**	**46 mm**
em todo o ano	em janeiro	em julho

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
19,3 °C	**22,8 °C**	**15,5 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	184		17,1	20,9	24,8
fevereiro	132		17,0	22,8	28,5
março	117		16,3	22,2	28,1
abril	60		14,2	19,8	25,5
maio	66		11,7	17,5	23,3
junho	81		10,5	16,1	21,6
julho	46		9,3	15,5	21,6
agosto	67		10,3	16,2	22,1
setembro	105		12,4	18,5	24,5
outubro	140		13,9	18,9	24,0
novembro	126		14,6	20,1	25,6
dezembro	140		16,8	22,6	28,4
ano	1.261			19,3	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	456	36%	152	184 (jan)	132 (fev)
Outono	mar–mai	243	19%	81	117 (mar)	60 (abr)
Inverno	jun–ago	195	15%	65	81 (jun)	46 (jul)
Primavera	set–nov	371	29%	124	140 (out)	105 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 559 mm (44% do ano) • verão: junho a novembro somam 566 mm (45% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho e agosto a chuva média fica entre 46 e 81 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 456 mm, 36% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (22,8 °C) e julho a menor (15,5 °C, com mínima média de 9,3 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal medida; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#barra-do-chapeu`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". médias do período 2018–2026 (8.2 anos de dado). Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.