Itapirapuã Paulista — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC 298 • 76 meses medidos (2018-08 a 2026-06)

Atenção à série curta: apenas 4 anos com os 12 meses fechados — referência do período medido, não padrão consolidado.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, as janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.263 mm/ano	**162 mm**	**44 mm**
em todo o ano	em outubro	em junho

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
20,8 °C	**25,2 °C**	**15,8 °C**
média dos 12 meses	em novembro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	145		18,4	24,3	30,3
fevereiro	130		18,6	24,5	30,5
março	108		18,3	23,8	29,4
abril	101		16,4	21,9	27,3
maio	71		13,5	19,1	24,7
junho	44		10,4	15,8	17,8
julho	47		9,4	15,8	22,1
agosto	47		10,0	16,6	23,1
setembro	75		13,1	19,3	25,6
outubro	162		15,0	20,2	25,4
novembro	115		16,4	25,2	27,2
dezembro	115		17,5	23,6	29,7
ano	1.263			20,8	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	390	31%	130	145 (jan)	115 (dez)
Outono	mar–mai	281	22%	94	108 (mar)	71 (mai)
Inverno	jun–ago	138	11%	46	47 (jul)	44 (jun)
Primavera	set–nov	353	28%	118	162 (out)	75 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 555 mm (44% do ano) • verão: junho a novembro somam 491 mm (39% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em maio, junho, julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 44 e 75 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 390 mm, 31% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: novembro tem a maior média (25,2 °C) e julho a menor (15,8 °C, com mínima média de 9,4 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal medida; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#itapirapua-paulista`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". médias do período 2018–2026 (6.3 anos de dado). 6 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmin 1, tmed 3, tmax 2); o banco as preserva. Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.