Juquitiba — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC 39 • 216 meses medidos (2008-01 a 2026-10)

15 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, as janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.561 mm/ano	**236 mm**	**59 mm**
em todo o ano	em janeiro	em agosto

Temperatura média	Mês mais quente	Mês mais frio
19,7 °C	**23,2 °C**	**16,3 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em junho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	236		17,2	22,5	27,8
fevereiro	190		17,5	23,2	28,8
março	163		17,1	22,5	27,8
abril	114		14,6	21,1	27,6
maio	72		11,4	18,2	23,2
junho	76		10,1	16,3	22,4
julho	65		9,1	16,7	21,7
agosto	59		10,3	16,6	23,0
setembro	106		12,4	18,2	24,0
outubro	128		14,5	19,4	24,2
novembro	126		15,2	20,3	25,3
dezembro	176		16,5	21,8	27,1
ano	1.561			19,7	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	602	39%	201	236 (jan)	176 (dez)
Outono	mar–mai	350	22%	117	163 (mar)	72 (mai)
Inverno	jun–ago	199	13%	66	76 (jun)	59 (ago)
Primavera	set–nov	360	23%	120	128 (out)	106 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 776 mm (50% do ano) • verão: junho a novembro somam 559 mm (36% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em maio, junho, julho e agosto a chuva média fica entre 59 e 76 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 602 mm, 39% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (236 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (23,2 °C) e junho a menor (16,3 °C, com mínima média de 9,1 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal medida; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#juquitiba`. Umidade relativa omitida: a fonte usa `0` para "sem sensor". médias do período 2008–2026 (18.0 anos de dado; parte da série não validada). 7 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmed 2, tmax 4, chuva 1); o banco as preserva. Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.