Ribeira — climatologia das médias

Estação CIIAGRO/IAC 64 • 238 meses medidos (2005-11 a 2026-10)

17 anos com os 12 meses fechados — médias do período medido, não previsão do tempo.

Leia antes de usar: os números abaixo são **médias de vários anos**, obtidas das medições mensais do CIIAGRO. **Não é previsão meteorológica** para os próximos dias nem para esta safra.

Aplicação prática: este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, as janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

Chuva anual média	Mês mais chuvoso	Mês mais seco
1.224 mm/ano	**188 mm**	**59 mm**
em todo o ano	em janeiro	em abril
Temperatura média	**Mês mais quente**	**Mês mais frio**
22,1 °C	**25,5 °C**	**17,8 °C**
média dos 12 meses	em fevereiro	em julho

Tabela 1: Chuva média por mês do ano

mês	chuva (mm)	perfil	t mín	t méd	t máx
janeiro	188		18,9	24,8	30,8
fevereiro	121		19,5	25,5	31,5
março	113		19,2	24,9	30,6
abril	59		15,7	23,7	28,6
maio	61		14,6	20,3	25,9
junho	74		12,4	17,8	23,2
julho	78		12,0	17,8	23,6
agosto	60		12,5	18,5	24,5
setembro	90		14,6	20,5	26,4
outubro	127		14,7	23,0	26,9
novembro	100		17,7	23,4	29,0
dezembro	110		19,1	24,9	30,8
ano	1.224			22,1	

Tabela 2: Chuva por estação do ano

estação	meses	total (mm)	% do ano	média/mês	maior mês	menor mês
Verão	dez–fev	419	34%	140	188 (jan)	110 (dez)
Outono	mar–mai	233	19%	78	113 (mar)	59 (abr)
Inverno	jun–ago	212	17%	71	78 (jul)	60 (ago)
Primavera	set–nov	317	26%	106	127 (out)	90 (set)

Antes dos solstícios (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 542 mm (44% do ano) • verão: junho a novembro somam 529 mm (43% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro a chuva média fica entre 59 e 90 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 419 mm, 34% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (25,5 °C) e julho a menor (17,8 °C, com mínima média de 12,0 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: CIIAGRO/IAC (ciiagro.org.br), série mensal medida; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#ribeira`. Umidade relativa omitida: a fonte usa 0 para "sem sensor". médias do período 2005–2026 (19.8 anos de dado). 2 leitura(s) fora da faixa de sanidade excluída(s) da média (tmax 2); o banco as preserva. Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.