О чем молчат женщины: синдром недержания мочи и пролапс тазовых органов.



Кучерук Оксана Петровна

Статистика печальна и говорит о том, что более 50% женщин зрелого возраста страдают от различных форм синдрома недержания мочи и пролапса (опущения и выпадения) тазовых органов.

Опущение стенок тазовых органов у женщин может наблюдаться даже после нормальных родов, что объясняется растяжением мышц или повреждением тканей промежности. При этом, по данным ВОЗ, только 29% женщин с этими проблемами обращаются за медицинской помощью, а в России ситуация еще менее благоприятная – в 10% случаев. Люди часто не знают существовании современных миниинвазивных методов лечения и предпочитают такие состояния игнорировать. К своему здоровью нужно относиться внимательнее. Решение проблемы существует, врачи знают, как бороться с этими проблемами.

В чем причина?

В силу анатомических особенностей, женщины сталкиваются с синдромом недержания мочи в 2 раза чаще, чем мужчины. Предпосылками появления этой патологии могут выступать беременности и роды, оперативные вмешательства на органах малого таза, пролапс (опущение) тазовых органов. Увеличить риск непроизвольного выделения мочи могут и сопутствующие эндокринные (в том числе и сахарный диабет), неврологические заболевания, нарушения работы желудочно-кишечного тракта (частые запоры).





Также к развитию недержания часто имеется генетическая предрасположенность. В зоне риска женщины европеоидной расы. Они в 3 раза чаще обращаются к врачам с данной проблемой по сравнению жительницами Азии и Африки. Виноват и современный образ жизни: гиподинамия, неправильное питание, способствующее ожирению.

С возрастом распространенность данного нарушения увеличивается. Как правило, синдром начинает проявляться в период климакса. Изменение гормонального фона, снижение выработки эстрогенов приводит к нарушению мышечного тонуса органов малого таза, что негативно сказывается на состоянии мочевыделительной системы.

Классификация

В России для определения тяжести синдрома недержания мочи применяется классификация, предложенная ведущим отечественным урологом, Дмитрием Васильевичем Каном. Он стал одним из первых разработчиков методики оказания

медицинской помощи пациенткам с синдромом недержания мочи (на тот период в основном применялось хирургическое лечение данной патологии).

Классификация Д.В. Кана

Степени	**Описание**
Легкая,степень недержания мочи	Непроизвольное выделение мочи происходит лишь при резком и внезапном повышении внутрибрюшного давления: сильный кашель, быстрая ходьба, бег.,Выделение мочи – не более нескольких капель.
Средняя,степень недержания мочи	Проблемы,возникают уже при легкой физической нагрузке, неспешной ходьбе.
Тяжелая,степень недержания мочи	Выделение,жидкости даже в состоянии покоя, без императивных позывов к мочеиспусканию,,полное опорожнение мочевого пузыря.

Не замалчивать проблему!

Активному образу жизни, уверенности в себе, сексуальной привлекательности в глазах мужчин непроизвольные выделения мочи явно не способствуют. Безусловно, можно приобрести специальные средства гигиены, выбор действительно разнообразен. Но, как справится с чувством физического и психологического дискомфорта? Постоянная нервозность из-за опасения, что проблема станет очевидна окружающим, способна и вовсе спровоцировать развитие депрессии даже у стопроцентной оптимистки. Страдает и личная жизнь. О каком сексуальном удовлетворении может идти речь, когда организм может «подвести» в любой момент? Как итог, одиночество.

Допускать появления чувства апатии нельзя. Аксиома! При возникновении симптомов недержания мочи женщине нужно взять себя в руки, забыть про смущение и обратится к врачу гинекологу. Конечно, это должен быть квалифицированный специалист, работающий в современной клинике, такой как, например, **Клиника Современных Технологий (КСТ**), специализация «клиника женского здоровья». Здесь можно пройти комплексное обследование и получить как консервативное, так и необходимое хирургическое лечение.

Пути преодоления

Методов лечения синдрома недержания мочи разработано несколько. Они отличаются друг от друга эффективностью, инвазивностью, последующим

реабилитационным периодом, отдаленным прогнозом. Так, лечащий врач, в зависимости от степени выраженности патологии, возраста, анамнеза, по результатам обследования, может рекомендовать пациентке:

- модифицировать образ жизни, что означает нормализовать показатели веса, перейти на систему сбалансированного питания, значительно снизить потребление чая и кофе;
- следить за физической формой: показаны тренировки мышц тазового дна;
- посетить физиопроцедуры;
- принимать лекарственные препараты, назначенные гинекологи;
- при тяжелой степени пролапса тазовых органов и синдрома недержания мочи может быть показано хирургическое вмешательство.

Наряду с этим, есть и более современный метод борьбы с непроизвольным выделением мочи. Так, на базе клиники КСТ специально для женщин открыт новый медицинский кабинет – **«Smart Innovation»**. В нем установлен инновационный CO2 лазер Eraser-C.



Использование лазерных технологий — новое, высокоэффективное слово в лечении гинекологических патологий, в том числе и терапии синдрома недержания мочи, опущения органов малого таза. Подготовка к процедуре начинается с обследования: сдачи анализов, УЗИ – диагностики. При отсутствии противопоказаний врач назначает необходимый курс лазерных манипуляций. Перед каждой процедурой специалист обязательно выполняет настройку CO2-лазера индивидуально для каждой пациентки. Во время сеанса лазерным отражателем с манипулой, прицельно фокусируя световой луч на проблемных участках, врач проводит обработку поверхностей наружной области мочевого канала и стенок влагалища. Контролируемое микроповреждение запускает

механизмы естественной регенерации тканей. Затронутые лазером зоны активно синтезируют соединительнотканные волокна, стимулируется процесс неоколлагенеза. Волокна после нагревания становятся короче и толще, укрепляется структура тканей промежности, нормализуются обменные процессы и кровоток, все это приводит к улучшению тонуса тазовых мышц, мочевого пузыря.

Очень важный момент, заключается в том, что процедура безболезненна для пациентки и не требует применения анестезии. Длительность сеанса около двадцати пяти минут, курс лечения рассчитан на 2-3 процедуры, проводимые с перерывом в один месяц.

К преимуществам лечения CO2 лазером относят:

- получение стойкого результата лечения;
- отсутствие подготовительного и реабилитационного периодов;
- безопасность и безболезненность метода, отсутствие осложнений;
- улучшение качества жизни женщины и избавление от такого стрессового фактора, как недержание мочи.

Важно иметь в виду, что у данного метода лечения есть и противопоказания:

- беременность;
- заболевания вирусного типа, сахарным диабетом, выпадение матки;
- злокачественные новообразования.

Лечение из будущего доступно сейчас

Карбоновые **CO2 лазерные системы Eraser-C** представляют собой передовые технологии лазерной хирургии. В гинекологической практике используется сканерная технология подачи лазерного луча. Аппарат Eraser-C, установленный в **кабинете «Smart Innovation»** клиники КСТ, оснащен специальной насадкой для хирургических манипуляций и фракционным сканером для абляционного, фракционного омоложения. Новая минимально инвазивная, нехирургическая, неаблятивная лазерная терапия новое слово в лечении различных гинекологических патологий.

Стоит отметить, что инновационная лазерная технология, позволяет получать положительные результаты коррекции синдрома недержания мочи, на фоне высокого профиля безопасности лечения.

При этом нельзя забывать о человеческом факторе. Выполнять процедуры с применением лазерных технологий должен только опытный врач, умеющий обращаться с данным прибором. В **Клинике Современных Технологий (КСТ), специализация «клиника женского здоровья»**, гордятся своими врачами, которые в совершенстве освоили методики работы с инновационным CO2 лазером Eraser-C.

Врачи также прошли дополнительное профессиональное обучение, по программе «Лазерная медицина» на базе Государственного Научного Центра лазерной медицины им. О.К. Скобелкина.

И в заключение, каждая женщина должна всегда помнить, что проблему, связанную с ухудшением состояния здоровья нельзя замалчивать, ее нужно своевременно и эффективно решать!



Москва. Большой Головин пер., д 4 тел. 8 495 114 51 51