

תוכן העניינים

2	מטרת הניסוי
3	רקע תיאורטי
4	מערכת הניסוי
5	מהלך הניסוי
6	תוצאות הניסוי
7	עיבוד וניתוח תוצאות
8	סיכום מסקנות

מטרת הניסוי

רקע תיאורטי

משוואת כוחות עבור ירח שמסתו m שנע במסלול מעגלי סביב גוף מסיבי שמסתו M (במקרה זה הוא צדק):

$$\frac{GmM}{R^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} R$$
$$\frac{GM}{4\pi^2} = \frac{R^3}{T^2} \quad (1)$$

משוואת כוחות עבור כדור הארץ שמקיף את השמש שמסתה M_S במסלול שרידוס R_E בזמן הקפה T_E :

$$\frac{GM_S}{4\pi^2} = \frac{R_E^3}{T_E^2} \quad (2)$$

נחלק משוואה 1 ב-2:

$$\frac{\frac{GM}{4\pi^2}}{\frac{GM_S}{4\pi^2}} = \frac{\frac{R^3}{T^2}}{\frac{R_E^3}{T_E^2}} \Rightarrow \frac{M}{M_S} = \frac{R^3}{T^2} \times \frac{T_E^2}{R_E^3}$$
$$\frac{M}{M_S} = \frac{R^3}{R_E^3} \times \frac{T_E^2}{T^2}$$
$$\frac{M}{M_S} = \frac{\frac{R^3}{R_E^3}}{\frac{T^2}{T_E^2}}$$
$$\frac{M}{M_S} = \frac{\left(\frac{R}{R_E}\right)^3}{\left(\frac{T}{T_E}\right)^2} \quad (3)$$

קיבלנו משוואה שמתארת את הקשר בין מסת גוף מסיבי (ביחידות מסת שמש) לבין היחס של רדיוס מסלולו (ביחידות אסטרונומיות AU) לזמן המחזור של הקפתו (בשנים).

מערכת הניסוי

תוצאות הניסוי

עיבוד וניתוח תוצאות

