




44. If the average of 5 consecutive number starting with m is n find the average of 6 consecutive number starting with $m+2$.

पुस्तक

m से शुरुआत होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत n है तो $m+2$ से शुरु होने वाली 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा?

[A] $n+2$

[B] $n+2.5$

[C] $n+3$

[D] $n+3.5$


$$+5 \times 1$$

$$m+2$$

$$+2.5$$

$$\text{Average} = n$$

$$n+2.5$$



$$n = 12$$

$$\begin{array}{l}
 +1 \times 7 = (+7) \\
 \text{---} \\
 x+2 \\
 \\
 +\frac{3}{2} \\
 \text{---} \\
 a \quad \quad \quad (a+3.5)
 \end{array}$$

45. Average of 5 consecutive number starting with x is a . Find the average of 8 consecutive number starting with $x+2$?

x से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत a है, तो $x+2$ से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

[A] $a+7.5$

~~[B] $a+3.5$~~

[C] $a+4$

[D] $a+6.5$

17 19 21 ✓

औसत = 19

योग = 38

46. The sum of three consecutive odd numbers is 38 more than the average of these three numbers, then the greatest of these number is.

तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन तीन संख्याओं के औसत से 38 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है।

[A] 18 [B] 19 [C] 20 [D] 21 ✓

$$2 \times 2 = 4$$

⑥ ——— 10 ———

$$A = 1 \text{ ——— } 10$$

$$\text{Sum} = 5 \text{ ——— } + 4 \text{ ——— } \times 10 \text{ } 40$$

47. The sum of five consecutive even numbers is 40 more than the average of these five numbers then the first number is.

पाँच क्रमागत सम संख्याओं का योग इन पाँच संख्याओं के औसत से 40 अधिक है तो पहली संख्या है।

- [A] 4 [B] 6 [C] 5 [D] 7

$$\begin{array}{r} 5^{\text{th}} \\ 12 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 5^{\text{th}} \\ 18 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} 3 \times 2 = +6 \\ \text{---} \end{array} \quad \textcircled{20}$$

13

$$\begin{array}{l} A = 1 \quad \textcircled{13} \\ \text{Sum} = 8 \quad \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{l} +7 \\ \text{---} \end{array} \quad \begin{array}{l} \times 13 \\ \text{---} \end{array} \quad 91$$

48. The sum of eight consecutive even numbers is 91 more than the average of these eight number is then the last numbe is.

आठ क्रमागत सम संख्याओं का योग इन आठ संख्याओं के औसत से 91 अधिक है तो अंतिम संख्या है।

[A] 18 ~~[B] 20~~ [C] 22 [D] 24

4^{th} 5^{th}

$$\frac{x}{1} \quad \frac{x+2}{1} \quad \frac{x+4}{1} \quad \frac{x+6}{1} \quad \frac{x+8}{1}$$

127

A

$$x+4 = (x+8) \times \frac{3}{5} + 50$$

$$5x+20 = 3x+24 + 250$$

$$2x = 254$$

$$x = 127$$

49. The average of five consecutive odd numbers is 50 more than $\frac{3}{5}$ of the largest number. Then what is smallest number


पाँच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के $\frac{3}{5}$ से 50 अधिक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है।

[A] 125

[B] 127

[C] 132

[D] 137



$$151 - 50 = 101$$

$$101 = 5x$$

$$101 = 5x$$

49. The average of five consecutive odd numbers is 50 more than $\frac{3}{5}$ of the largest number. Then what is the smallest number?


पाँच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के $\frac{3}{5}$ से 50 अधिक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है।

[A] 125

[C] 132

~~[B] 127~~

[D] 137



$$2x - 52 = 2$$

$$2x = 54$$

$$x = 27$$

50. The average of three consecutive odd numbers is 52 more than $\frac{1}{3}$ rd of the largest of these numbers. What is the smallest of these numbers?

लगातार तीन विषम संख्या का औसत इनमें से बड़ी संख्या के $\frac{1}{3}$ से 52 अधिक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है?

[A] 79 [B] 75 [C] 81 ☒ [D] 77

$$\overline{a} \quad \overline{14} \quad \overline{16}$$

↑

$$\overline{a+8}$$

51. Find the average of five consecutive even numbers if the difference of the fifth number and the first number is 8 and the sum of the first two numbers is 6 more than the fifth number.

यदि पाँचवीं संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है और पहली दो संख्याओं का योग पाँचवीं संख्या से 6 अधिक है, तो पाँच क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

[A] 14 [B] 15 ~~[C] 16~~ [D] 17



$$\begin{array}{c} \overline{a+12} \\ \uparrow \end{array}$$

52. What is the average of seven consecutive odd numbers, if the difference of the last and first is 12 and the sum of first two number is 3 more then the last number.

सात क्रमिक विषम संख्याओं का औसत क्या है, यदि अंतिम और पहली संख्या का अंतर 12 है और पहली दो संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 3 अधिक है?

[A] 15 [B] 17 [C] 19 [D] 21

1, 2, 3, - - - , 10 = 5.5

1, 2, 3, - - - , 8 = 4.5

$$\frac{10}{5.5} \times 100 \Rightarrow 18\frac{2}{11}\%$$

53. The average of first 10 multiple of a number is calculated. If two multiple are removed from the last what is the range over which the average can swing with respect to the initial average.

किसी संख्या के पहले 10 गुणकों का औसत निकाला जाता है। यदि दो गुणकों को अंतिम से हटा दिया जाता है तो वह कौन सी सीमा है जिस पर प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत झूल सकता है।

[A] 17.16%

[B] 15.17%

[C] 16.17%

☒ [D] 18.18%

औसत
 $1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots, 179 = 90$
 $6, 7, 8, \dots, 179 = 92.5$

$$\frac{2.5}{90} \times 100$$

1%
 3%
 .9
 2.7

54. The average of first 179 multiples of 279. is calculated. If the five multiple are removed from starting, then what percent average can swing with respect to the initial average.

279 के प्रथम 179 गुणकों का औसत निकाला जाता है। यदि पांच गुणकों को प्रारंभ से हटा दिया जाता है, तो प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत कितना प्रतिशत स्विंग कर सकता है।

- [A] 3.77% [B] 2.77%
 [C] 4.77% [D] 5.77%

Set - A $\Rightarrow \frac{376}{8} = 47$ ^{Mean} औसत
 $\swarrow +15$
 Set - B $\Rightarrow 62, 63, \boxed{64}$
 $\downarrow$
 $A = 64 \times 5$
 $\textcircled{320}$

55. A sum of eight consecutive even numbers of set-A is 376. What is the sum of five consecutive numbers of different set, whose lowest number is 15 more than the mean of set A?

एक समूह A की आठ लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। एक अन्य समूह की पांच लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह- A के माध्य से 15 अधिक है?

[A] 296

[C] 324

☒ [B] 320

[D] 284

25

N

$$m^2 - N^2 = 600$$

(N+10)²

$$N^2 + 100 + 20N - N^2 = 600$$

$$20N = 500$$

$$N = 25$$

35

M

(N+10)

56. The average of 35 consecutive natural number is N. Dropping the first 10 numbers and including the next numbers then the average is changed to M. If the $M^2 - N^2 = 600$. Then find M and N? / 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत N है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली दस संख्याओं को मिलाने पर M में बदल जाता है। $M^2 - N^2 = 600$ है। तो M और N ज्ञात कीजिए?

[A] 25, 35

[B] 35, 25

[C] 35, 20

[D] 20, 25

~~5~~, 6, 7, 8, 9

7, 8, 9, 10, 11

$$A = 7 \overset{+2}{\curvearrowright} 9$$

Consecutive Natural Numbers.

$n = \text{number}$

-100

+100

A

A+100


57. The average score in an examination of 10 students of a class is 60. If the scores of the top five students are not considered the average score the of the remaining students falls by 5. The pass marks was 40 and the maximum mark was 100. It is also known that none of students failed. If each of the top five scores had distinct integral scores, the maximum possible score of the topper is.

एक परीक्षा में एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। यदि सर्वोच्च 5 विद्यार्थियों का अंक पर विचार नहीं किया जाता है। तो शेष विद्यार्थियों के औसत में 5 की कमी आ जाती है। उत्तीर्णक 40 था तथा अधिकतम अंक 100 था। यह देखा कि कोई विद्यार्थी असफल नहीं हुआ। यदि प्रत्येक 5 सर्वोच्च अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अंक पूर्ण अविभाज्य है तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का अधिकतम संभव अंक क्या है?


[A] 99 [B] 100 [C] 87 [D] 95

1	2	3	4	5	6 th	7 th	8 th	9 th	10 th	
95	59	58	57	56	55	55	55	55	55	= 60
	-6	-7	-8	-9						
	65				55					

Max.
Possible
Marks



40%



$$4A = 3A + 24$$

$$A = 24$$

58. The average of four consecutive odd natural numbers is eight less than the average of three consecutive even natural numbers if the sum of these three even numbers is equal to the sum of above four odd numbers, then the average of four original odd numbers is

चार लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तीन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से आठ कम है यदि इन तीन सम संख्याओं का योग उपरोक्त चार विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो चार मूल विषम संख्याओं का औसत है

[A] 36

~~[B] 24~~

[C] 18

[D] 32

$$\underbrace{\text{2043} \quad \text{+ve}}_{\text{---}} = 0$$

$$\text{Sum} = 0 \times 2044 = 0$$

59. The average of any 2044 real numbers is zero. At the most how many of them can be negative real numbers.

किसी भी 2044 वास्तविक संख्या का औसत शून्य है। अधिक से अधिक उनमें से कितनी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं।

[A] 1022

[B] 1021

☒ [C] 2043

[D] 1023

$$\begin{array}{r}
 \overbrace{5-E} \\
 40 \\
 5 \times 5 \\
 + 2.5 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 \overbrace{5-Odd} \\
 \textcircled{39} \\
 - \frac{2.5}{5} = -.5 \\
 \hline
 \end{array}
 = 39.5$$

60. The average of five consecutive even numbers and five consecutive odd numbers is 39.5 if the average of the given five even numbers is 40 then find the average of the given five odd numbers. / पाँच क्रमागत सम संख्याओं और पाँच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 39.5 है यदि दी गई पाँच सम संख्याओं का औसत 40 है तो दी गई पाँच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

[A] 38 [B] 39 [C] 40 [D] 41

$$\begin{array}{ccc}
 \text{---} & : & \text{---} \\
 | & & | \\
 16 & & \textcircled{35} \\
 -9.5 & & +9.5 \\
 \hline
 \end{array}
 = 25.5$$

61. The average of 22 consecutive natural numbers is 25.5 if the average of given eleven even consecutive numbers is 16. Then find the average of remaining numbers.

22 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 25.5 है यदि दी गई ग्यारह सम संख्याओं का औसत 16 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- [A] 30 ~~[B] 35~~ [C] 40 [D] 5

Geometrical progression
गुणोत्तर श्रृंखला

Miscellaneous

5, 15, 45, 135, - - -

$$r = \frac{15}{5} = 3 \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$\dots\dots\dots = a$$

$$+2, +4, +8, +16, +32, \dots$$

$$a=2, r=2$$

$$S_n = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2 \times (2^n - 1)$$

$$\text{Sum} = \frac{na + 2(2^n - 1)}{n}$$

1. Average of 'n' numbers is a, 2 is added in first number and 4 is added in second number and 8 is added in third number and this process is carried on, then find the average of new numbers.

n संख्याओं का औसत a है पहले संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। व दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है। और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आगे की संख्याओं में किया जाता है। तो नयी संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

- ☒ [A] $\frac{na + 2(2^n - 1)}{n}$ [B] $\frac{na + 2(2^n + 1)}{n}$
 [C] $\frac{a + 2(2^n + 1)}{n}$ [D] $\frac{n + 2(2^n + 1)}{n}$

2. Average of N numbers is A , 5 is added in first number and 10 is added in second number and 20 is added in third number and this process is carried on, then find the average of new numbers.

N संख्याओं का औसत A है पहले संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। व दूसरी संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है। और तीसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आगे की संख्याओं में किया जाता है। तो नयी संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

[A] $\frac{4AN + 5(5^N - 1)}{4N}$

[B] $\frac{4AN + 5(5^N + 1)}{4N}$

[C] $\frac{5AN + 5(5^N - 1)}{4N}$

[D] $\frac{5AN + 5(5^N + 1)}{4N}$

$$\begin{array}{l}
 \text{A} \xrightarrow{+3.6 \times 10} \\
 \text{ab} \quad \text{ba} \quad \begin{array}{l} +36 \\ \hline 9 \end{array} \\
 \text{If } (a-b) = 36 \\
 \text{a-b} = 4
 \end{array}$$

3. Average of 10 two digit numbers is calculated. If the digits of a number are interchanged then average by 3.6 find the difference of the digits of two digit number.

दो अंको वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया। यदि एक संख्या के अंको को बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 अंक बढ़ जाता है, तो दो अंको वाली संख्याओं के अंको का अंतर ज्ञात करें।

[A] 4 [B] 6 [C] 8 [D] 10

Reverse the digit

$$\begin{array}{l} \rightarrow ab = 10a + b \\ \rightarrow ba = 10b + a \end{array}$$

$$9a - 9b$$

$$\boxed{9 \times (a - b)}$$

$$abc = 100a + 10b + c$$

$$cba = \underline{100c} + \underline{10b} + \underline{a}$$

$$99 \times a - 99 \times c$$

$$\boxed{99 \times (a - c)}$$

$$9 \times (a-b) = \frac{18}{9} = 2$$

$$-1.8 \times 10$$

4. Prashant calculate average of 10 two digits numbers later on it was found due to same mistake digits of a number got interchanged, due to which average decreases by 1.8 then find the difference of digit, which have mistake.

प्रशांत दो अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं जिसके कारण औसत 1.8 कम हो जाता है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हो।

~~[A] 2~~

[B] 3

[C] 4

[D] 5

$$+19.8 \times 10$$

$$99 \times (a - c) = \frac{198}{99} = 2$$

5. A student the average of 10 three digit numbers due to mistake he interchanged the digits, that results in the increase of average by 19.8 Then find the difference of digit of one's and hundred's place of that number.

एक छात्र तीन-अंकीय 10 संख्याओं का औसत निकालता है। लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है जिससे उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है। तो उस संख्या के इकाई और सैकड़े स्थान के अंकों का अंतर ज्ञात करें।

- ☒ [A] 2 [B] 4 [C] 6 [D] 8