

7300+ Mathematics

SSC MATHEMATICS BILINGUAL



BASIC CONCEPT OF EACH CHAPTER & EACH QUESTION
WITH DETAILED VIDEO SOLUTION

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अध्यायवार विस्तृत व्याख्या



USEFUL FOR

SSC CGL, CPO SI, CONSTABLE, CHSL, STENOGRAPHER, MTS, IBPS PO,
CLERK, SBI, RRB, DSSSB, STATE SSC, ASSISTANT EXAMS, LIC, GIC, NIACL,
METRO & OTHER ONE-DAY COMPETITIVE EXAMS.

7300+
TYPEWISE
QUESTIONS

ALL TCS PATTERN
QUESTIONS

Edition 13th



RAKESH YADAV
Selected Excise Inspector

RAKESH YADAV READERS PUBLICATION PVT. LTD

LATEST EDITION

Buy now at

 **flipkart**.com

Buy now at

 **amazon.in** >

Click Here to Buy Now

Average

औसत



44. If the average of 5 consecutive number starting with m is n find the average of 6 consecutive number starting with $m + 2$.

m से शुरूआत होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत n है तो $m + 2$ से शुरू होने वाली 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा?

- (a) $n + 2$ (b) $n + 2.5$
(c) $n + 3$ (d) $n + 3.5$

45. Average of 5 consecutive number starting with x is a . Find the average of 8 consecutive number starting with $x + 2$? / x से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत a है, तो $x + 2$ से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

- (a) $a + 7.5$ (b) $a + 3.5$
(c) $a + 4$ (d) $a + 6.5$

46. The sum of three consecutive odd numbers is 38 more than the average of these three numbers, then the greatest of these number is. / तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन तीन संख्याओं के औसत से 38 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है।

- (a) 18 (b) 19 (c) 20 (d) 21

47. The sum of five consecutive even numbers is 40 more than the average of these five numbers then the first number is. / पाँच क्रमागत सम संख्याओं का योग इन पाँच संख्याओं के औसत से 40 अधिक है तो पहली संख्या है।

- (a) 4 (b) 6 (c) 5 (d) 7

48. The sum of eight consecutive even numbers is 91 more than the average of these eight number is then the last number is. / आठ क्रमागत सम संख्याओं का योग इन आठ संख्याओं के औसत से 91 अधिक है तो अंतिम संख्या है।

- (a) 18 (b) 20 (c) 22 (d) 24

49. The average of five consecutive odd numbers is 50 more than $3/5$ of the largest number. Then what is smallest number. / पाँच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के $3/5$ से 50 अधिक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है।

- (a) 125 (b) 127 (c) 132 (d) 137

50. The average of three consecutive odd numbers is 52 more than $1/3$ rd of the largest of these numbers. What is the smallest of these numbers?

लगातार तीन विषम संख्या का औसत इनमें से बड़ी संख्या के $1/3$ से 52 अधिक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है?

- (a) 79 (b) 75 (c) 81 (d) 77

51. Find the average of five consecutive even numbers

if the difference of the fifth number and the first number is 8 and the sum of the first two numbers is 6 more than the fifth number. / यदि पाँचवीं संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है और पहली दो संख्याओं का योग पाँचवीं संख्या से 6 अधिक है, तो पाँच क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 14 (b) 15 (c) 16 (d) 17

52. What is the average of seven consecutive odd numbers, if the difference of the last and first is 12 and the sum of first two number is 3 more then the last number. / सात क्रमिक विषम संख्याओं का औसत क्या है, यदि अंतिम और पहली संख्या का अंतर 12 है और पहली दो संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 3 अधिक है?

- (a) 15 (b) 17 (c) 19 (d) 21

53. The average of first 10 multiple of a number is calculated. If two multiple are removed from the last what is the range over which the average can swing with respect to the initial average.

किसी संख्या के पहले 10 गुणकों का औसत निकाला जाता है। यदि दो गुणकों को अंतिम से हटा दिया जाता है तो वह कौन सी सीमा है जिस पर प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत झूल सकता है।

- (a) 17.16% (b) 15.17%
(c) 16.17% (d) 18.18%

54. The average of first 179 multiples of 279. is calculated. If the five multiple are removed from starting, then what percent average can swing with respect to the initial average. / 279 के प्रथम 179 गुणकों का औसत निकाला जाता है। यदि पांच गुणकों को प्रारंभ से हटा दिया जाता है, तो प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत कितना प्रतिशत स्विंग कर सकता है।

- (a) 3.77% (b) 2.77%
(c) 4.77% (d) 5.77%

55. A sum of eight consecutive even numbers of set-A is 376. What is the sum of five consecutive numbers of different set, whose lowest number is 15 more than the mean of set A? / एक समूह A की आठ लगातार सम संख्याओं का योग 376 है। एक अन्य समूह की पांच लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह- A के माध्य से 15 अधिक है?

- (a) 296 (b) 320 (c) 324 (d) 284

56. The average of 35 consecutive natural number is N . Dropping the first 10 numbers and including the next numbers then the average is changed to M . If the $M^2 - N^2 = 600$. Then find M and N ?

35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत छ है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली दस संख्याओं को मिलाने पर M में बदल जाता है। $M^2 - N^2 = 600$ है। तो M और N ज्ञात कीजिए?

- (a) 25, 35 (b) 35, 25
(c) 35, 20 (d) 20, 25

57. The average score in an examination of 10 students of a class is 60. If the scores of the top five students are not considered the average score of the remaining students falls by 5. The pass marks was 40 and the maximum mark was 100. It is also known that none of students failed. If each of the top five scores had distinct integral scores, the maximum possible score of the topper is.

एक परीक्षा में एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। यदि सर्वोच्च 5 विद्यार्थियों का अंक पर विचार नहीं किया जाता है। तो शेष विद्यार्थियों के औसत में 5 की कमी आ जाती है। उत्तीर्णांक 40 था तथा अधिकतम अंक 100 था। यह देखा कि कोई विद्यार्थी असफल नहीं हुआ। यदि प्रत्येक 5 सर्वोच्च अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अंक पूर्ण अविभाज्य हैं तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का अधिकतम संभव अंक क्या है?

- (a) 99 (b) 100 (c) 87 (d) 95

58. The average of four consecutive odd natural numbers is eight less than the average of three consecutive even natural numbers if the sum of these three even numbers is equal to the sum of above four odd numbers, then the average of four original odd numbers is/चार लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तीन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से आठ कम है यदि इन तीन सम संख्याओं का योग उपरोक्त चार विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो चार मूल विषम संख्याओं का औसत है

- (a) 36 (b) 24 (c) 18 (d) 32

59. The average of any 2044 real numbers is zero. At the most how many of them can be negative real numbers./किसी भी 2044 वास्तविक संख्या का औसत शून्य है। अधिक से अधिक उनमें से कितनी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं।

- (a) 1022 (b) 1021 (c) 2043 (d) 1023

60. The average of five consecutive even numbers and five consecutive odd numbers is 39.5 if the average of the given five even numbers is 40 then find the average of the given five odd numbers.

पाँच क्रमागत सम संख्याओं और पाँच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 39.5 है यदि दी गई पाँच सम संख्याओं का औसत 40 है तो दी गई पाँच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 38 (b) 39 (c) 40 (d) 41

61. The average of 22 consecutive natural numbers is 25.5 if the average of given eleven even consecutive numbers is 16. Then find the average of remaining numbers./22 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25.5 है यदि दी गई ग्यारह सम संख्याओं का औसत 16 है तो शेष

संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- (a) 30 (b) 35 (c) 40 (d) 5

Miscellaneous Types

1. Average of 'n' numbers is a, 2 is added in first number and 4 is added in second number and 8 is added in third number and this process is carried on, then find the average of new numbers.

n संख्याओं का औसत 'a' है पहले संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। व दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है। और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आगे की संख्याओं में किया जाता है। तो नयी संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

(a) $\frac{na+2(2^n-1)}{n}$ (b) $\frac{na+2(2^n+1)}{n}$

(c) $\frac{a+2(2^n+1)}{n}$ (d) $\frac{a+2(2^n-1)}{n}$

2. Average of N numbers is A, 5 is added in first number and 10 is added in second number and 20 is added in third number and this process is carried on, then find the average of new numbers.

N संख्याओं का औसत का औसत A है पहले संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। ओर तीसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है इसी प्रकार आगे की संख्याओं में किया जाता है। तो नयी संख्याओं का औसत ज्ञात करें।

(a) $\frac{AN+5(2^N-1)}{N}$ (b) $\frac{4AN+5(5^N+1)}{4N}$

(c) $\frac{5AN+5(5^N-1)}{4N}$ (d) $\frac{5AN+5(5^N+1)}{4N}$

3. Average of 10 two digit numbers is calculated. if the digits of a number are interchanged then average by 3.6 find the difference of the digits of two digit number./दो अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया। यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 अंक बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करें।

- (a) 4 (b) 6 (c) 8 (d) 10

4. Prashant calculate average of 10 two digits numbers later on it was found due to same mistake digits of a number got interchanged, due to which average decreases by 1.8 then find the difference of digit, which have mistake./प्रशांत दो अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं जिसके कारण औसत 1.8 कम हो जाता है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हो।

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5