

# Zusammenfassung

Mihir Mahajan, Alfred Nguyen, Noah Kiefer Diaz

May 20, 2022

## Contents

<b>1</b>	<b>Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume</b>	<b>2</b>
1.1	Grundlagen . . . . .	2
1.1.1	Definition 1 . . . . .	2
1.1.2	Lemma 8 . . . . .	2
1.1.3	Satz 9 Siebformel . . . . .	2
1.1.4	Wahl der Wahrscheinlichkeiten . . . . .	3
1.2	Bedingte Wahrscheinlichkeiten . . . . .	3
1.2.1	Definition 12 . . . . .	3
1.2.2	Baba Beispiele . . . . .	3
1.2.3	Satz 18 (Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit) . . .	4
1.2.4	Satz 19 (Satz von Bayes) . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Unabhängigkeit</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Zufallsvariablen</b>	<b>4</b>
3.1	Grundlagen . . . . .	4
3.2	Erwartungswert und Varianz . . . . .	4
3.2.1	Definition 29 . . . . .	4
3.2.2	Satz 33 Linearität des Erwartungswert . . . . .	5
3.2.3	Definition 35 Erwartungswert bei bedingter Wahrscheinlichkeit . . . . .	5

# 1 Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume

## 1.1 Grundlagen

### 1.1.1 Definition 1

- Ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum ist durch eine **Ergebnismenge**  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$  von Elementarereignissen gegeben
- Jedem Ereignis  $\omega_i$  ist eine Wahrscheinlichkeit  $0 \leq Pr[\omega_i] \leq 1$  zugeordnet  
$$\sum_{\omega \in \Omega} Pr[\omega] = 1$$
- Die Menge  $E \subseteq \Omega$  heißt Ereignis.  $Pr[E] = \sum_{\omega \in E} Pr[\omega]$
- $\bar{E}$  ist komplement zu E

Man kann standard Mengenoperationen auf Ereignisse machen, also bei Ereignissen  $A, B$  dann auch  $A \cup B$ ,  $A \cap B$

### 1.1.2 Lemma 8

Für Ereignisse  $A, B, A_1, A_2, \dots, A_n$  gilt

- $Pr[\emptyset] = 0, Pr[\Omega] = 1$
- $0 \leq Pr[A] \leq 1$
- $Pr[\bar{A}] = 1 - Pr[A]$
- Wenn  $A \subseteq B$  so folgt  $Pr[A] \leq Pr[B]$
- Additionssatz: Bei **paarweise disjunkten** Ereignissen gilt:  
$$Pr[\bigcup_{i=1}^n A_i] = \sum_{i=1}^n Pr[A_i]$$
  
Insbesondere gilt also:  
$$Pr[A \cup B] = Pr[A] + Pr[B]$$
  
Und für unendliche Menge von **disjunkten** Ereignissen:  
$$Pr[\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i] = \sum_{i=1}^{\infty} Pr[A_i]$$

### 1.1.3 Satz 9 Siebformel

Lemma 8, gilt nur für **disjunkte** Mengen. Das geht auch für nicht disjunkte!

1. Zwei Mengen  $Pr[A \cup B] = Pr[A] + Pr[B] - Pr[A \cap B]$

2. Drei Mengen  $Pr[A_1 \cup A_2 \cup A_3] =$   
 $Pr[A_1] + Pr[A_2] + Pr[A_3]$   
 $- Pr[A_1 \cap A_2] - Pr[A_1 \cap A_3] - Pr[A_2 \cap A_3]$   
 $+ Pr[A_1 \cap A_2 \cap A_3]$
3. n Mengen Veranschaulichen an Venn-Diagramm
  - (a) Alle aufaddieren
  - (b) Paarweise schnitte subtrahieren
  - (c) Dreifache schnitte dazuaddieren
  - (d) 4- fache schritte subtrahieren
  - (e) ...

#### 1.1.4 Wahl der Wahrscheinlichkeiten

Prinzip von Laplace (Pierre Simon Laplace (1749–1827)): Wenn nichts dagegen spricht, gehen wir davon aus, dass alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind.  $Pr[E] = \frac{|E|}{|\Omega|}$

### 1.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

#### 1.2.1 Definition 12

$A$  und  $B$  seien Ereignisse mit  $Pr[B] > 0$ . Die bedingte Wahrscheinlichkeit  $Pr[A|B]$  von  $A$  gegeben  $B$  ist definiert als:  $Pr[A|B] := \frac{Pr[A \cap B]}{Pr[B]}$

Umgangssprachlich:  $Pr[A|B]$  beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass  $A$  eintritt wenn  $B$  eintritt.

Die bedingten Wahrscheinlichkeiten  $Pr[|B]$  bilden für ein beliebiges Ereignis  $B \subseteq \Omega$  mit  $Pr[B] > 0$  einen neuen Wahrscheinlichkeitsraum über  $\Omega$ .

#### 1.2.2 Baba Beispiele

1. **TODO** Töchterproblem
2. **TODO** Ziegenproblem
3. **TODO** Geburtstagsproblem

### 1.2.3 Satz 18 (Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit)

Die Ereignisse  $A_1, \dots, A_n$  seien paarweise disjunkt und es gelte  $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$ .

$$Pr[B] = \sum_{i=1}^n Pr[B|A_i] * Pr[A_i]$$

analog für  $n \rightarrow \infty$

### 1.2.4 Satz 19 (Satz von Bayes)

Es seien  $A_1, \dots, A_n$  paarweise disjunkt, mit  $Pr[A_j] > 0$  für alle  $j$ . Außerdem sei  $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$  ein Ereignis mit  $Pr[B] > 0$ . Dann gilt für beliebiges  $i \in [n]$

$$Pr[A_i|B] = \frac{Pr[A_i \cap B]}{Pr[B]} = \frac{Pr[B|A_i] * Pr[A_i]}{\sum_{j=1}^n Pr[B|A_j] * Pr[A_j]}$$

## 2 Unabhängigkeit

Wenn das auftreten von Ereignissen unabhängig ist.  $Pr[A \cup B] = Pr[A] * Pr[B]$

## 3 Zufallsvariablen

### 3.1 Grundlagen

Anstatt der Ereignisse selbst sind wir oft an "Auswirkungen" oder "Merkmalen" der (Elementarereignisse) interessiert

Sei ein Wahrscheinlichkeitsraum auf der Ergebnismenge  $\Omega$  gegeben. Eine Abbildung  $X : \Omega \rightarrow R$  heißt (numerische) Zufallsvariable. Eine Zufallsvariable  $X$  über einer endlichen oder abzählbar unendlichen Ergebnismenge heißt **diskret**

### 3.2 Erwartungswert und Varianz

#### 3.2.1 Definition 29

Zu einer Zufallsvariablen  $X$  definieren wir den **Erwartungswert**  $E[X]$  durch  $E[X] := \sum_{x \in W_X} x * Pr[X = x]$   $\sum x * f_X(x)$ , wo  $f_X(x)$  die Dichte ist sofern  $\sum_{x \in W_X} |x| * Pr[X = x]$  konvergiert

$$E[X] = /siehe oben/ = \sum_{x \in W_X} x \sum_{\omega \in \Omega: X(\omega)=x} Pr[\omega] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) * Pr[\omega]$$

### 3.2.2 Satz 33 Linearität des Erwartungswert

$$E[a * X * b] = a * E[x] * b, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

### 3.2.3 Definition 35 Erwartungswert bei bedingter Wahrscheinlichkeit

Sei  $X$  eine Zufallsvariable &  $A$  ein Ereignis.  $f_{X|A}(x) := Pr[X = x|A] = \frac{Pr["X=x" \cap A]}{Pr[A]}$