

Instructor: Tatsunari Watanabe
TA: Carlos Salinas

Name: _____.

MA 26500-215 Quiz 10

July 25, 2016

1. Let $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ be a linear map that sends

$$T(1, 0, 0) = (3, 2, 4)$$

$$T(0, 1, 0) = (2, 0, 2)$$

$$T(0, 0, 1) = (4, 2, 3).$$

- (a) (4 points) Find the value of $T(2, 1, -1)$.

Solution: Since T is a linear map, we know that $T(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = T(\mathbf{v}) + T(\mathbf{w})$ and $T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$ so

$$\begin{aligned} T(2, 1, -1) &= T((2, 0, 0) + (0, 1, 0) + (0, 0, -1)) \\ &= T(2, 0, 0) + T(0, 1, 0) + T(0, 0, -1) \\ &= 2T(1, 0, 0) + T(0, 1, 0) - T(0, 0, 1) \\ &= 2(3, 2, 4) + (2, 0, 2) - (4, 2, 3) \\ &= (6, 4, 8) + (2, 0, 2) + (-4, -2, -3) \\ &= (6 + 2 - 4, 4 + 0 - 2, 8 + 2 - 3) \\ &= (4, 2, 7). \end{aligned}$$

- (b) (6 points) Find the matrix representation of T with respect to the standard basis on \mathbb{R}^3 .

Solution: Using the standard basis on \mathbb{R}^3 which, by the way, is the set $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, for a general vector

$$\mathbf{x} = x_1(1, 0, 0) + x_2(0, 1, 0) + x_3(0, 0, 1),$$

we have

$$T(\mathbf{x}) = (3x_1 + 2x_2 + 4x_3, 2x_1 + 0x_2 + 2x_3, 4x_1 + 2x_2 + 3x_3).$$

Thus,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + A_{13}x_3 \\ A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + A_{23}x_3 \\ A_{31}x_1 + A_{32}x_2 + A_{33}x_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ 2x_1 + 0x_2 + 2x_3 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

This tells us that the matrix must be

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

- (c) (10 points) Using the matrix representation of T , find the characteristic polynomial. **You do not have to simplify it.**

Solution: To find the minimal polynomial of T , we find

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 2 & 4 \\ 2 & 0 - \lambda & 2 \\ 4 & 2 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \\ &= (3 - \lambda) \det \begin{bmatrix} 0 - \lambda & 2 \\ 2 & 3 - \lambda \end{bmatrix} - 2 \det \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \\ &\quad + 4 \det \begin{bmatrix} 2 & 0 - \lambda \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \end{aligned}$$