

Instructor: Tatsunari Watanabe
TA: Carlos Salinas

Name: _____.

MA 26500-215 Quiz 2

July 15, 2016

1. (10 points) Given the system of linear equations

$$x - 2x_2 + x_3 - x_4 = 3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1$$

$$x_1 + x_3 - x_4 = 2$$

find its matrix representation and the reduced row-echelon form of that matrix.

A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

E. Not listed.

2. (10 points) Given the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

and the vector $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$, find the vector \mathbf{x} such that $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ by finding A^{-1} :

A. $A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

B. $A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

C. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 3 & 5 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

D. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 3 & 5 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

E. Does not exist; the matrix A is singular.