



Arrondir un nombre. À la dizaine : on regarde le chiffre des unités. De 0 à 4 → on descend. De 5 à 9 → on monte. Exemple : 347 → 350 ; 342 → 340 ; 219 → 220 (le 9 est entre 5 et 9, on monte).

Arrondir selon le contexte (quand la division ne tombe pas juste) : je fais d'abord la division, puis je me demande ce qui se passe concrètement avec le reste — je n'arrondis jamais juste « au plus proche ».

- « Combien de conteneurs / de créneaux / de postes ? » → on arrondit **vers le haut** ($13 \div 5 = 2,6$ → il faut **3** conteneurs : avec 2, il en reste dehors).

- « Combien de lots complets / de cartons entiers ? » → on arrondit **vers le bas** ($50 \div 8 = 6,25$ → **6** cartons complets, il reste 2 pièces).

Pourquoi deux règles différentes ? Dans le premier cas, le reste correspond à des véhicules ou des créneaux qu'on ne peut pas laisser de côté — il en faut un de plus. Dans le second, le reste correspond à des pièces en trop qui ne forment pas un lot complet — on ne les compte pas comme un lot de plus.

Partie 1 — arrondir un nombre.

Exemple — 68 à la dizaine (fait avec le professeur) :

Je regarde le chiffre des unités de 68 : c'est 8.
8 est entre 5 et 9, donc je **monte** à la dizaine au-dessus.
68 à la dizaine → **70**.

b) 145 à la dizaine : _____

c) 4,7 à l'unité : _____ d) 12,3 à l'unité : _____

Partie 2 — arrondir selon le contexte. Pour chaque cas : fais la division, puis choisis le bon arrondi.

Exemple — 17 pneus usagés, 1 conteneur pour 5 (fait avec le professeur) :

Je pose la division : $17 \div 5 = 3,4$.
La question, c'est « combien de conteneurs ? » — un conteneur ne se coupe pas en deux, et il en faut assez pour prendre *tous* les pneus. Avec 3 conteneurs, $5 \times 3 = 15$: il reste 2 pneus sans conteneur. J'arrondis donc **vers le haut**.
Il faut **4 conteneurs**.

f) 30 véhicules à réviser, 6 par journée. Combien de journées ? _____

g) 100 vis, sachets de 6. Combien de sachets complets ? _____

h) 45 bidons d'huile à ranger, 8 par étagère. Combien d'étagères pour tout ranger ? _____

i) 250 € de pièces à répartir en lots complets de 40 €. Combien de lots complets ? _____

Espace de calcul.

Corrigé. a) 70 b) 150 c) 5 d) 12 e) $17 \div 5 = 3,4 \rightarrow$ **4 conteneurs** (vers le haut) f) $30 \div 6 = 5 \rightarrow$ 5 journées g) $100 \div 6 = 16,6 \rightarrow$ **16 sachets** complets (vers le bas) h) $45 \div 8 = 5,6 \rightarrow$ **6 étagères** (vers le haut) i) $250 \div 40 = 6,25 \rightarrow$ **6 lots** complets (vers le bas).

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😐 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissance	Savoir-faire	Je m'évalue
L'arrondi à la dizaine ou à l'unité	Arrondir un nombre selon la règle « 0 à 4 $\rightarrow$ descend, 5 à 9 $\rightarrow$ monte »	😊 😐 😞
L'arrondi selon le contexte	Choisir le bon sens d'arrondi (vers le haut ou vers le bas) selon la situation	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur.