## Exámen Final

## Mecánica del Continuo

30 de diciembre de 2003

## 1) Elasticidad bidimensional:


Se propone el campo de tensiones siguiente:

$$\sigma_{xx} = -\frac{q}{2I} \left[ x^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2 \right] z + \frac{q}{2I} \left(\frac{2}{3}z^3 - \frac{h^2}{10}z\right)$$

$$\sigma_{zz} = -\frac{q}{2I} \left[\frac{1}{3}z^3 - \frac{h^2}{4}z + \frac{h^3}{12}\right]$$

$$\sigma_{xz} = -\frac{q}{2I} \left[\frac{h^2}{4} - z^2\right] x$$

para el problema de la viga apoyada de espesor unitario planteado en la figura:



Verificar si el campo propuesto puede ser solución del problema planteado. La constante  $I = h^3/12$ . Para ello:

- Verificar que la solución cumple la ecuación de equilibrio en el interior del dominio.
- b. Verificar que se cumplen las condiciones de borde en tensiones en las fronteras superior e inferior.
- c. Verificar que, en las fronteras izquierda y derecha, las condiciones de borde en tensiones se cumplen de forma integral. O sea, que la integral de las tracciones de superficie en dirección vertical es igual a la reacción en el apoyo. Además, verificar si la componente horizontal de las tracciones de superficie en ambas fronteras es nula.

## 2) Sea b = rot(v), mostrar que

$$\int_{S} \lambda b_{i} n_{i} dS = \int_{V} \lambda_{,i} b_{i} dV ,$$

donde  $n_i$  dS representa el diferencial de superficie S que encierra al volumen V,  $n_i$  es la normal saliente y  $\lambda = \lambda(x_i)$  es una función escalar de las coordenadas  $x_i$ .

Sugerencia: usar el teorema de Green.

- 3) Un medio continuo experimenta un desplazamiento  $u = (3X_2 4X_3)e_1 + (2X_1 X_3)e_2 + (4X_2 X_1)e_3$ , donde  $(e_1, e_2, e_3)$  es una base unitaria de  $\square$ <sup>3</sup>.
  - a. Determine la posición después de la deformación (posición desplazada) del vector que une las partículas A(1,0,3) y B(3,6,6).
  - b. Determine la posición desplazada del vector posición C(2,6,3) que es paralelo al vector que une las partículas A y B.
  - c. Muestre que los dos vectores se mantienen paralelos después de la deformación.
- 4) Si  $\dot{u} = \omega \times u$  y  $\dot{v} = \omega \times v$ , utilizando notación indicial muestre que

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \omega \times (u \times v)$$

Ayuda adicional: Teorema de Green:

$$\int_{V} \frac{\partial}{\partial x_{i}} A_{jkl\cdots} dV = \int_{S} n_{i} A_{jkl\cdots} dS$$