Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Аденоидектомия

Отстраняване на аденоидните вегетации („трета сливица“)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Допълнителни процедури по време на същата операция:
- ☐ Тонзилектомия (премахване на сливиците)
- ☐ Вентилационна тръбичка ☐ Няма _____

Показание за операцията (попълва се от лекаря):
- ☐ Запушен нос / хъркане / сънна апнея
- ☐ Течност / чести възпаления в средното ухо
- ☐ Чести аденоидити / синузит _____

Друго / пояснения: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Аденоидите („третата сливица“) са лимфна тъкан, разположена в задната част на носа над небцето, която е част от защитната система на организма. Те могат да се уголемят, особено при деца на възраст 2–7 години, а от пубертета нататък обикновено намаляват.

Уголемените аденоиди могат да запушат задната част на носа и да причинят **дишане през устата, хъркане, паузи в дишането по време на сън, хрема, носов говор и чести инфекции**. Тъй като могат да запушат и отвора на Евстахиевата тръба, която свързва ухото със задната част на носа, те могат да доведат до **натрупване на течност в средното ухо, намален слух и повтарящи се възпаления на ушите**. Продължителното дишане през устата може да повлияе и на развитието на лицето и зъбите.

Целта на аденоидектомията е да се отстрани уголемената аденоидна тъкан, за да се облекчи дишането през носа и да се намалят проблемите с ушите, синусите и дихателните пътища. Лекарят ще ви обясни отделно защо тази операция се препоръчва на вас или на вашето дете.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как се извършва процедурата?

Операцията се извършва под обща анестезия в операционна зала. Тя се прави през устата; **отвън няма разрези или белези.**

1. **Подготовка:** След въвеждането в анестезия се поставя специален инструмент, който държи устата отворена, а мекото небце внимателно се повдига, за да се види задната част на носа.
2. **Отстраняване на аденоидите:** Аденоидите се отстраняват от задната част на носа с кюрета (специален инструмент за изстъргване), микродебридер под ендоскопски контрол, коблация или електрокоагулация. Тъй като аденоидите са тъкан, а не отделен орган, те не могат да бъдат премахнати „из корен“; целта е безопасно да се отстрани частта, която причинява запушването.
3. **Овладяване на кървенето:** Областта се притиска за кратко с тампон и при нужда кървенето се спира с електрокоагулация. В края на операцията в задната част на носа не се оставя тампон.
4. **Допълнителни процедури:** Ако е планирано, по време на същата анестезия се извършва премахване на сливиците (тонзилектомия) или поставяне на вентилационни тръбички в тъпанчетата. За тези процедури се попълват отделни формуляри за съгласие.
5. **Събуждане:** След операцията пациентът се наблюдава внимателно в зала за събуждане, докато се събуди напълно.

Ако лекарят прецени, че е необходимо, отстранената тъкан се изпраща за хистологично изследване.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия	Около 20–30 минути (без времето за анестезия)	Обикновено изписване в същия ден; при нужда една нощ наблюдение

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Облекчено дишане през носа, по-малко хъркане и по-малко паузи в дишането по време на сън
- По-качествен сън и в резултат — подобрено внимание през деня, поведение и успех в училище
- По-рядко натрупване на течност в средното ухо и по-малко ушни възпаления, което подпомага подобряването на слуха
- По-малко хрема, синузити и инфекции на горните дихателни пътища

При правилно подбрани пациенти запушването на носа и хъркането се подобряват значително в по-голямата част от случаите. Ако обаче запушването има и други причини — например алергия, уголемени носни конхи или изкривена носна преграда — оплакванията може да не изчезнат напълно. При проблеми с ушите успехът зависи и от развитието на Евстахиевата тръба; при някои деца може да е необходимо допълнително лечение или вентилационни тръбички.

4 Други възможности за лечение

- **Наблюдение:** Ако оплакванията са леки, може да се изчака с редовни прегледи, тъй като аденоидите намаляват с възрастта.
- **Медикаментозно лечение:** Назалните спрейове с кортикостероид могат временно да намалят отока на аденоидите и запушването при някои деца; при алергия се провежда лечение на алергията. Ефектът обикновено продължава, докато се използва лекарството.
- **Само вентилационни тръбички при проблеми с ушите:** В някои случаи може да се обсъди поставяне само на тръбички в тъпанчетата, без отстраняване на аденоидите.
- **Други методи при сънна апнея:** В много редки случаи, когато операцията не е подходяща, по време на сън може да се използва апарат за дишане с положително налягане (CPAP).

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако операцията не бъде извършена, аденоидите могат сами да намалеят в пубертета. Дотогава обаче дишането през устата, хъркането, лошият сън, честите инфекции и намаленият слух поради течност в ухото може да продължат. Продължителните и тежки нарушения на дишането по време на сън при децата могат да доведат до изоставане в растежа и развитието, проблеми с вниманието и поведението, а рядко и до натоварване на сърцето и белите дробове. Дълго задържащата се течност в средното ухо може да повлияе на развитието на говора и да причини трайни промени в тъпанчето.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят кръвни изследвания (особено за кръвосъсирването) и при нужда други изследвания; ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- Задължително съобщете, ако в семейството има склонност към лесно кървене, кръвонасядания или заболяване на кръвосъсирването.
- През последните **6 часа** преди операцията не трябва да се дава твърда храна и мляко; за бистрите течности спазвайте срока, определен от анестезиолога.
- Моля, уведомете ни, ако през последните 2–3 седмици преди операцията е имало температура, диария, кашлица или грип; може да се наложи операцията да бъде отложена.
- Ако има клатещ се млечен зъб, кажете на лекаря, тъй като той може да падне по време на анестезията.
- Препоръчваме да подготвите детето си за операцията с подходящи за възрастта му думи, които не го плашат.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Денят на операцията	След събуждането може да има леко болно гърло, кървениста слуз от носа и дишане през устата. Възможни са повръщане или леко повишена температура. След като гаденето отмине, първо се дава вода, а след това хладка, мека храна. Повечето пациенти се прибират у дома в същия ден.
Първите 3–5 дни	Запушването на носа и хъркането може все още да продължават поради отока; възможни са лош дъх от устата, леко повишена температура, болка в ушите и във врата. Болката обикновено е лека и се овладява с обезболяващите, препоръчани от лекаря. Приемът на много течности е важен.
1-ва седмица	

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	Повечето деца могат да се върнат на училище/детска градина след 3–7 дни, а възрастните — на работа. През първата седмица избягвайте многолюдни места и контакт с болни хора.
2–4-та седмица	С отзвучаването на отока дишането през носа се подобрява осезаемо. Ако има временен носов говор, той обикновено отминава в този период. Плуването и натоварващият спорт обикновено са разрешени след 2 седмици.
1–3-ти месец	Извършва се контролен преглед; ако операцията е направена заради проблеми с ушите, състоянието им се оценява с аудиометрия и тимпанометрия.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Леко болно гърло, дискомфорт при преглъщане
- Кървениста слуз от носа и запушен нос няколко дни
- Лош дъх (от заздравяващата повърхност; отминава за 1–2 седмици)
- Болка, излъчваща се към ухото (отразена болка по общи нерви; не означава, че има заболяване на ухото)
- Леко повишена температура (първите 1–2 дни), гадене и повръщане от анестезията

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Временен носов говор** — След отстраняване на аденоидите небцето се нуждае от време, за да се адаптира; при говор въздухът може да излиза през носа в продължение на няколко дни до няколко седмици, а понякога течности да се връщат през носа. Обикновено отминава от само себе си в рамките на 1–2 месеца.
- **Болка и скованост във врата** — Поради положението по време на операцията и заздравяването в задната част на носа движенията на врата може да са болезнени през първите дни; обикновено отминава за няколко дни.
- **Непълно отзвучаване на оплакванията** — Ако има допълнителни причини, като алергия, уголемени носни конхи или изкривена носна преграда, запушването на носа може частично да остане; може да е необходимо допълнително лечение.

Нечести състояния

- **Кървене** — Значимо кървене след операцията се наблюдава при **по-малко от 1 на 100 пациенти (около 0,5–1 на 100)**. Най-често се случва през първите 24 часа. Ако кървенето не може да бъде спряно, може да се наложи **връщане в операционната под обща анестезия за овладяването му**. Кръвопреливане е необходимо много рядко.
- **Увреждане на зъб** — Натискът на инструмента, който държи устата отворена, може да отчупи или избие зъб, особено ако той вече е клатещ се или кариозен.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Нараняване или оток на устните, езика или небцето** — От допира на инструментите може да се появят малки рани или временен оток; те заздравяват за няколко дни.
- **Инфекция** — Може да се прояви с повишаване на температурата, засилване на лошия дъх и на болката; обикновено се повлиява от антибиотици.
- **Повторно нарастване на аденоидите** — Аденоидната тъкан може да нарасне отново (при около **1–5 на 100** пациенти), особено при оперирани в много ранна възраст и при деца с алергия. Ако оплакванията се възобновят, рядко може да е необходима повторна операция.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Траен носов говор / връщане на течности през носа (велофарингеална недостатъчност)** — Среща се при около **1 на 1500–3000** пациенти; рискът е по-висок при деца със скрита цепка на небцето (субмукозна цепка). Обикновено се подобрява с логопедична терапия; рядко може да е необходима коригираща операция. Затова небцето се преглежда внимателно преди операцията.
- **Разместване (сублуксация) на горните шийни прешлени (синдром на Гризел)** — **Много рядко** състояние, при което възпалението в задната част на носа засяга връзките на горните шийни прешлени. Проявява се с болка във врата, която започва в дните след операцията и постепенно се засилва, невъзможност за завъртане на главата и наклонено настрани положение на главата. При ранно откриване се лекува с лекарства и шийна яка; при закъсняла диагноза може да е необходимо по-продължително лечение, рядко и операция, като може да остане трайно ограничение в движенията на врата. Затова постепенно засилващата се болка във врата трябва винаги да бъде съобщена.
- **Сраствания или стесняване в задната част на носа** — Много рядко, особено когато заедно с тонзилектомия се отстранява голямо количество тъкан, по време на заздравяването може да се развие стесняване в задната част на носа; то може да причини запушване и да наложи допълнително лечение.
- **Тежко кървене и неговите последици** — Изключително рядко, при наличие на необичайно разположен кръвоносен съд или неразпознато нарушение на кръвосъсирването, може да възникне тежко кървене. В такъв случай може да са необходими спешна операция, кръвопреливане и лечение в **интензивно отделение**; попадането на кръв в дихателните пътища може да причини проблеми с дишането.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Прясна, червена кръв** от устата или носа, изплюване или повръщане на кръв (всяко кървене, по-голямо от няколко капки, трябва да бъде съобщено)
- Често преглъщане (при децата важен признак, че кръвта се поглъща), бледост, отпадналост
- **Температура над 38,5 °C** или температура, която не спада след обезболяващи
- Пълен отказ от течности, липса на уриниране в продължение на 6–8 часа, необичайна сънливост (признаци на обезводняване)
- Постепенно засилваща се **болка във врата**, невъзможност за завъртане на главата или наклонено настрани положение на главата
- Затруднено дишане или изразени паузи в дишането по време на сън

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- При болка използвайте само **обезболяващите, препоръчани от лекаря**; аспирин и лекарства, съдържащи аспирин, не трябва да се приемат, тъй като могат да засилят кървенето.
- През първите дни се препоръчват хладки или студени меки храни и **много течности**; избягвайте много горещи, твърди и люти храни.
- През първата седмица не издухвайте силно носа.
- Ако през първата седмица след операцията е планиран обратен полет към чужбина, обсъдете с лекаря кога най-рано е безопасно да летите; поради риска от кървене е препоръчително през първите дни да сте близо до лекаря си.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Беше ми обяснено, че през първите дни след операцията, особено при моето дете, трябва да следя за признаци на кървене (често преглъщане, изплюване или повръщане на кръв) и да се свържа с лекаря.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.