Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Горна / долна блефаропластика

Естетична операция на клепачите

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Планирана област: ☐ Горни клепачи ☐ Долни клепачи ☐ Горни + долни клепачи

Техника за долния клепач: ☐ Трансконюнктивална ☐ Субцилиарна (под миглите) ☐ Не се прилага _____

Допълнителни процедури: ☐ Преместване (репозициониране) на мастна тъкан ☐ Кантопексия / кантопластика ☐ Няма _____

Показание: ☐ Естетично ☐ Функционално (стеснено зрително поле) ☐ И двете _____

Оплакване и очаквания на пациента: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

С възрастта кожата на клепачите губи еластичността си, мускулът около окото се отпуска, а мастната тъкан в очната кухина може да се издаде напред. В резултат на това по горните клепачи се образува **излишна, надвиснала кожа**, а под очите — **торбички и вдлъбнатини**. Генетичната предразположеност, слънцето, тютюнопушенето и промените в теглото могат да ускорят този процес.

Блефаропластиката има за цел да придаде на областта около очите **по-свеж, отпочинал и естествен** вид чрез отстраняване на излишната кожа, мускул и мастна тъкан или чрез преместване на мастната тъкан. Понякога надвисването на горния клепач е толкова изразено, че стеснява горната част на зрителното поле; в такъв случай операцията има и функционална цел — **разширяване на зрителното поле**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Блефаропластиката сама по себе си не коригира ниско разположените вежди, спуснатия клепач поради слабост на мускула, който повдига клепача (птоза), финитe бръчки около очите („пачи крачета“) и тъмните кръгове под очите; за тези състояния може да са необходими други методи на лечение.

2 Как се извършва процедурата?

Преди операцията очите ви се преглеждат — оценяват се зрението, отделянето на сълзи и функцията на клепачите — и се правят снимки. При необходимост се прави консултация с офталмолог (очен лекар).

1. **Маркиране:** Количеството кожа, което ще бъде отстранено, се отбелязва внимателно в седнало положение, при отворени и затворени очи.
2. **Горен клепач:** Разрезът се прави в естествената гънка на клепача, така че да остава скрит в нея, когато очите са отворени. Отстранява се излишната кожа, а при нужда — тънка ивица мускул и издадената мастна тъкан.
3. **Долен клепач – трансконюнктивална техника:** Разрезът се прави от вътрешната страна на клепача, затова отвън не остава белег. Мастната тъкан, която образува торбичките, се отстранява или се премества, за да запълни вдлъбнатината под окото.
4. **Долен клепач – субцилиарна техника:** Ако има и излишна кожа, разрезът се прави непосредствено под миглите и се отстраняват излишните кожа и мускул. С времето белегът обикновено става незабележим.
5. **Опора на клепача (кантопексия/кантопластика):** Ако долният клепач е отпуснат, във външния ъгъл на окото се поставят поддържащи шевове, за да не се изтегля клепачът надолу след операцията.
6. **Затваряне:** Разрезите се затварят с много фини конци, които обикновено се свалят на **5–7-ия ден**. В окото се поставя защитен мехлем.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Местна анестезия (± седация) или обща анестезия	Около 1–3 часа	Обикновено изписване в същия ден; при обща анестезия може да се наложи 1 нощ в болница

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- По-свеж, отпочинал и младежки вид на областта около очите
- Намаляване на усещането за тежест в горните клепачи; по-лесно виждане, ако надвисването стеснява зрителното поле
- Намаляване на торбичките под очите и по-плавен преход към бузата

Повечето пациенти са доволни от резултата и ефектът обикновено се запазва дълги години; тъй като стареенето продължава, с времето кожата може отново да се отпусне. При около **2–5 от 100** пациенти може да е необходима малка корекция поради асиметрия, недостатъчна корекция или белег. Окончателният резултат обикновено се вижда в рамките на **3–6 месеца**.

4 Други възможности за лечение

- **Да не се оперирате:** Тъй като процедурата е естетична, винаги имате възможност да не я направите.
- **Филър под очите:** При лека вдлъбнатина може временно да я прикрие; не коригира торбичките и излишната кожа и носи свои специфични рискове.
- **Повдигане на веждите с ботулинов токсин:** При леки случаи повдигането на веждата с няколко милиметра може леко да отвори горния клепач; ефектът е временен.
- **Повдигане на веждите (темпорален лифт / лифт на челото):** Ако причината е ниско разположената вежда, тази операция може да е по-подходяща вместо блефаропластика или в комбинация с нея.
- **Процедури за подмладяване на кожата (лазер, химичен пилинг, радиочестотни процедури):** Могат да подобрят финитe бръчки и качеството на кожата; не премахват изразена излишна кожа и торбички.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако операцията не бъде извършена, сегашният вид на клепачите ви ще се запази и може бавно да се влошава с възрастта. Ако надвисването на горния клепач стеснява зрителното поле, това може да се засили с времето; обикновено обаче не представлява спешна опасност за здравето на очите.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят кръвни изследвания; ако се планира обща анестезия или седация, ще бъдете прегледани от анестезиолог и трябва да сте на гладно.
- Задължително ни съобщете, ако имате **синдром на сухото око, глаукома (повишено очно налягане), заболяване на щитовидната жлеза или сте имали операции на очите (напр. лазерна корекция на зрението)**.
- Ако носите контактни лещи, не ги поставяйте в деня на операцията; след нея ще трябва да носите очила.
- В деня на операцията не използвайте грим за очи, изкуствени (удължени) мигли и крем за лице. След седация или обща анестезия не шофирайте; приберете се с придружител.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 48 часа	Около очите може да има оток, усещане за опъване, лека секреция от разрезите и кръвонасядания. Болката обикновено е слаба. Спането с повдигната глава и **студените компреси** намаляват отока. Възможни са сълзене, чувствителност към светлина и временно замъглено виждане (заради мехлема).
1-ва седмица	Конците обикновено се свалят на **5–7-ия ден**. Кръвонасяданията и отокът значително намаляват. Капките и мехлемът за очи се използват според препоръките. Повечето пациенти се връщат към офис работа и социален живот в рамките на 7–10 дни; кръвонасяданията могат да се прикрият с грим.
2–4-та седмица	Остатъчният оток намалява. Контактни лещи обикновено могат да се носят след **2 седмици**. Тежките физически натоварвания и работата с навеждане се отлагат за около 2–3 седмици. За плуване и грим за очи изчакайте одобрението на лекаря.
1–6-и месец	Зачервяването на белега постепенно избледнява и той става незабележим в гънката на клепача. Окончателната форма и симетрия на клепачите обикновено се установяват в рамките на **3–6 месеца**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Оток и усещане за опъване около очите; кръвонасядания, **ако се появят**, изчезват за 1–2 седмици
- Сълзене, усещане за сухота или пясък в очите, парене и чувствителност към светлина (първите дни)
- Леко затруднение при пълното затваряне на очите през първите дни
- Зачервяване, леко втвърдяване и изтръпване по линията на разреза

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Сухота в очите (синдром на сухото око)** — При около **10–25 от 100** пациенти се появява парене, смъдене или усещане за сухота; обикновено отшумява с капки за очи в рамките на няколко седмици до няколко месеца. При хора, които и преди операцията имат сухота в очите, може да е по-изразено и по-продължително.
- **Оток на бялото на окото (хемоза)** — Оток на конюнктивата — тънката прозрачна обвивка, която покрива бялото на окото; среща се особено след операция на долния клепач. Обикновено отшумява с капки и компреси в рамките на няколко седмици.
- **Непълно затваряне на очите (лагофталм)** — През първите седмици след операция на горния клепач често очите не се затварят напълно по време на сън; обикновено това преминава от само себе си. През този период се препоръчва нощен мехлем за защита на окото. Рядко е трайно (**по-малко от 1 на 100**).
- **Малки кистички (милиуми) и следи от конците** — По линията на разреза може да се появят малки бели точици; изчезват сами или се отстраняват с проста процедура.

Нечести състояния

- **Изтегляне надолу или извиване навън на долния клепач (ретракция, ектропион)** — След операция на долния клепач при около **1–5 от 100** пациенти (по-често при субцилиарната техника) клепачът може да се изтегли надолу, под ириса да се вижда повече от бялото на окото или клепачът да се извие навън. Повечето случаи се подобряват с масаж и лепенки (тейпинг); ако състоянието остане, може да причини сухота и сълзене на окото и да наложи **коригираща операция**.
- **Асиметрия и недостатъчна или прекомерна корекция** — Между двата клепача може да остане разлика във височината на гънката или във формата; при отстраняване на твърде много кожа затварянето на очите може да е затруднено, а при отстраняване на твърде много мастна тъкан — да се получи хлътнал вид. Може да е необходима корекция.
- **Промяна във формата на очния ъгъл** — При пациентите, на които е направена опора на клепача (кантопексия/кантопластика), външният ъгъл на окото може известно време да изглежда опънат, повдигнат нагоре или закръглен или да има разлика между двете страни. В повечето случаи това се смекчава за няколко седмици до месеци с отшумяването на отока; рядко е необходима корекция.
- **Проявяване на спуснат клепач (птоза)** — Слабост на мускула, който повдига клепача, прикрита преди това от излишната кожа, може да стане видима след операцията; може да се наложи отделна операция за корекцията ѝ.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Видим или задебелен белег** — Кожата на клепачите обикновено заздравява много добре; рядко белегът може да остане видим или във вътрешния ъгъл да се образува тънка гънка (мембрана).
- **Кървене и събиране на кръв (хематом)** — Събиране на кръв под кожата се среща при около **1 от 100** пациенти; обикновено се резорбира от само себе си, но ако е голямо, може да се наложи да бъде изпуснато.
- **Инфекция** — Тъй като клепачите са много добре кръвоснабдени, инфекцията е рядка (**по-малко от 1 на 100**); ако се развие, се лекува с антибиотици.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Кръвоизлив зад окото и загуба на зрение** — Това е най-сериозното, но много рядко усложнение. Кръвоизлив зад окото се среща при около **1 на 2000** пациенти и може да притисне зрителния нерв. Ако не бъде разпознат бързо и лекуван спешно (отваряне на шевовете, изпускане на кръвта, лекарства, спешна операция), той може да доведе до **трайна загуба на зрението**. Трайна загуба на зрение е описана при около **1 на 10 000–40 000** пациенти или по-рядко. Затова предупредителните признаци през първите 48 часа са толкова важни.
- **Двойно виждане** — Дължи се на засягане на малък мускул, който движи окото (долен кос мускул), при операция на долния клепач; обикновено е временно, много рядко е трайно и може да наложи допълнително лечение или операция.
- **Драскотина или язва на роговицата** — По прозрачната предна повърхност на окото може да се получи драскотина, която причинява болка, усещане за пясък и сълзене; обикновено заздравява с капки за няколко дни. Много рядко може да е необходимо продължително очно лечение.
- **Проблеми със слъзните пътища** — Сълзене поради засягане на слъзния канал е много рядко.
- **Психологическа неудовлетвореност** — Въпреки технически успешния резултат човек може трудно да свикне с новия си външен вид. Откритото обсъждане на очакванията преди операцията намалява този риск.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Силна, засилваща се болка в окото**, особено от едната страна
- **Изпъкване на окото напред** или бързо нарастващ, напрегнат оток и кръвонасядане на клепачите
- **Намалено зрение**, потъмняване на зрението, двойно виждане или ограничени движения на окото
- Болка в окото, придружена от гадене или повръщане
- **Температура над 38,5 °C**, засилващо се зачервяване, секреция или болка в областта на разреза
- Силна чувствителност към светлина и усещане за пясък, което не отминава
- **Ако някое от тези състояния се появи през първите 48 часа, всяка минута е важна: обадете се веднага или отидете в най-близкото спешно отделение.**

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- През първите 48 часа прилагайте студени компреси през равни интервали; спете по гръб с повдигната глава.
- Не търкайте очите си. През първите дни избягвайте вдигане на тежести, навеждане, напъване и дейности, които увеличават риска от кървене.
- Използвайте предписаните капки и мехлеми за очи толкова често, колкото е препоръчано; ако очите ви не се затварят напълно, задължително слагайте нощния мехлем.
- Обикновено не носете контактни лещи 2 седмици, а грим за очи — 1–2 седмици. Навън носете слънчеви очила и правете чести почивки пред екрана.
- Ако сте пристигнали от чужбина, пътуването със самолет обикновено е безопасно след сваляне на конците (5–7-и ден).
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че блефаропластиката сама по себе си не коригира ниско разположените вежди, спуснатия клепач поради слабост на мускула, който го повдига, фините бръчки и тъмните кръгове под очите.
- ☐ Разбирам, че ако през първите 48 часа след операцията получа силна болка в окото, оток или намаляване на зрението, трябва **незабавно** да потърся помощ.
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.