Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Лечение с ботулинов токсин (ботокс)

Инжекционно лечение на мимически бръчки, увеличен дъвкателен мускул (масетер) или прекомерно изпотяване

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Място на процедурата: _____

Име на продукта / марка: _____

Партиден номер (LOT) и срок на годност: _____

Общ брой единици и разреждане: _____

Третирани зони:
☐ Чело ☐ Между веждите ☐ Около очите („пачи крачета“)
☐ Масетер (дъвкателен мускул) ☐ Шия
☐ Изпотяване (подмишници / длани) ☐ Друго _____

Цел на лечението:
☐ Естетична ☐ Медицинска (скърцане със зъби, изпотяване и др.)
_____

Зона извън одобрените показания (off-label):
☐ Няма ☐ Има — зона: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Ботулиновият токсин е пречистен белтък, който временно намалява връзката между нерва и мускула, в който се инжектира, така че мускулът се съкращава по-слабо. С естетична цел се използва за омекотяване на **мимическите бръчки** по челото, между веждите и около очите. Прилага се и като медицинско лечение при скърцане със зъби (бруксизъм) и уголемяване на дъвкателния мускул (масетер), при вертикални ивици на шията и при **прекомерно изпотяване** (хиперхидроза).

Мимическите бръчки се образуват с годините от многократното съкращаване на едни и същи мускули и намаляването на еластичността на кожата. Ефектът е **временен**: мускулът постепенно възстановява

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

функцията си и ако лечението не се повтори, видът бавно се връща към изходното състояние. Целта е **естествен, отпочинал** вид, без да се „замразява“ мимиката.

2 Как се извършва процедурата?

Процедурата се извършва в клиниката след кратка консултация и преглед. Оценява се мимиката ви, отбелязват се точките за инжектиране и при необходимост се правят снимки преди процедурата.

1. **Подготовка:** Гримът се отстранява, а кожата се почиства с антисептичен разтвор. Ако сте чувствителни към болка, може да се постави лед или крем с местен анестетик.
2. **Инжектиране:** С много тънка игла в отбелязаните точки се инжектира малко количество от продукта. Всяко инжектиране трае няколко секунди; усеща се леко убождане или парене.
3. **Завършване:** Върху местата на убождане се оказва лек натиск. Малките подутини изчезват за няколко минути.
4. **Документиране:** Името на продукта, партидният номер (LOT), общият брой единици и третираните зони се вписват в досието ви.

Някои зони и цели на лечение може да не са включени в одобрените указания за употреба на продукта в Турция (**употреба извън одобрените показания, „off-label“**); например лечението на масетера (дъвкателния мускул) и скърцането със зъби, на шията и на изпотяването на дланите не е сред одобрените показания на много продукти. Въпреки че такава употреба е широко разпространена и приета в медицинската литература, лекарят ще ви обясни отделно дали планираната при вас зона попада в тази категория и това ще бъде отбелязано в съответното поле на формуляра.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обикновено не е необходима; при желание — лед или анестетичен крем	Около 10–20 минути	Същия ден; наблюдение 15–30 минути след процедурата

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Омекотяване на мимическите бръчки по челото, между веждите и около очите и по-отпочинал вид
- При лечение на масетера — по-малко оплаквания от скърцане със зъби и по-фина линия на долната челюст
- При лечение на изпотяването — значително намаляване на потенето
- Кратка процедура без хирургически разрези, след която можете веднага да се върнете към ежедневието си

Ефектът обикновено започва в рамките на **3–14 дни**, достига максимума си около 2-рата седмица и продължава средно **3–4 месеца** в мимическите зони (при изпотяване и масетер може да е по-дълъг). Степента и продължителността на ефекта са индивидуални. Много дълбоките, трайни бръчки може да не изчезнат напълно. При нужда около 2-рата седмица се прави контролен преглед и когато лекарят прецени, може да се направи малка допълнителна корекция.

4 Други възможности за лечение

- **Без лечение:** Тъй като процедурата е естетична, винаги имате възможност да не я правите.
- **Филъри (пълнители):** Може да са по-подходящи за бръчки, причинени от загуба на обем, а не от движение.
- **Грижа за кожата и методи за подмладяване:** Кремове с ретиноиди, химичен пилинг, лазер или мезотерапия могат да подобрят качеството на кожата, но не намаляват движението на мимическите мускули.
- **Хирургични методи:** Операции като повдигане на веждите или лицето могат да дадат по-траен резултат при наличие на отпускане.
- **При медицински показания:** Нощна шина (предпазител за зъбите) при скърцане със зъби; антиперспиранти и лекарства при изпотяване.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако процедурата не се извърши, сегашният ви вид или оплаквания ще следват естествения си ход. С възрастта мимическите бръчки може постепенно да станат по-видими; това не представлява опасност за здравето ви.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Процедурата **не се извършва или се отлага** в следните случаи: бременност, кърмене, нервно-мускулни заболявания като **миастения гравис**, амиотрофична латерална склероза (АЛС) или синдром на Ламбърт–Итън, активна инфекция в третираната зона, известна алергия към продукта, а при някои продукти — алергия към белтъка на кравето мляко. Моля, кажете ни, ако някое от тези състояния се отнася за вас.
- **Антибиотиците от групата на аминогликозидите** (напр. гентамицин) и някои мускулни релаксанти могат да засилят ефекта на ботулиновия токсин; уведомете ни, ако ги приемате.
- Ако сте имали лечение с ботулинов токсин преди, кажете ни кога, с какъв продукт и какъв е бил резултатът.
- За да се намали рискът от кръвонасядания, ако е възможно и след консултация с лекаря, спрете аспирина и подобни лекарства няколко дни преди процедурата.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 4 часа	Не лягайте, не масажирайте и не натискайте третираната зона. Това помага продуктът да остане там, където е поставен. По местата на убождане може да има леко зачервяване и малки подутини.
Първият ден	Избягвайте усилени физически натоварвания, сауна, турска баня, солариум и много топла среда. Гримът може да се постави след няколко часа. Може да се появи леко главоболие; минава с обикновени обезболяващи.
3–14-и ден	Ефектът започва постепенно. **Ако** по местата на убождане се появят малки кръвонасядания, те изчезват в рамките на седмица. През този период не правете козметични процедури, кожни третирания или масаж на лицето.
2-ра седмица	Ефектът достига максимума си. При нужда се прави контролен преглед; при асиметрия или недостатъчен ефект, след преценка на лекаря, може да се планира малка допълнителна корекция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

3–4-ти месец и след това	Ефектът постепенно отслабва. Обикновено се препоръчва интервал от поне 3 месеца между процедурите.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Лека болка, зачервяване и малки подутини по местата на убождане (отшумяват за минути до часове)
- Малки кръвонасядания; **ако** се появят, изчезват за няколко дни до седмица
- Леко усещане за тежест или опъване в челото (първите 1–2 седмици)

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Главоболие** — Особено след първа процедура при около **1–10 от 100** пациенти през първите дни се появява леко главоболие; обикновено отминава за няколко дни.
- **Лека асиметрия или недостатъчен ефект** — Тъй като силата на мускулите е различна при отделните хора, може да останат малки разлики между двете страни или ефектът да е по-слаб от очаквания. Това се оценява на контролния преглед след 2 седмици.
- **Прекомерно повдигнат външен край на веждата („вежда на Спок“)** — След лечение на челото външният край на веждата може да се повдигне прекалено; обикновено се коригира с малко допълнително инжектиране.

Нечести състояния

- **Спускане на горния клепач (птоза)** — След лечение между веждите или на челото при около **1–5 от 100** пациенти се появява леко спускане на горния клепач. То е **временно** и обикновено отзвучава за 2–6 седмици. През този период може да бъдат предписани капки за очи, които временно повдигат клепача и подобряват вида му.
- **Спускане на веждата и тежест в челото** — Дължи се на прекомерно отпускане на челния мускул; подобрява се с отслабването на ефекта (седмици до няколко месеца).
- **Асиметрична усмивка, отслабено движение на устните, изтичане на течност от устата** — Може да се появи при лечение на долната част на лицето и масетера, ако продуктът засегне съседни мускули; временно е, но може да продължи няколко седмици до месеци.
- **Сухота в очите, сълзене или двойно виждане** — Срещат се понякога при лечение около очите и са временни. Уведомете лекаря си, ако се появи двойно виждане.
- **Затруднено преглъщане, слабост в шията** — Може да се появи при лечение на шията; обикновено е леко и временно.
- **Намалена сила на дъвкане, хлътнали бузи** — При лечение на масетера дъвченето на твърда храна може временно да е уморително; много рядко бузата може да изглежда леко хлътнала или усмивката — неравна.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Слабост в ръката след лечение на дланите** — След инжектиране в дланите за лечение на изпотяване силата на хвата на пръстите може временно да намалее, а самите инжекции могат да бъдат доста болезнени. Слабостта обикновено отзвучава в рамките на няколко седмици.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Разпространение на ефекта към отдалечени области** — Много рядко, особено при високи дози, ефектът на продукта може да се разпространи извън третираната зона и да причини обща мускулна слабост, замъглено зрение или **затруднено говорене, преглъщане или дишане**. Това налага **спешно лечение**; може да се наложи болнично лечение и дихателна поддръжка. При дозите, използвани с естетична цел, това е изключително рядко.
- **Тежка алергична реакция** — Тежката алергична реакция (анафилаксия) с уртикария, оток на лицето и устните или задух е изключително рядка; изисква спешна помощ.
- **Липса на ефект (образуване на антитела)** — Много рядко организмът образува антитела срещу продукта и следващите процедури може да не дадат резултат. Честото прилагане на високи дози увеличава този риск.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Прималяване (вазовагална реакция):** По време на инжекция или вземане на кръв може да се появят световъртеж, изпотяване и кратка загуба на съзнание; отминава бързо в легнало положение.
- **Инфекция:** Благодарение на дезинфекцията на кожата и стерилните материали рискът е много нисък; ако възникне, обикновено се лекува с антибиотици.
- **Алергична реакция:** Към използвания продукт, местния анестетик или антисептика — от леко зачервяване до, много рядко, тежка алергична реакция (анафилаксия). Клиниката ни разполага с оборудване и лекарства за спешна помощ.
- **Активиране на херпес:** Ако в миналото сте имали херпес, той може да се появи отново в третираната област; моля, уведомете ни.
- **Резултат, който не отговаря на очакванията:** Степента и продължителността на ефекта са индивидуални; може да са необходими допълнителни сеанси или корекция.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Затруднено преглъщане, говорене или дишане** или изразена мускулна слабост
- **Замъглено или двойно виждане** или невъзможност да отворите клепача
- Бързо развиващ се оток на лицето, устните или езика, уртикария или задух (алергична реакция)
- Засилваща се болка, зачервяване, затопляне или гнойна секреция в третираната зона

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- През първите 4 часа не лягайте и не масажирайте зоната; през първия ден избягвайте усилени натоварвания, сауна и турска баня.
- Ако, докато ефектът продължава, ви предстои инжектиране на ботулинов токсин, масаж на лицето или кожни процедури при друг лекар, уведомете го за това лечение.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Ако планирате бременност по време на курса на лечение, обсъдете това с лекаря си.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.

☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

12 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

13 Декларация на пациента

☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Бях попитан/а за състояния, които правят лечението неподходящо (бременност, кърмене, нервно-мускулни заболявания, лекарства), и дадох вярна информация.
- ☐ Разбирам, че ефектът на ботулиновия токсин е временен и че за поддържането му лечението трябва да се повтаря на редовни интервали. Беше ми обяснено, че някои третирани зони може да са извън одобрените указания за употреба на продукта.
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.