Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Дълбок лифтинг на шията

Deep neck lift / лифтинг на шията в дълбока равнина (deep plane)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Планирани компоненти на операцията:

- ☐ Платизмопластика
- ☐ Отстраняване на дълбока мазнина
- ☐ Изтъняване на двукоремествия мускул
- ☐ Частично намаляване на подчелюстната жлеза
- ☐ Отстраняване на излишна кожа

Едновременен лифтинг на лицето: ☐ Не ☐ Да (с отделен формуляр за съгласие) _____

Други процедури, които ще се извършат едновременно: _____

Оплакване и очаквания на пациента: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

С възрастта, при промени в теглото или поради наследствени особености по шията може да се появят **пълнота под брадичката („двойна брадичка“)**, заличаване на ъгъла между челюстта и шията, **вертикални ивици** (ивици на мускула платизма) и **отпусната кожа**. Този вид често се дължи не само на мазнината под кожата, но и на **дълбоката мазнина под мускула на шията, мускулите под брадичката (двукоремести мускули) и увисването на слюнчените жлези (подчелюстни жлези)**.

Дълбокият лифтинг на шията третира и тези дълбоки структури, като целта е да се очертае линията на челюстта и да се постигне **по-млада, ясно очертана и естествено изглеждаща** шия. Резултатът зависи от еластичността на кожата, костната структура, теглото и възрастта ви. Операцията не спира стареенето; с времето шията продължава постепенно да се отпуска.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как се извършва процедурата?

Операцията обикновено се извършва под обща анестезия в операционна зала. Преди това шията ви се преглежда в седнало и изправено положение, снима се и се маркира, а структурите, които ще бъдат третирани, се определят заедно с вас.

1. **Разрези:** Прави се разрез с дължина около 3–5 см в естествената гънка под брадичката. Ако ще се отстранява излишна кожа, се добавят разрези около долната (меката) част на ухото, които продължават зад него към линията на косата. Разрезите се скриват, доколкото е възможно, в естествените гънки и в окосмената част.
2. **Повдигане на кожата:** Кожата на шията внимателно се отделя от подлежащия мускул; при нужда повърхностната мазнина се изтънява равномерно.
3. **Отстраняване на дълбоката мазнина:** Дълбоката мазнина под мускула на шията (платизма), която не може да бъде достигната с липосукция отвън, се намалява контролирано.
4. **Двукоремест мускул и подчелюстни жлези:** При нужда предната част на двукоремеството (дигастралния) мускул, която създава пълнота под брадичката, се изтънява. Ако подчелюстната слюнчена жлеза е увиснала и изпъква, изпъкващата ѝ част може да бъде частично намалена; жлезата не се отстранява изцяло.
5. **Платизмопластика:** Разделените по средата на шията краища на мускула платизма, които образуват ивици, се зашиват един към друг и се създава „вътрешен корсет“; при нужда мускулът се изтегля и закрепва и встрани.
6. **Отстраняване на излишната кожа и затваряне:** Кожата се изтегля нагоре и назад без напрежение и излишъкът се отстранява. Извършва се внимателна хемостаза (спиране на кървенето), обикновено се поставя **дрен** (тънка тръбичка за изтичане на течност), разрезите се затварят с фини шевове и се поставя превръзка на шията.

Планираните етапи са индивидуални; не всяка стъпка се прилага при всеки пациент. Ако едновременно ще се извърши лифтинг на лицето, за него се подписва **отделен формуляр за съгласие**.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия (при подбрани пациенти – седация и местна анестезия)	Около 2–4 часа (по-дълго при съчетани процедури)	Обикновено една нощ в болница

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- По-ясно очертана линия на челюстта и ъгъл между челюстта и шията
- Намаляване на пълнотата под брадичката и на вертикалните ивици по шията
- Стягане на отпуснатата кожа на шията и по-млад, свеж вид

Повечето правилно подбрани пациенти са доволни от резултата. По-голямата част от отока отзвучава през първите 4–6 седмици; крайният резултат се вижда в рамките на **6–12 месеца**. При пациенти с лошо качество на кожата, по-напреднала възраст, голяма загуба на тегло или предишна операция на шията резултатът може да е по-ограничен. При около **5–10 от всеки 100** пациенти може да е необходима малка корекция.

4 Други възможности за лечение

- **Да не се оперирате:** Тъй като процедурата е естетична, винаги имате възможност да не я извършите.
- **Само липосукция под брадичката:** Може да е достатъчна при хора с добра еластичност на кожата, при които пълнотата се дължи само на подкожна мазнина; не коригира дълбоката мазнина, мускулите и жлезите.
- **Инжекции за разграждане на мазнини (деоксихолева киселина) или апаратни методи (радиочестота, ултразвук):** Дават ограничено подобрение при лека пълнота и отпуснатост; обикновено са необходими няколко сеанса.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Ботулинов токсин за омекотяване на ивиците на платизмата:** Намалява ивиците временно (3–4 месеца); не коригира отпускането и мазнината.
- **По-ограничен лифтинг на шията:** По-малки операции, при които се отстранява само излишна кожа или се прави само платизмопластика; ефектът им е по-ограничен.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако операцията не бъде извършена, сегашният вид на шията ви ще се запази и естественото стареене ще продължи. Това не представлява опасност за здравето ви.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят кръвни изследвания и при нужда ЕКГ и други изследвания; ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- **Много е важно кръвното ви налягане да бъде добре контролирано.** Високото кръвно налягане значително увеличава риска от натрупване на кръв в шията (хематом) след операцията. Попитайте анестезиолога дали трябва да приемете лекарството си за кръвно налягане и сутринта преди операцията (с малко вода).
- Не яжте и не пийте нищо **6–8 часа** преди операцията (спазвайте указанията на анестезиолога).
- Преди операцията избягвайте тежки физически натоварвания, сауна и прекомерна консумация на алкохол. В деня на операцията не използвайте грим, бижута и колиета; носете дреха, която се закопчава отпред и не се облича през главата.
- Препоръчва се през първите 24–48 часа след операцията до вас да има придружител.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 24–48 часа	На шията ще имате превръзка и дрен. Ще усещате оток, стягане и дискомфорт при преглъщане; болката обикновено е лека до умерена. Важно е да спите с повдигната глава (30–45°), да не сгъвате прекомерно шията и да избягвате покачване на кръвното налягане (не се напъвайте и овладявайте кашлицата). Дренът обикновено се отстранява на **1–2-ия ден**.
1-ва седмица	Отокът и кръвонасяданията, **ако се появят**, са най-изразени в този период, след което започват да намаляват. Изтръпването на шията и под брадичката е нормално. **Компресивната превръзка за шията** се носи денем и нощем според указанията. Конците се свалят на **5–10-ия ден**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2–4-та седмица	Повечето пациенти се връщат към офис работа и социален живот в рамките на 10–14 дни. Уплътнението, усещането за неравности и стягането в шията може да продължат. Тежки физически натоварвания, навеждане, вдигане на тежести и движения, натоварващи шията, трябва да се избягват поне **3–4 седмици**.
1–3-ти месец	Остатъчният оток и уплътнението постепенно намаляват. Изтръпването в голяма степен отминава. В този период белезите може да са розови и леко надигнати.
6–12-и месец	Вижда се крайният резултат; белезите избледняват и изтъняват. Ако се прецени, че е необходима корекция, тя обикновено се прави след поне 6 месеца.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Оток на шията и под брадичката; кръвонасядания, **ако се появят**, отзвучават за 1–3 седмици
- Временно изтръпване на кожата на шията и около ушите
- Стягане, уплътнение и лек дискомфорт при преглъщане
- Лека болка, сърбеж и розови белези в областта на разрезите
- Неравности и уплътнения, които се напипват под кожата през първите седмици

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Продължителен оток и уплътнение** — Уплътнението на шията и под брадичката може да продължи няколко месеца; отминава с масаж и с времето.
- **Лека асиметрия и неравности на контура** — Може да останат леки разлики между двете страни на шията или малки вдлъбнатини/подутини под кожата; повечето се изглаждат с времето, някои може да изискват малка корекция.
- **Серома (натрупване на течност)** — Събиране на бистра течност под кожата; обикновено се лекува с изтегляне на течността с игла в кабинета.
- **Необходимост от корекция** — При около **5–10 от всеки 100** пациенти може да е необходима малка корекция заради остатъчна пълнота, неравност или белег.

Нечести състояния

- **Хематом (натрупване на кръв в шията)** — Среща се при около **2–5 от всеки 100** пациенти; по-чест е **при мъже и при хора с високо кръвно налягане** и обикновено се появява през първите 24 часа. Малките хематоми могат да бъдат изтеглени с игла; при големите се налага **връщане в операционната** за отстраняване на кръвта и спиране на кървенето. Бързо нарастващ хематом може да **притисне дихателната тръба (трахеята) и да затрудни дишането**; това изисква спешна намеса. Късно установеният хематом може да наруши кръвоснабдяването на кожата и да доведе до проблеми със заздравяването и белезите.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Временна слабост в движението на долната устна (клон на лицевия нерв по ръба на долната челюст / шиен клон)** — При около **1–10 от всеки 100** пациенти едната страна на долната устна може да изглежда асиметрична при усмивка. В повечето случаи това се дължи на разтягане на нерва или на оток и отминава от само себе си в рамките на **няколко седмици до няколко месеца**.
- **Изтичане на слюнка / слюнчена киста (сиалоцеле)** — При пациенти с частично намалена подчелюстна жлеза слюнка може да изтича от жлезата и да се събира под кожата. Обикновено отзвучава след многократно изтегляне с игла, компресивна превръзка и при нужда лекарства; рядко е необходима допълнителна намеса.
- **Деформация поради прекомерно отстраняване на тъкан** — Отстраняването на твърде много мазнина или жлезна тъкан може да създаде вдлъбнатина в средата на шията, изпъкнали мускули и „скелетизиран“ вид (деформация тип „кобра“). Корекцията може да изисква инжектиране на собствена мастна тъкан (липофилинг) или нова операция; затова тъканите се отстраняват балансирано и контролирано.
- **Забележими или широки белези** — Белезите под брадичката и зад ушите рядко могат да се задебелят, разширят или променят цвета си. Лекуват се с инжекции с кортикостероид, силиконов гел или корекция на белега. Ако разрезът зад ухото достига до линията на косата, косата по него може да оредее. Ако разрезите минават около меката част на ухото, рядко тя може да изглежда изтеглена надолу и напред; при нужда се прави малка корекция.
- **Продължително изтръпване** — Намалената чувствителност на шията и около ухото може да продължи няколко месеца; рядко може да остане частично трайно.
- **Инфекция** — Среща се при **по-малко от 1 до 2 от всеки 100** пациенти. Обикновено отзвучава с антибиотици; рядко е необходимо дрениране.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Нарушено кръвоснабдяване на кожата и загуба на тъкан (некроза)** — Особено при **пушачи**, хора с диабет и пациенти, развили хематом, може да се стигне до разтваряне на раната и загуба на кожа по ръбовете ѝ. Заздравяването се удължава, необходими са превръзки, понякога и допълнителна операция, и може да остане траен белег.
- **Трайно увреждане на нерв** — Трайна слабост в движението на долната устна се наблюдава при **по-малко от 1 на 100** пациенти. Много рядко могат да бъдат засегнати нервите, които движат езика (подезичен нерв) или осигуряват чувствителността му (езичен нерв), както и нервът, отговорен за чувствителността на ухото и долната му част (голям ушен нерв).
- **Проблеми с дишането и затруднено преглъщане** — В много редки случаи при голям хематом или изразен оток може да се наложи спешно осигуряване на дихателните пътища и наблюдение в интензивно отделение. След корекция на дълбоките структури може да има временно затруднение при преглъщане.
- **Нараняване на кръвоносен съд или слюнчен канал** — Кървене поради нараняване на вените на шията или проблеми с канала на слюнчената жлеза са много редки; могат да изискват допълнително лечение или намеса.
- **Повторно отпускане** — С годините, със стареенето и промените в теглото шията може отново да се отпусне; това е естествен процес, а не усложнение. С времето вертикалните ивици на шийния мускул също могат отново да станат видими. Изразено ранно отпускане е рядкост.
- **Психологическа неудовлетвореност** — Въпреки технически успешния резултат човек може трудно да свикне с новия си външен вид. Откритото обсъждане на очакванията преди операцията намалява този риск.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Бързо нарастващ оток, стягане или изразено едностранно подуване** на шията, особено през първите 24–48 часа
- **Затруднено дишане, промяна в гласа, невъзможност за преглъщане** или чувство на задушаване (обадете се незабавно на 112)
- **Кървене, което не спира** под превръзката, или бързо увеличаващо се количество кръв в резервоара на дрена
- **Температура над 38,5 °C**, засилващо се зачервяване, болка, затопляне или гноен секрет от разрезите
- **Потъмняване на кожата, оцветяване в морав до черен цвят** или разтваряне на раната
- Внезапна силна болка или болка, която не се повлиява от обезболяващи
- Задух, болка в гърдите или едностранен оток и болка в крака

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- През първите 2 седмици спете по гръб с повдигната глава; избягвайте прекомерно сгъване на шията, резки движения на главата и навеждане напред.
- Носете компресивната превръзка за шията толкова време, колкото ви е препоръчано (обикновено 1–3 седмици).

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Измервайте редовно кръвното си налягане и не пропускайте лекарствата си; избягвайте напъване, вдигане на тежести и неконтролирана кашлица.
- През първите 3–4 седмици избягвайте тежки натоварвания, сауна, турска баня и горещ душ.
- Пазете белезите от слънце поне 3–6 месеца.
- Ако сте пристигнали от чужбина, пътуването със самолет обикновено е безопасно след отстраняване на дрена и първите контролни прегледи, най-често от 5–7-ия ден.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.

☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че операцията не спира стареенето, че с времето шията може отново да се отпусне и че резултатът е ограничен от качеството на кожата, теглото и костната ми структура.
- ☐ Разбирам, че контролът на кръвното ми налягане и спазването на следоперативните указания са важни за намаляване на риска от кървене (хематом).
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.