Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Отопластика

Операция за корекция на щръкнали уши

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Страна: ☐ Дясно ☐ Ляво ☐ Двустранно

Вид анестезия: ☐ Обща анестезия ☐ Местна анестезия ☐ Местна анестезия + седация

Части за корекция / очаквания на пациента: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Щръкналите уши са уши, които стърчат от главата под по-голям ъгъл от обичайния, или при които естествената гънка на ушния хрущял (антихеликсът) не е развита. Състоянието обикновено е вродено, не е вредно за здравето и не засяга слуха. Особено в детска и юношеска възраст обаче то може да доведе до подигравки, загуба на самочувствие и социална тревожност.

Целта на отопластиката е ушите да прилегнат по-близо до главата, да изглеждат **естествено** и да бъдат възможно най-**симетрични**. Тъй като около 5–6-годишна възраст ушната мида вече е достигнала по-голямата част от размера си при възрастен човек, операцията може да се извърши **след 5–6-годишна възраст**; извършването ѝ преди училище може да предпази детето от социални затруднения. Ако детето ви ще бъде оперирано, важно е да се вземат предвид и неговото желание и готовност.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как се извършва процедурата?

Операцията се извършва в операционна зала. При деца обикновено се използва обща анестезия, а при възрастни — местна анестезия (при нужда със седация) или обща анестезия.

1. **Планиране и маркиране:** Измерва се разстоянието на ушите от главата, правят се снимки и се маркира мястото на новата гънка.
2. **Разрез:** Разрезът се прави в кожата на **задната повърхност на ухото**, близо до естествената гънка между ухото и главата. Тъй като белегът е зад ухото, обикновено не се вижда.
3. **Оформяне на хрущяла:** С постоянни шевове в ушния хрущял се оформя нова гънка (антихеликс). При необходимост хрущялът се изтънява или леко се насича, за да стане по-мек.
4. **Приближаване на ухото към главата:** Ако дълбоката вдлъбната част на ухото (конхата) е голяма, тя се намалява или се фиксира с шевове към тъканта зад ухото. Ако ушната висулка също стърчи, тя се коригира.
5. **Затваряне и превръзка:** Кожата се затваря с шевове. Поставя се мека, леко притискаща превръзка около главата, която поддържа новата форма на ушите и предотвратява събирането на кръв.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
При деца обща анестезия; при възрастни местна анестезия ± седация или обща анестезия	Около 1–2 часа (двустранно)	Обикновено изписване в същия ден

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Уши, които прилягат по-близо до главата и изглеждат естествено
- По-балансиран вид на двете уши
- По-малко социална тревожност и подигравки, свързани с външния вид; по-добро самочувствие

Повечето пациенти и семейства са доволни от резултата. Тъй като ушният хрущял е еластична тъкан, според публикуваните данни при около **5–10 от 100** пациенти ухото може частично отново да се отдалечи от главата и да е необходима корекция. Разлики от няколко милиметра между двете уши се смятат за нормални.

4 Други възможности за лечение

- **Без операция:** Щръкналите уши не причиняват здравословни проблеми, затова операцията не е задължителна.
- **Моделиране (шиниране) в неонаталния период:** През първите седмици след раждането ушният хрущял е много мек и може да се оформи със специални шини; след този период методът не е ефективен.
- **Прикриване с прическа:** Прически, които покриват ушите, могат да прикрият външния им вид.
- **Безразрезни техники / техники с конци:** При подбрани пациенти с мек хрущял корекцията може да се направи през много малки разрези; честотата на рецидив може да е по-висока, отколкото при стандартната операция.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако операцията не бъде извършена, формата на ушите ще остане същата; тя не се подобрява от само себе си с времето. Щръкналите уши не представляват опасност за здравето; решението за операция зависи изцяло от външния вид и от желанието на човека (при деца — на детето и семейството).

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят необходимите кръвни изследвания; ако е планирана обща анестезия, анестезиолог ще прегледа вас или детето ви.
- При обща анестезия или седация не трябва да се яде и пие през последните **6–8 часа** преди операцията (при малки деца — времето, посочено от анестезиолога).
- Сутринта в деня на операцията косата трябва да се измие с шампоан. Дългата коса може да се прибере далеч от оперативното поле.
- Операцията може да бъде отложена при активна кожна инфекция, екзема или незаздравял пиърсинг около ухото.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 48 часа	Пулсиране, усещане за опъване и умерена болка в ушите са обичайни и се овладяват с обезболяващи. Препоръчва се спане с повдигната глава. **Силна болка, която постоянно се засилва от едната страна, не е нормална** и трябва да ни бъде съобщена незабавно.
2–7-и ден	Превръзката обикновено се сваля на контролен преглед между **2-рия и 5-ия ден** и ушите се преглеждат. На този етап са обичайни оток, кръвонасядания и чувствителност на ушите. След свалянето на превръзката се носи мека **лента за глава (за ушите)**. Децата обикновено могат да се върнат на училище след една седмица.
1–2-ра седмица	Лентата се носи **денем и нощем през първите 1–2 седмици**, а след това **само нощем още 4–6 седмици**. Така ухото не се прегъва напред по време на сън и шевовете са защитени. Нерезорбируемите кожни конци, ако има такива, се свалят на 7–10-ия ден.
3–6-а седмица	По-голямата част от отока отзвучава. Контактните спортове, плуването и каските, които притискат ушите, трябва да се избягват поне **4–6 седмици**.
3–6-и месец	Гънките на ухото се стабилизират, белегът избледнява и крайният вид става видим. Лекото изтръпване на ушите обикновено отминава през този период.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Болка, пулсиране и усещане за опъване през първите дни
- Оток и кръвонасядания по ушите (1–2 седмици)
- Временно изтръпване на кожата на ушите и чувствителност към студ (седмици до месеци)
- Тънък белег зад ухото, който избледнява с времето

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Опипващи се или прорязващи кожата шевове** — При около **5–10 от 100** пациенти постоянните шевове, оформящи хрущяла, може да се опипват зад ухото месеци или години по-късно, да излязат през кожата или да образуват малко възпалено възелче (гранулом). Обикновено това се коригира с проста процедура за отстраняване на шева.
- **Частичен рецидив (ухото отново се отдалечава)** — При около **5–10 от 100** пациенти ухото може частично да се върне към първоначалното си положение; при нужда може да се направи корекция.
- **Лека асиметрия** — Двете уши никога не са напълно еднакви; разлики от няколко милиметра след операцията са нормални. При забележима разлика може да се направи корекция.

Нечести състояния

- **Събиране на кръв в ухото (хематом)** — Среща се при около **1–3 от 100** пациенти, обикновено през първите 48 часа. **Силна, постоянно засилваща се болка от едната страна** е най-важният му признак. Трябва да се **дренира спешно**, преди да наруши кръвоснабдяването на хрущяла; при забавено лечение може да настъпи увреждане на хрущяла и трайна деформация („карфиолово ухо“).
- **Инфекция на раната** — Среща се при около **1–5 от 100** пациенти; обикновено отзвучава с антибиотици.
- **Задебелен белег или келоид** — При около **1–3 от 100** пациенти, особено при по-тъмна кожа или склонност към келоиди, зад ухото може да се образува задебелен, надигнат белег. Може да е необходимо лечение с кортикостероидни инжекции, силиконов гел или операция, като е възможен рецидив. Моля, уведомете ни, ако в миналото сте имали келоид.
- **Свръхкорекция или неестествен вид** — Ушите може да изглеждат прекалено прилепнали към главата, гънката да е прекалено остра или средната част на ухото да е по-назад от горната и долната (вид на „телефонна слушалка“); при нужда може да се направи коригираща операция.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Възпаление на обвивката на хрущяла (перихондрит)** — Среща се при **по-малко от 1 от 100** пациенти. Проявява се със засилващо се зачервяване, оток, затопляне и силна болка в ухото. Може да наложи венозни антибиотици и при нужда хирургично почистване; при забавено лечение може да настъпи загуба на хрущял и **трайна деформация**.
- **Нарушено кръвоснабдяване на кожата или хрущяла (некроза)** — Много рядко; обикновено е свързано с прекалено стегната превръзка, нелекуван хематом или инфекция. Може да са необходими грижи за раната и понякога възстановителна операция.
- **Трайно намалена чувствителност или хронична болка** — Изтръпването на кожата на ухото или болката при студено време рядко могат да бъдат трайни.
- **Стесняване на външния слухов проход** — Много рядко, след намаляване или фиксиране на конхата, входът на слуховия проход може да се стесни; може да е необходима корекция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Силна болка в едното ухо, която постоянно се засилва** (особено през първите 48 часа) — може да е признак на събиране на кръв
- Засилващо се просмукване на кръв през превръзката или напоена с кръв превръзка
- **Температура над 38,5 °C**, засилващо се зачервяване, оток, затопляне или зловонна секреция от ухото
- Превръзка, която стяга прекалено, посиняване или промяна в цвета на ухото
- Удар по ухото или внезапна промяна на формата му

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Не мокрете превръзката и не я сваляйте сами, преди да бъде свалена в клиниката. След сваляне ѝ можете внимателно да вземете душ от деня, препоръчан от лекаря.
- Носете лентата за глава редовно през указания период; това е важно за трайния резултат.
- През първите седмици избягвайте лежане върху ушите, прегъване на ушите напред, както и обличане и събличане на дрехи с тясна яка, които притискат ушите.
- Пазете ушите от слънце и силен студ поне 3 месеца; поради намалената чувствителност изгаряне или измръзване могат да останат незабелязани.
- Наглеждайте детето си, за да не дърпа превръзката или лентата.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.

☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че носенето на лентата за глава през препоръчания период след операцията е част от резултата и че неспазването на тези указания може да увеличи риска от рецидив.
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.