Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Отстраняване на подчелюстната слюнчена жлеза

Екстирпация на субмандибуларната жлеза

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Страна: ☐ Дясна ☐ Лява

Причина за операцията: ☐ Слюнчен камък / повтарящо се възпаление ☐ Образувание в жлезата ☐ Друго _____

Невромониторинг: ☐ Ще се използва ☐ Няма да се използва

Резултат от образно изследване / биопсия: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Подчелюстната (субмандибуларна) жлеза е слюнчена жлеза, разположена непосредствено под долната челюст от двете страни, която отделя слюнка в устата. Тя произвежда значителна част от слюнката; тъй като обаче жлезата от другата страна и слюнчените жлези пред ушите и под езика продължават да работят, **отстраняването на една жлеза при повечето пациенти не води до сухота в устата**.

Тази операция най-често се извършва поради **камъни в слюнчената жлеза** и причинените от тях **повтарящи се отоци и възпаления**. Камъкът пречи на изтичането на слюнката в устата, което води до болезнен оток под челюстта по време на хранене и до повтарящи се инфекции. По-рядко операция се налага поради **образувание (тумор)** в жлезата. Делът на злокачествените тумори при образуванията на подчелюстната жлеза е по-висок, отколкото при околоушната жлеза; затова отстраняването на жлезата и хистологичното ѝ изследване са важни за поставяне на окончателна диагноза.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

В близост до жлезата преминават нервното клонче, което движи долната устна, нервът, който осигурява чувствителността на езика, и нервът, който движи езика. Целта на операцията е жлезата да бъде отстранена напълно, като тези нерви се запазят.

2 Как се извършва процедурата?

Операцията се извършва под обща анестезия в операционна зала.

1. **Разрез:** На около 2–3 см под долночелюстната кост, успоредно на естествена кожна гънка на шията, се прави разрез, обикновено с дължина 4–6 см. Разполагането на разреза достатъчно ниско под челюстта помага да се запази нервното клонче, което движи долната устна.
2. **Запазване на нервите:** Преминава се тънкият мускулен слой под кожата (платизма). Нервното клонче, което движи долната устна (маргиналният мандибуларен клон на лицевия нерв), се запазва, като се открие и проследи или като се работи в безопасен тъканен слой.
3. **Отстраняване на жлезата:** Жлезата се отделя от околните тъкани, а кръвоносните съдове, които я кръвоснабдяват, се подвързват. Слюнченият канал внимателно се отделя от нерва, осигуряващ чувствителността на езика (езичния нерв), след което се подвързва и прерязва. Нервът, който движи езика (подезичният нерв), се запазва. Ако в канала има камък, се отстранява и колкото е възможно по-голяма част от далечния участък на канала.
4. **Хистологично изследване:** Отстранената жлеза се изпраща за хистологично изследване; резултатът обикновено е готов до 1–2 седмици.
5. **Затваряне:** Извършва се контрол на кървенето, обикновено се поставя тънък **дрен** и кожата се зашива с козметичен шев.

Ако в устата има камък близо до мястото, където каналът се отваря, понякога той може да бъде отстранен и отделно през устата. Това ще бъде обсъдено с вас преди операцията.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия	Около 1–2 часа	Обикновено една нощ в болница; изписване след премахване на дрена

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Прекратяване на повтарящите се болезнени отоци и възпаления, причинени от камъни
- Отпадане на нуждата от многократни курсове с антибиотици
- Отстраняване на образуването в жлезата и поставяне на окончателна диагноза

След операция поради камъни и хронично възпаление оплакванията изчезват напълно при **над 90%** от пациентите. Ако в останалата в устата част от канала остане или се образува нов камък, рядко отокът на пода на устата може да продължи. При доброкачествени образувания операцията обикновено води до трайно излекуване; при злокачествени тумори може да е необходимо допълнително лечение.

4 Други възможности за лечение

- **Медикаментозно и поддържащо лечение:** Обилен прием на течности, кисели бонбони за стимулиране на слюноотделянето, масаж, топли компреси и антибиотици при възпаление. Може да облекчи оплакванията, но не премахва камъка.
- **Отстраняване на камъка през устата:** Камъни, които могат да се напипат в частта от канала близо до устата, могат да бъдат отстранени чрез малък разрез в устата, като жлезата се запазва.
- **Ендоскопия на слюнчения канал (сиалендоскопия):** Камъни с подходящ размер и разположение могат да бъдат отстранени отвътре през канала с тънък ендоскоп; методът не е достъпен навсякъде и не е подходящ за всеки камък.
- **Наблюдение:** При малки образувания, смятани за доброкачествени, рядко може да се обсъди наблюдение; за окончателна диагноза при тази жлеза обаче обикновено се препоръчва операция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Без операция отоците и възпаленията, причинени от камъни, могат да продължат да се повтарят; рядко около жлезата може да се развие абсцес (гнойна колекция), който налага спешно лечение. Ако в жлезата има образувание, окончателна диагноза не може да бъде поставена; нелекуваният злокачествен тумор може да прогресира.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се извършват кръвни изследвания и образни изследвания (ехография и при нужда КТ/ЯМР); ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- Не трябва да ядете и пиете нищо **6–8 часа** преди операцията (следвайте указанията на анестезиолога).
- Ако жлезата е активно възпалена, операцията обикновено се планира след излекуване на възпалението.
- При мъжете брадата в зоната на разреза може да бъде скъсена в деня на операцията.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 24–48 часа	Под челюстта ще има лека до умерена болка, опъване и оток, които се овладяват с обезболяващи. Преглъщането може да е леко неприятно. Дренът обикновено се премахва на 1-вия ден. Препоръчва се да спите с повдигната глава. Можете веднага да започнете да се храните с мека храна.
1-ва седмица	Можете да се върнете към ежедневните си занимания. Конците обикновено се свалят на **5–7-ия ден**. Изтръпването над разреза, по ръба на челюстта и около разреза е нормално. Хистологичният резултат ще бъде обсъден с вас в този период или малко след това.
2–4-та седмица	Повечето хора се връщат на офис работа до 1 седмица. Тежките физически натоварвания и вдигането на тежести трябва да се отложат за около **2 седмици**. Втвърдяването и лекият оток в областта на разреза постепенно намаляват.
2–6-и месец	Белегът постепенно избледнява и често става незабележим в гънката на шията. Ако е имало временна слабост на нерв или намалена чувствителност, обикновено те се възстановяват в този период.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Болка, опъване и оток под челюстта; лек дискомфорт при преглъщане
- Изтръпване на кожата около и под разреза
- Белег на шията (избледнява с времето)

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Временна слабост на долната устна** — Поради разтягането по време на операцията на нервното клонче, което дърпа долната устна надолу (маргиналния мандибуларен клон), при около **10–20 от 100** пациенти се наблюдава лека асиметрия на долната устна от тази страна при усмивка или говор. Това е предимно козметичен проблем, обикновено не пречи на храненето и пиенето и в повечето случаи **отзвучава за седмици до няколко месеца**.
- **Втвърдяване и изтръпване в областта на разреза** — Втвърдяването и намалената чувствителност под разреза са чести през първите седмици и намаляват в рамките на месеци.

Нечести състояния

- **Кървене и хематом** — При около **1–3 от 100** пациенти под кожата може да се събере кръв. Ако хематомът е голям, може да се наложи да бъде отстранен и кървенето да бъде спряно в операционна зала.
- **Инфекция на раната** — Може да се появи при **1–3 от 100** пациенти, особено ако жлезата е била възпалена; обикновено отзвучава с антибиотици, рядко е необходимо дрениране.
- **Намалена чувствителност на едната половина на езика** — Поради засягане на нерва, който осигурява чувствителността на езика (езичния нерв), изтръпване или мравучкане на езика от тази страна се появява при около **1–3 от 100** пациенти. Най-често е временно; рядко може да бъде трайно и да засегне и вкуса.
- **Събиране на течност (серома)** — Събиране на течност под разреза; обикновено отзвучава с пункция и компресивна превръзка.
- **Остатъчен камък в канала** — В останалата в устата част от слюнчения канал може да остане или да се образува нов камък, който да причини оток или възпаление на пода на устата. При нужда се отстранява с малка процедура през устата.
- **Забележим или задебелен белег** — В зависимост от индивидуалната склонност белегът може да задебелее или да остане забележим; могат да се приложат методи за лечение на белези.
- **Хлътване под челюстта** — На мястото на жлезата може да се получи леко хлътване и разлика между двете страни; обикновено не е забележимо.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Трайна слабост на долната устна** — При **около 1–3 от 100** пациенти или по-малко може да остане трайно ограничено движение на долната устна от тази страна и асиметрична усмивка. Ако е забележимо, може да се приложи лечение, например ботулинов токсин за балансиране на другата страна.
- **Слабост в движенията на езика** — Увреждането на нерва, който движи езика (подезичния нерв), е **много рядко**. Ако настъпи, може да има слабост на езика от тази страна и затруднения в говора и преглъщането; при трайно увреждане може да е необходима логопедична терапия и рехабилитация на гълтането.
- **Голям хематом на шията, засягащ дихателните пътища** — Много рядко бързо нарастващ кръвоизлив може да притисне шията и да предизвика затруднено преглъщане или **дишане**. Това е спешно състояние; хематомът трябва незабавно да бъде отстранен в операционна зала, а рядко се налага осигуряване на дихателните пътища (интубация или трахеостомия).
- **Окончателен хистологичен резултат, различен от предварителната диагноза** — Дори при жлеза, за която се смята, че има камъни или възпаление, окончателното хистологично изследване може да установи неочакван тумор. Ако се установи злокачествен тумор, може да е необходимо допълнително лечение, например отстраняване на шийните лимфни възли или лъчетерапия.
- **Сухота в устата** — Отстраняването на една жлеза при повечето пациенти остава незабелязано; сухотата в устата обаче може да стане забележима при пациенти, преминали лъчетерапия, с някои ревматологични заболявания или приемащи лекарства, които причиняват сухота в устата.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Бързо нарастващ оток на шията**, особено придружен от **затруднено дишане или преглъщане** (спешен случай — обадете се незабавно на 112)
- **Кървене, което не спира**, от дрена или раната
- **Температура над 38,5 °C**, нарастващо зачервяване, болка, затопляне или гнойна секреция от раната
- Изразен оток на езика или пода на устата
- **Новопоявило се изразено затруднение** при говор или преглъщане

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Не мокрете раната през първите 48 часа; след това можете да вземете кратък душ според указанията.
- През първите дни предпочитайте мека, хладка храна; поддържайте добра хигиена на устата и пийте много течности.
- Пазете белега от слънце поне 6 месеца (слънцезащитен крем с висок фактор).
- Задължително обсъдете хистологичния резултат и плана за проследяване с лекаря си.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Разбирам, че окончателната диагноза ще бъде поставена от хистологичното изследване след операцията и че в зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение.

☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**

☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.