Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Темпорален лифтинг

Повдигане на външния край на веждата и ъгъла на окото през слепоочията (латерален лифтинг на веждите)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Страна: ☐ Дясна ☐ Лява ☐ Двустранно

Място на разреза: ☐ В окосмената част (слепоочие) ☐ По линията на косата ☐ Ще се определи по време на операцията _____

Метод на фиксиране: ☐ Нерезорбируеми конци ☐ Резорбируемо фиксиращо устройство ☐ Друг _____

Процедури, които ще се извършат едновременно: ☐ Горна блефаропластика (с отделен формуляр) ☐ Инжектиране на собствена мастна тъкан (липофилинг) ☐ Няма _____

Оплакване и очаквания на пациента: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

С възрастта тъканите на челото и слепоочията се отпускат; особено **външният край на веждата** и **външният ъгъл на окото** се смъкват надолу. Това може да придаде уморен, тъжен или тежък поглед, вид на излишна кожа на горния клепач и бръчки в ъгъла на окото. При някои хора тази форма е налице и по рождение.

Темпоралният лифтинг е операция, при която чрез малки разрези в окосмената част на слепоочията **външната част на веждата и ъгълът на окото се повдигат нагоре и назад**. Целта е да се постигне **по-свеж и отворен поглед**, в хармония с лицето ви. Сам по себе си той не коригира вътрешната част на веждата, цялото чело или излишната кожа на клепача; при нужда се комбинира с други процедури.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как се извършва процедурата?

Операцията обикновено се извършва под обща анестезия или седация с местна анестезия в операционна зала. Преди това се оценява положението на веждите и ъглите на очите ви в изправена и седнала позиция, правят се снимки и посоката на повдигане се маркира заедно с вас.

1. **Разрез:** От всяка страна се правят разрези с дължина около 3–5 см в окосмената част на слепоочието или по линията на косата. Косата не се обръсва или се подстригва само много тясна ивица по линията на разреза.
2. **Освобождаване на тъканите:** Хирургът работи в дълбокия слой на слепоочието по начин, който предпазва челния клон на лицевия нерв. Съединителната тъкан около външната част на веждата и ъгъла на окото внимателно се освобождава, за да може да бъде преместена.
3. **Повдигане и фиксиране:** Освободените тъкани се изтеглят нагоре и назад в планираната посока и се фиксират към здравия тъканен слой на слепоочието с **нерезорбируеми конци** или **резорбируеми фиксиращи устройства**. Проверява се балансът между двете страни.
4. **Затваряне:** При нужда се отстранява малко количество излишна кожа на скалпа. Разрезите се затварят с метални скоби (телчета) или шевове, понякога се поставя тънък дрен и се прави лека превръзка на главата.

Ако едновременно ще се извършва операция на горните клепачи (блефаропластика) или друга процедура, за нея се подписва **отделен формуляр за съгласие**.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия или седация + местна анестезия	Около 1–2 часа	Обикновено изписване в същия ден или една нощ в болница

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- По-свеж, отворен и млад поглед благодарение на повдигането на външния край на веждата и ъгъла на окото
- Намаляване на усещането за тежест и на привидния излишък на кожа във външната част на горния клепач
- Липса на видим белег по лицето, тъй като разрезите са скрити в косата

Повечето правилно подбрани пациенти са доволни от резултата. През първите седмици веждите може да изглеждат малко по-високо от планираното; това се смекчава, докато тъканите се наместят. Крайният резултат се вижда в рамките на **3–6 месеца**. С възрастта и под действието на гравитацията повдигнатите тъкани може с времето донякъде да се смъкнат; продължителността на ефекта е индивидуална и обикновено е **няколко години**. При около **5–10 от всеки 100** пациенти може да е необходима корекция поради асиметрия или ранно смъкване.

4 Други възможности за лечение

- **Да не се оперирате:** Тъй като процедурата е естетична, винаги имате възможност да не я извършите.
- **Повдигане на веждите с ботулинов токсин:** Може да повдигне външния край на веждата с няколко милиметра, временно (3–4 месеца).
- **Лифтинг с конци:** Извършва се с по-малко разрези, но ефектът обикновено е по-ограничен и по-краткотраен.
- **Филъри в областта на слепоочието/веждата:** Могат да дадат временно подобрение, когато смъкването се дължи на загуба на обем; имат собствени рискове, например запушване на кръвоносен съд.
- **Други операции за повдигане на веждите:** Ако и цялото чело, и вътрешната част на веждата са смъкнати, по-подходящ може да бъде ендоскопски лифтинг на челото или методи с разрез над веждата или по линията на косата.
- **Само горна блефаропластика:** Може да е достатъчна, ако основният проблем е излишната кожа на клепача; не коригира ниско разположената вежда.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако операцията не бъде извършена, сегашният вид на веждите и ъглите на очите ви ще се запази и естественото стареене ще продължи. Това не представлява опасност за здравето ви.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят кръвни изследвания и при нужда други изследвания; ако е планирана обща анестезия, ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- Не яжте и не пийте нищо **6–8 часа** преди операцията (спазвайте указанията на анестезиолога).
- Измийте косата си вечерта преди или сутринта на операцията; в деня на операцията не използвайте лак или гел за коса, грим и контактни лещи. Подстригване обикновено не е необходимо.
- Уведомете лекаря, ако през последните **3–4 месеца** сте си поставяли ботулинов токсин в областта на челото или веждите; това може да повлияе на планирането.
- Препоръчва се през първия ден след операцията до вас да има придружител.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 48 часа	Ще усещате стягане, леко главоболие и оток в слепоочията и челото; болката обикновено е слаба и се контролира с обезболяващи. Отокът може да се спусне към очите; кръвонасядания, **ако се появят**, се виждат по клепачите. Сънят с повдигната глава и студените компреси намаляват отока. Ако е поставен дрен, той обикновено се отстранява на следващия ден.
1-ва седмица	Обикновено можете внимателно да измиете косата си с мек шампоан от **2–3-ия ден**. В този период веждите и ъглите на очите може да изглеждат по-високо и по-опънато от планираното. Повечето пациенти се връщат към ежедневните си занимания и офис работа в рамките на 5–7 дни.
7–14-и ден	Скобите или шевовете се свалят. Изтръпването, сърбежът и чувствителността по линията на разреза в слепоочията може да продължат.
2–6-а седмица	Отокът в голяма степен отзвучава и погледът става по-естествен. Тежките физически натоварвания и стегнатите ленти за глава или каски, които притискат слепоочията, трябва да се избягват поне **3–4 седмици**, а боядисването на косата и подобни химични процедури — поне **4–6 седмици**; използвайте сешоара на умерено топла степен.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

3–6-и месец	Тъканите се наместват и се вижда крайният резултат. Промените в чувствителността на скалпа в голяма степен отминават; белегът избледнява.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Стягане, усещане за натиск и леко главоболие в слепоочията и челото
- Оток на челото и около очите; кръвонасядания, **ако се появят**, отзвучават за 1–2 седмици
- Вежди, които през първите седмици изглеждат по-високо или с „изненадан“ вид
- Изтръпване, сърбеж или мравучкане в слепоочията и скалпа
- Чувствителност и уплътнение по линията на разреза

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Лека асиметрия** — Веждите и без това не са напълно симетрични; след операцията може да останат или да се появят по време на заздравяването леки разлики между двете страни.
- **Изтъняване на косата по линията на разреза** — Временният косопад около разреза (т.нар. „шоков“ косопад) е чест и косата обикновено израства отново в рамките на **2–4 месеца**. Разрезът остава като тънка линия, покрита от косата.
- **Продължително изтръпване и сърбеж** — Промяната в чувствителността на скалпа може да продължи няколко месеца; сърбежът по време на заздравяването е нормален.
- **Частично смъкване** — Очаква се през първите месеци повдигнатите тъкани леко да се смъкнат; затова по време на операцията веждата може да бъде повдигната малко повече от желаното.

Нечести състояния

- **Временна слабост при повдигане на веждата (челен клон на лицевия нерв)** — При около **1–3 от всеки 100** пациенти може да има временна слабост при повдигане на веждата или набръчкване на челото от едната страна. Обикновено се дължи на разтягане на нерва или на оток и отминава от само себе си в рамките на **няколко седмици до няколко месеца**.
- **Трайна загуба на коса или широк белег** — Рядко по линията на разреза може да остане трайна зона без коса или разширен белег; особено белезите по линията на косата може да са по-забележими. При нужда състоянието може да се подобри с корекция на белега или трансплантация на коса.
- **Хематом (натрупване на кръв)** — При около **1–2 от всеки 100** пациенти в слепоочието може да се събере кръв; може да се наложи изтеглянето ѝ с игла или с малка намеса.
- **Инфекция** — Среща се при **по-малко от 1 на 100** пациенти. Обикновено отзвучава с антибиотици; рядко е необходимо дрениране или отстраняване на фиксиращ конец.
- **Свръхповдигане: „изненадан“ или прекомерно скосен поглед („лисичи очи“, fox eye)** — Външният край на веждата или ъгълът на окото може да изглеждат повдигнати повече от желаното. Обикновено това се смекчава, докато тъканите се наместят през първите седмици; ако се запази, може да е необходима корекция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Ранно смъкване или недостатъчен ефект** — Поради разхлабване на фиксацията или особеностите на тъканите веждата може да се смъкне по-рано от очакваното; може да се наложи повторно повдигане.
- **Проблеми, свързани с фиксиращия материал** — Нерезорбируемият конец или устройството може да се напипва под кожата, да е чувствително или рядко да излезе през кожата; в такъв случай може да се наложи отстраняването му.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Трайно увреждане на нерв** — Трайното увреждане на нервния клон, който движи мускула, повдигащ веждата, е **много рядко** (много по-малко от 1 на 100 пациенти). В такъв случай веждата от тази страна не се повдига и челото не се набръчква; за намаляване на асиметрията може да е необходим ботулинов токсин от другата страна или допълнителна операция.
- **Трайно изтръпване или хронична болка** — Много рядко може да се появи трайна загуба на чувствителност на скалпа, продължителна болка поради притискане на нерв или главоболие; може да е необходимо допълнително лечение.
- **Нарушено кръвоснабдяване на кожата** — Особено при пушачи може да има проблеми със заздравяването по ръбовете на разреза, водещи до по-широк белег и загуба на коса.
- **Затруднено затваряне на очите и сухота в очите** — Ако в същия сеанс е направена и горна блефаропластика, рядко може да има затруднение при пълното затваряне на окото и оплаквания от сухота в очите; повечето са временни.
- **Психологическа неудовлетвореност** — Въпреки технически успешния резултат човек може трудно да свикне с новия си поглед. Откритото обсъждане на очакванията преди операцията намалява този риск.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Бързо нарастващ, напрегнат и болезнен оток** в слепоочието или челото
- **Кървене, което не спира**, от разрезите
- **Температура над 38,5 °C**, засилващо се зачервяване, болка, затопляне или гноен секрет от разрезите
- **Силно главоболие**, което не се повлиява от обезболяващи, повръщане или скованост на врата
- **Замъглено или двойно виждане**, болка в окото или невъзможност окото да се затвори
- Потъмняване на кожата, оцветяване в морав до черен цвят или разтваряне на раната

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- През първите 1–2 седмици спете по гръб с повдигната глава; избягвайте да лежите по корем или върху слепоочията.
- През първите 3–4 седмици не търкайте веждите и челото си, не масажирайте слепоочията и избягвайте движения, които дърпат лицето надолу.
- Отложете химичните и термичните процедури като боядисване, къдрене и изправяне на косата за поне **4–6 седмици**. Използвайте сешоара на топла (не гореща) степен.
- През първите 3–4 седмици избягвайте тежки физически натоварвания, навеждане, вдигане на тежести, сауна и турска баня.
- Ако сте пристигнали от чужбина, пътуването със самолет обикновено е безопасно след първия контролен преглед, най-често от 3–5-ия ден.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че темпоралният лифтинг повдига външната част на веждата и ъгъла на окото и че сам по себе си не коригира цялото чело, вътрешната част на веждата или излишната кожа на клепача.
- ☐ Разбирам, че през първите седмици веждите може да изглеждат по-високо и по-опънато, че повдигнатите тъкани може с времето донякъде да се смъкнат и че ефектът не е постоянен.
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.