Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Тимпанопластика

Възстановяване на тъпанчето (при нужда с възстановяване на слуховите костици и мастоидектомия)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Страна: ☐ Дясна ☐ Лява

Визуализация: ☐ С микроскоп ☐ Ендоскопски
☐ Ще се определи по време на операцията _____

Достъп: ☐ Трансканален (през слуховия проход)
☐ Ретроаурикуларен (зад ухото) ☐ Ендаурален (пред ухото)
_____

Източник на присадката: ☐ Обвивка на слепоочния мускул (темпорална фасция)
☐ Хрущял / перихондриум ☐ Друго _____

Възстановяване на слуховите костици (осикулопластика): ☐ Не се планира ☐ Планира се ☐ При нужда _____

Мастоидектомия: ☐ Не се планира ☐ Планира се ☐ При нужда _____

Дата и резюме на предоперативното изследване на слуха (аудиометрия): _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Тъпанчето (тъпанчевата мембрана) е тънка преграда, която отделя външния слухов проход от средното ухо и предава звуковите трептения към малките костици (слухови костици) в средното ухо. Когато в тъпанчето има

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

отвор (перфорация), слухът намалява, а навлизането на вода или микроби в ухото води до **повтарящо се течение (секреция) от ухото**.

Перфорациите на тъпанчето най-често се дължат на **хронично възпаление на средното ухо (хроничен среден отит)**, а понякога и на травма (шамар, клечка за уши, внезапна промяна на налягането). Малките, скорошни перфорации могат да се затворят спонтанно; дълго съществуващите отвори обаче обикновено не се затварят. При някои пациенти възпалението може да е увредило и слуховите костици или да се е разпространило в костните кухини зад ухото (мастоида). Ако в средното ухо има **холестеатом** (торбичка от кожни клетки, която расте и разрушава костта), неговото лечение е особено важно.

Целта на тимпанопластиката е да се затвори отворът в тъпанчето, средното ухо да се очисти от възпалението, за да се постигне **сухо и безопасно ухо**, и по възможност **слухът да се запази или подобри**.

2 Как се извършва процедурата?

Операцията се извършва под обща анестезия в операционна зала, с помощта на микроскоп и/или ендоскоп.

1. **Достъп:** Ако перфорацията е малка и на подходящо място, операцията може да се извърши изцяло през слуховия проход, без видим белег. При по-големи перфорации или когато е нужен по-добра видимост, се прави малък разрез зад ухото (в гънката зад ушната мида) или пред ухото.
2. **Вземане на присадка:** За възстановяване на тъпанчето се използва собствена тъкан на пациента: обикновено обвивката на мускула над ухото (темпорална фасция) или хрущял от ушната мида заедно с обвивката му (перихондриум). Тези тъкани се вземат през същия или през малък допълнителен разрез.
3. **Почистване на средното ухо:** Ръбовете на перфорацията се освежават, тъпанчето се повдига и средното ухо се оглежда; възпалената тъкан и сраствания, ако има такива, се отстраняват. Проверяват се слуховите костици.
4. **Възстановяване на костиците (при нужда):** Ако веригата от слухови костици е разрушена или прекъсната, тя може да бъде възстановена със собствена костица/хрущял на пациента или с биосъвместима протеза, например от титан.
5. **Мастоидектомия (при нужда):** Ако възпалението или холестеатомът са се разпространили в костните кухини зад ухото, те се отварят и почистват със специална бормашина.
6. **Поставяне на присадката и затваряне:** Присадката се поставя под или над перфорацията. Средното ухо и слуховият проход се поддържат с разтварящи се гъбести тампони. Разрезът, ако има такъв, се зашива и върху ухото се поставя компресивна превръзка.

Ако се установи холестеатом, при някои пациенти може да се планира **втора, контролна операция след 6–12 месеца**, за да се потвърди, че заболяването е напълно отстранено. Това ще ви бъде обяснено отделно.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия	Около 1,5–3 часа (по-дълго при мастоидектомия)	Обикновено изписване в същия ден или след 1 нощ в болница

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Затваряне на отвора в тъпанчето
- Намаляване или прекратяване на течението от ухото и на възпаленията; сухо и безопасно ухо
- По-малко ограничения за предпазване на ухото при къпане, душ и плуване
- Запазване или подобряване на слуха при подходящи пациенти
- При наличие на холестеатом — отстраняване на заболяването и предотвратяване на възможните му сериозни усложнения

Трайно затваряне на перфорацията се постига при около **85–95%** от пациентите. Подобряването на слуха зависи от състоянието на слуховите костици, разпространението на възпалението и здравето на вътрешното

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ухо; слухът може значително да се подобри, да остане същият или рядко да се влоши. Ако присадката не се прихване или се образува нова перфорация, операцията може да бъде повторена.

4 Други възможности за лечение

- **Наблюдение и предпазване на ухото от вода:** При малки, сухи перфорации състоянието може да се проследява с редовни прегледи и предпазване на ухото от вода. Отворът остава и рискът от възпаление продължава.
- **Медикаментозно лечение:** При обостряне с течение от ухото антибиотичните капки за уши временно овладяват възпалението; те не затварят отвора.
- **Слухов апарат:** Може да компенсира загубата на слуха; при течащо ухо обаче използването му може да е затруднено и той не затваря отвора.
- **Обикновено „закърпване“ при малки перфорации:** При много малки отвори може да се обсъди затваряне с хартиена лепенка или мастна тъкан (миринготластика).

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Без операция отворът в тъпанчето обикновено остава. При попадане на вода в ухото или при настинки течението от ухото може да се повтаря, а с времето загубата на слуха може да се задълбочи. Нелекуваният холестеатом продължава да расте и може да доведе до сериозни усложнения като **трайна загуба на слуха, световъртеж, парализа на лицевия нерв, менингит или мозъчен абсцес**.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се прави изследване на слуха (аудиометрия) и при нужда компютърна томография. Ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- Не трябва да ядете и пиете нищо **6–8 часа** преди операцията (следвайте указанията на анестезиолога).
- Ако ухото тече активно, преди операцията може да се наложи то да бъде „изсушено“ с капки.
- В деня на операцията косата зад ухото може да бъде леко скъсена. При грип или инфекция на горните дихателни пътища операцията може да бъде отложена.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 24–48 часа	Усещането за пълнота, лека болка и запушване на ухото е нормално и се овладява с обезболяващи. Може да има кратко леко замайване и гадене. Компресивната

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	превръзка обикновено се сваля на 1-вия ден. Избягвайте да лежите върху оперираното ухо.
1–2-ра седмица	Поради тампоните в слуховия проход слухът в този период ще ви се струва **намален**; това е нормално. Може да има слаба кървениста секреция от ухото. Конците обикновено се свалят на **7–10-ия ден**. Повечето хора се връщат на офис работа в рамките на 1 седмица.
3–6-а седмица	Тампоните в слуховия проход се почистват при контролните прегледи или се разтварят сами. В ухото в никакъв случай не трябва да попада вода. Тежките физически натоварвания, вдигането на тежести и напъването трябва да се отложат за около **4–6 седмици**. Пътуване със самолет обикновено е възможно **след 2–4 седмици** с одобрението на лекаря.
2–3-ти месец	При контролните прегледи се оценява дали присадката се е прихванала. Изследването на слуха в този период показва ефекта на операцията върху слуха. Плуването и контактът на ухото с вода обикновено се разрешават след одобрение от лекаря.
6–12-и месец	Тъпанчето и средното ухо завършват заздравяването си. След операция за холестеатом се планират редовни прегледи и при нужда образни изследвания или втора, контролна операция.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Усещане за пълнота и запушване на ухото и намален слух през първите седмици (поради тампоните в слуховия проход)
- Лека болка в ухото, пукане, усещане за плискане на вода или бучене
- Слаба кървениста секреция от ухото (първите дни)
- Временно изтръпване на ушната мида и около разреза; ушната мида може да изглежда леко избутана напред (при достъп зад ухото, отзвучава за седмици)

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Промяна във вкуса** — Вкусовият нерв (тъпанчева струна, chorda tympani), който минава непосредствено зад тъпанчето, може да бъде разтегнат по време на операцията или рядко да се наложи да бъде прерязан. При около **5–20 от 100** пациенти се появява метален вкус, намален вкус или усещане за сухота от тази страна на езика; обикновено **отзвучава или престава да се усеща в рамките на седмици до месеци**. Рядко може да е трайно.
- **Шум в ушите (тинитус)** — След операцията може да се появи шум в ухото или съществуващият шум да се засили за известно време; обикновено е временен.
- **Временен световъртеж** — През първите дни може да има лека нестабилност или световъртеж; обикновено отзвучава за няколко дни.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Нечести състояния

- **Неприхващане на присадката или нова перфорация** — При около **5–15 от 100** пациенти тъпанчето може да не се затвори напълно или по-късно отново да се образува отвор. В такъв случай течението от ухото може да продължи и **може да се наложи повторна операция**.
- **Слухът не се подобрява** — Дори тъпанчето да се затвори, слухът може да не се подобри според очакванията поради състоянието на слуховите костици, вентилацията на средното ухо или вътрешното ухо. След възстановяване на костиците протезата може да се размести или да бъде изтласкана през тъпанчето; може да е необходима допълнителна операция.
- **Инфекция и течение от ухото** — След операцията може да има течение от ухото или инфекция на раната; обикновено отзвучава с капки или антибиотици. Възпалението на хрущяла на ушната мида (перихондрит) е рядко, но може да остави деформация на хрущяла.
- **Стесняване на слуховия проход или латерализация на тъпанчето** — Белезна тъкан може да стесни слуховия проход или новото тъпанче да се отмести от правилното си положение; това може да засегне слуха и да наложи коригираща процедура.
- **Рецидив или остатъчен холестеатом** — След операция за холестеатом при част от пациентите заболяването може да се появи отново или малък остатък да нарасне; затова са необходими дългосрочно проследяване и при нужда **повторна операция**.
- **Проблеми с раната и белега** — На разреза зад ухото може да се образува задебелен белег или келоид, а рядко — събиране на течност зад ухото.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Трайна загуба на слуха поради увреждане на вътрешното ухо** — При **по-малко от 1 на 100** пациенти поради засягане на вътрешното ухо може да се развие **трайна сензоневрална (перцептивна) загуба на слуха**; много рядко слухът в оперираното ухо може да бъде загубен напълно („мъртво ухо“). Това може да наложи слухов апарат или друга слухова рехабилитация. Рискът е по-висок при холестеатом и заболяване в близост до вътрешното ухо.
- **Продължителен световъртеж и нарушение на равновесието** — Рядко засягането на вътрешното ухо може да причини световъртеж, продължаващ седмици; може да са необходими упражнения за равновесие и лекарства.
- **Парализа на лицевия нерв** — Тъй като лицевият нерв преминава през средното ухо, много рядко (при **значително по-малко от 1 на 100** пациенти) може да се развие временна или трайна слабост на лицето от тази страна. Рискът е по-висок при холестеатом, повторни операции и вроден необичаен ход на нерва. Ако настъпи, може да са необходими лекарства, защита на окото и при нужда операция (декомпресия или възстановяване на нерва). Ако е трайна, може да останат асиметрия на лицето и непълно затваряне на окото, което налага продължителна защита на окото и евентуално операции за възстановяване на мимиката (реанимация на лицето).
- **Усложнения, засягащи мозъчните обвивки** — Особено при мастоидектомия и операции за холестеатом, когато костта на черепната основа е изтъняла, много рядко може да настъпи изтичане на гръбначно-мозъчна течност (ликворея), менингит или нараняване на мозъчната обвивка; това може да наложи допълнително болнично лечение (понякога в интензивно отделение) и операция, а менингитът рядко може да остави трайни увреждания.
- **Трайна промяна във формата на ушната мида** — Във връзка с достъпа зад ухото или вземането на хрущялна присадка рядко може да остане лека трайна промяна в положението или формата на ушната мида.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Внезапна, изразена загуба на слуха** (рязко влошаване, различно от запушването, причинено от тампоните)
- **Силен световъртеж**, повръщане и невъзможност да стоите прави
- **Слабост на лицето**: увисване на ъгъла на устата, невъзможност да затворите окото
- **Температура над 38,5 °C**, засилваща се болка в ухото, зачервяване и оток на ушната мида или гнойна секреция с неприятна миризма
- **Бистра, водниста секреция** от ухото, силно главоболие или скованост на врата
- **Кървене, което не спира**, от превръзката или ухото

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Докато лекарят не ви разреши, **в никакъв случай не допускайте вода в ухото**: под душа запушвайте ухото с памук, намазан с вазелин; не влизайте в басейн или море.
- През първите **4–6 седмици не се секнете**; ако трябва да кихнете, кихайте с отворена уста. Не стискайте носа си, докато напъвате (не правете маньовър на Валсалва).
- През първите седмици избягвайте вдигане на тежести, напъване, навеждане и тежки физически натоварвания. Уведомете лекаря, ако имате запек.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Задължително получете одобрение от лекаря си за пътуване със самолет, гмуркане и дейности, свързани с промяна на налягането; за **гмуркане** обикновено е необходимо по-дълго изчакване.
- Не поставяйте клечки за уши или други предмети в слуховия проход; използвайте предписаните капки за уши според указанията.
- Ако сте пристигнали от чужбина, планирайте пътуването си обратно заедно с лекаря; контролните прегледи и изследванията на слуха след завръщането могат да продължат при местен УНГ лекар.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.

☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че основната цел на операцията е да се затвори отворът в тъпанчето и да се постигне сухо и безопасно ухо; че подобряването на слуха не може да бъде гарантирано и че рядко слухът може да се влоши.
- ☐ Обяснено ми е, че в зависимост от находката по време на операцията може да е необходимо възстановяване на слуховите костици или мастоидектомия, и давам съгласие тези процедури да бъдат извършени, както е отбелязано по-горе.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.