Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Fettabsaugung am Kinn (submentale Liposuktion)

Entfernung von Fett unter dem Kinn (Fettabsaugung beim Doppelkinn)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Geplante Technik: ☐ Konventionell (Tumeszenztechnik) ☐ Energiegestützt (Laser/RF) ☐ Wird von der Operateurin/dem Operateur entschieden

Betäubung: ☐ Örtliche Betäubung ☐ Örtliche Betäubung + Sedierung ☐ Vollnarkose _____

Gleichzeitig durchgeführte Eingriffe: ☐ Keine ☐ Mit gesonderter Einwilligungserklärung: _____

Anliegen und Erwartungen der Patientin/des Patienten: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Fettansammlungen unter dem Kinn (ein „Doppelkinn“) können den Winkel zwischen Kinn und Hals verwischen, sodass die Kieferlinie weniger konturiert, müde oder fülliger wirkt, als sie tatsächlich ist. Fett in diesem Bereich ist häufig **erblich bedingt** und verschwindet selbst durch Gewichtsabnahme oder Sport oft nicht vollständig. Der altersbedingte Verlust der Hautelastizität lässt es zusätzlich deutlicher hervortreten.

Bei der submentalen Liposuktion wird das **Fett unter der Haut** über feine Kanülen abgesaugt. Ziel ist es, die Kieferlinie zu konturieren und einen **natürlichen, ausgewogenen Kinn-Hals-Winkel** zu erreichen.

Der wichtigste Faktor für das Ergebnis ist **die Qualität und Elastizität der Haut**. Elastische Haut passt sich nach der Fettentfernung der neuen Kontur an; wenig elastische Haut kann stärker erschlafft wirken. Tiefes Fett unter dem Halsmuskel (Platysma), große Speicheldrüsen, ausgeprägte Halsstränge (Platysmabänder) und eine starke Hauterschlaffung lassen sich durch eine Fettabsaugung nicht korrigieren; in diesen Fällen können andere Verfahren, z. B. ein tiefes Halslifting, erforderlich sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Vor der Operation werden Kinn und Hals untersucht, die Hautelastizität wird beurteilt, es werden Fotos angefertigt, und der zu behandelnde Bereich wird im Sitzen angezeichnet.

1. **Betäubung und Infiltration von Flüssigkeit:** In den Bereich wird eine spezielle Flüssigkeit (Tumeszenzlösung) eingespritzt, die ein örtliches Betäubungsmittel und ein blutungsminderndes Medikament enthält. Diese Flüssigkeit verhindert Schmerzen und verringert zudem Blutungen und Blutergüsse.
2. **Kleine Schnitte:** In der natürlichen Falte unter dem Kinn und bei Bedarf hinter den Ohrläppchen werden kleine Zugänge von etwa **3–5 mm** angelegt.
3. **Fettentfernung:** Das Fett wird über feine Kanülen (Metallröhrchen) sorgfältig und gleichmäßig abgesaugt. Unter der Haut wird eine dünne Fettschicht belassen, damit die Oberfläche glatt bleibt.
4. **Energiegestützte Behandlung (falls geplant):** Mit Laser- oder Radiofrequenzenergie wird das Fett aufgeweicht und eine gewisse Straffung der Haut unterstützt. Dies kann zur Hautstraffung beitragen, korrigiert aber keine deutliche Erschlaffung.
5. **Wundverschluss und Kompressionsverband:** Die Zugänge werden mit einer einzelnen Naht verschlossen oder heilen von selbst zu. Am Ende der Operation wird eine **elastische Kompressionsbandage (Kinnband)** um Kinn und Hals angelegt.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Örtliche Betäubung, örtliche Betäubung + Sedierung oder Vollnarkose	Etwa 45–90 Minuten (wenn der Eingriff allein durchgeführt wird)	In der Regel Entlassung am selben Tag

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Verringerung von überschüssigem Fett unter dem Kinn
- Eine besser konturierte Kieferlinie und ein definierterer Kinn-Hals-Winkel; ein ausgewogeneres Gesichtsprofil
- Ein **lang anhaltendes** Ergebnis, solange Ihr Gewicht stabil bleibt, da die entfernten Fettzellen nicht nachwachsen (natürliche Alterungsveränderungen von Haut und Gewebe setzen sich fort)

Die meisten Patienten mit guter Hautelastizität sind mit dem Ergebnis zufrieden. Das Ergebnis zeigt sich mit dem Abklingen der Schwellung innerhalb von **3–6 Monaten**. Bei etwa **3–5 von 100** Patienten kann wegen Unregelmäßigkeiten, verbliebenem Fett oder Asymmetrie ein kleiner Korrektureingriff erforderlich sein. Eine deutliche Gewichtszunahme und das Älterwerden können das Ergebnis mit der Zeit beeinflussen.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Verzicht auf den Eingriff:** Da es sich um einen ästhetischen Eingriff handelt, haben Sie immer die Möglichkeit, ihn nicht durchführen zu lassen.
- **Gewichtsabnahme und Änderungen des Lebensstils:** Verringern das Körperfett insgesamt, beseitigen aber hartnäckiges Fett unter dem Kinn nicht immer.
- **Fettlösende Injektionen (z. B. Deoxycholsäure):** Erfordern mehrere Sitzungen, können deutliche Schwellungen und Schmerzen verursachen und haben eine begrenztere Wirkung.
- **Fettreduktion durch Kälte (Kryolipolyse) und gerätegestützte Behandlungen:** Nicht operativ, erfordern aber mehrere Sitzungen und haben eine begrenztere Wirkung.
- **Tiefes Halslifting / Halsstraffung:** Die besser geeignete Option bei deutlicher Hauterschlaffung, Halssträngen oder tiefem Fett unter dem Muskel.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne Eingriff bleibt das Erscheinungsbild unter Ihrem Kinn unverändert und kann mit dem Alter oder bei Gewichtszunahme zunehmen. Für Ihre Gesundheit besteht dadurch keine Gefahr.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen durchgeführt; ist eine Sedierung oder Vollnarkose geplant, werden Sie von der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt untersucht und müssen vorher nüchtern bleiben.
- Ihr Gewicht sollte vor dem Eingriff möglichst stabil sein; wenn Sie in nächster Zeit eine deutliche Gewichtsveränderung planen, besprechen Sie dies mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt.
- Tragen Sie am Operationstag keine Creme und kein Make-up auf Gesicht und Hals auf; ziehen Sie ein bequemes, vorne zu öffnendes Oberteil statt eines hochgeschlossenen an.
- Nach Sedierung oder Vollnarkose dürfen Sie nicht selbst Auto fahren; bitte lassen Sie sich von einer Begleitperson nach Hause bringen.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 48 Stunden	Unter dem Kinn bestehen Schwellung, Spannungsgefühl und leichte Schmerzen, und aus den Zugängen kann etwas rosafarbene Flüssigkeit austreten; das ist normal. Blutergüsse können sich, **falls sie auftreten**, bis zum Hals ausbreiten und klingen innerhalb von 1–2 Wochen ab. Schlafen Sie mit erhöhtem Kopf und tragen Sie die Bandage durchgehend.
1. Woche	Die Bandage wird in der Regel **in der ersten Woche Tag und Nacht** und danach **weitere 2–3 Wochen nachts** getragen. Eventuelle Fäden werden am 5.–7. Tag gezogen. Die meisten Patienten kehren innerhalb von 3–7 Tagen zur Bürotätigkeit und ins gesellschaftliche Leben zurück.
2.–6. Woche	Die Schwellung geht weitgehend zurück. Im Bereich können Verhärtungen, kleine Knötchen und ein Taubheitsgefühl spürbar sein; diese werden mit der Zeit weicher. Anstrengender Sport kann in der Regel nach **2–3 Wochen** wieder aufgenommen werden. Massieren Sie den Bereich sanft, wenn dies empfohlen wird.
3.–6. Monat	Restschwellung und Verhärtung bilden sich zurück, die Haut passt sich der neuen Kontur an, und das Ergebnis wird deutlich.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Schwellung, Spannungsgefühl und leichte Schmerzen unter dem Kinn und am Hals; Blutergüsse klingen, **falls sie auftreten**, innerhalb von 1–2 Wochen ab
- Austritt rosafarbener Flüssigkeit aus den Zugängen in den ersten 24–48 Stunden
- Vorübergehendes Taubheitsgefühl und vermindertes Gefühl im Bereich
- Leichte Verhärtung und kleine tastbare Knötchen über mehrere Wochen

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Länger anhaltende Verhärtungen und Knötchen (Fibrose)** — Verhärtungen und Knötchen unter der Haut sind während der Heilung häufig; die meisten werden innerhalb einiger Monate durch Massage und mit der Zeit weicher.
- **Länger anhaltendes Taubheitsgefühl** — Ein vermindertes Gefühl der Haut unter dem Kinn kann einige Wochen bis einige Monate anhalten; sehr selten ist es dauerhaft.
- **Leichte Asymmetrie** — Da die beiden Gesichtshälften nie vollkommen symmetrisch sind, können kleine Unterschiede bestehen bleiben.

Gelegentliche Beschwerden

- **Konturunregelmäßigkeiten und Dellen** — Bei etwa **2–5 von 100** Patienten können Wellen, Dellen oder verbliebene Fettdepots auftreten. Wird zu viel Fett entfernt, können unter dem Kinn ein eingefallenes oder „skelettiertes“ Aussehen und deutlicher sichtbare Halsstränge entstehen. Zur Korrektur können eine Eigenfettinjektion, eine erneute Fettabsaugung oder ein anderer Eingriff erforderlich sein.
- **Hauterschlaffung oder unzureichende Straffung** — Insbesondere bei Menschen mit verminderter Hautelastizität strafft sich die Haut nach der Fettentfernung möglicherweise nicht ausreichend, und die Erschlaffung kann auffälliger wirken. In diesem Fall kann künftig eine Halsstraffung erforderlich sein.
- **Asymmetrisches Lächeln (Beeinträchtigung des Nervenastes zur Unterlippe)** — Ein feiner Nervenast, der entlang der Kieferlinie verläuft und die Unterlippe bewegt, kann durch Schwellung oder Druck beeinträchtigt werden, was beim Lächeln zu einer Asymmetrie der Unterlippe führt. Dies tritt bei etwa **1 von 100** Patienten auf und bildet sich fast immer **innerhalb von einigen Wochen bis einigen Monaten** von selbst zurück; eine dauerhafte Schwäche ist sehr selten.
- **Ansammlung von Blut oder Flüssigkeit (Hämatom, Serom)** — Tritt bei **weniger als 1 von 100** Patienten auf. Kleine Ansammlungen bilden sich von selbst zurück; größere müssen unter Umständen mit einer Nadel oder einem kleinen Eingriff entleert werden.
- **Infektion** — Tritt bei **weniger als 1 von 100** Patienten auf; sie bessert sich meist mit Antibiotika, selten muss ein Abszess eröffnet werden.
- **Narben oder Verfärbungen an den Zugängen** — Die kleinen Narben an den Zugängen werden meist unauffällig; selten können eine Dunkelfärbung, Verdickung oder eine kleine Delle zurückbleiben.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Hautverbrennung (bei energiegestützten Verfahren)** — Beim Einsatz von Laser oder Radiofrequenz können trotz Sicherheitsmaßnahmen selten eine Hautverbrennung, Blasenbildung und eine bleibende Narbe entstehen; eine Wundversorgung und Narbenbehandlung können erforderlich sein.
- **Hautschädigung oder Gewebeverlust** — Sehr selten kann, insbesondere bei Raucherinnen und Rauchern, eine gestörte Durchblutung der Haut zu einer Wunde und Narbenbildung führen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Dauerhafte Nervenschädigung** — Eine dauerhafte Schwäche der Unterlippenbewegung ist äußerst selten; tritt sie auf, kann eine weitere Behandlung erforderlich sein.
- **Reaktion auf das örtliche Betäubungsmittel** — Es kann eine Allergie gegen das örtliche Betäubungsmittel auftreten, oder ein hoher Blutspiegel kann Schwindel, Ohrensausen, einen metallischen Geschmack im Mund und sehr selten Krampfanfälle oder Herzrhythmusstörungen verursachen. Die Dosierungen werden innerhalb sicherer Grenzen gehalten.
- **Fettembolie und Verletzung tieferer Strukturen oder der Atemwege** — Dass Fetttröpfchen in den Blutkreislauf gelangen oder die Kanüle tiefere Strukturen verletzt, ist bei einer Fettabsaugung kleinen Volumens unter dem Kinn **äußerst selten**; käme es dazu, könnte eine Notfall- und intensivmedizinische Behandlung im Krankenhaus erforderlich sein.
- **Psychische Unzufriedenheit** — Trotz eines technisch erfolgreichen Ergebnisses kann es einem Menschen schwerfallen, sich an sein neues Aussehen zu gewöhnen. Ein offenes Gespräch über die Erwartungen vor der Operation verringert dieses Risiko.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Rasch zunehmende, harte, pralle Schwellung** am Hals, besonders auf einer Seite
- **Atem- oder Schluckbeschwerden** oder eine Veränderung Ihrer Stimme
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Schmerzen, Rötung, Überwärmung oder übel riechende Absonderung
- Weiß, dunkelviolett oder schwarz verfärbte Haut; mit Flüssigkeit gefüllte Blasen
- Brustschmerzen, Atemnot oder Verwirrtheit

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Tragen Sie die Bandage regelmäßig für den empfohlenen Zeitraum; achten Sie darauf, dass sie weder zu eng noch zu locker sitzt.
- Schlafen Sie in den ersten 1–2 Wochen auf dem Rücken mit erhöhtem Kopf; vermeiden Sie plötzliches oder übermäßiges Überstrecken des Halses.
- Vermeiden Sie in den ersten 2–3 Wochen anstrengenden Sport, Sauna, Hamam (Dampfbad) und lange heiße Duschen.
- Schützen Sie den Bereich in den ersten Monaten vor der Sonne; dies verringert das Risiko von Narben und Verfärbungen.
- Achten Sie darauf, Ihr Gewicht stabil zu halten, um das Ergebnis zu erhalten.
- Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, ist eine Flugreise in der Regel ab dem 2.–3. Tag unbedenklich.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.
- ☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich habe verstanden, dass das Ergebnis von meiner Hautelastizität abhängt und dass eine Fettabsaugung keine Hauterschlaffung, keine Halsstränge und kein tiefes Fett unter dem Muskel korrigiert.
- ☐ Ich habe verstanden, dass das Tragen der Bandage und das Befolgen der gegebenen Empfehlungen das Ergebnis unmittelbar beeinflussen.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.