Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Traitement par PRP (plasma riche en plaquettes)

Injection dans la peau ou le cuir chevelu d'un plasma préparé à partir de votre propre sang

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Lieu de réalisation de l'acte : _____

Kit utilisé / N° de LOT : _____

Volume de sang prélevé (mL) : _____

Activateur / additif : ☐ Aucun ☐ Chlorure de calcium ☐ Autre _____

Zone traitée : ☐ Visage ☐ Cuir chevelu ☐ Contour des yeux (cernes) ☐ Cou / décolleté ☐ Autre _____

N° de séance / nombre de séances prévu : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Le PRP (Platelet-Rich Plasma, ou plasma riche en plaquettes) est un plasma préparé **à partir de votre propre sang** et enrichi en plaquettes. Les plaquettes contiennent des facteurs de croissance naturels qui jouent un rôle dans la réparation des tissus.

Le PRP est utilisé pour améliorer la qualité, l'éclat et l'élasticité de la peau, pour atténuer l'aspect des ridules et des cernes d'aspect fatigué, pour contribuer à l'amélioration des cicatrices d'acné, ou pour soutenir les follicules pileux en cas de **chute de cheveux**. Comme il est préparé à partir de votre propre sang, une allergie au produit lui-même ou un rejet par l'organisme ne sont pas attendus.

2 Comment se déroule l'intervention ?

Le traitement est réalisé dans notre cabinet, dans des conditions stériles, à l'aide de **kits à usage unique en système clos**. Le nom et le numéro de LOT du kit sont consignés dans votre dossier.

1. **Prélèvement sanguin :** généralement 10–30 mL de sang sont prélevés dans une veine du bras, comme pour une prise de sang habituelle.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2. **Préparation :** le sang est séparé par centrifugation dans un tube spécial contenant un anticoagulant, et la fraction de plasma riche en plaquettes est recueillie dans des conditions stériles. À chaque étape, on vérifie que les tubes sont bien les vôtres.
3. **Préparation de la zone :** la zone à traiter est nettoyée avec un antiseptique ; une crème anesthésiante peut être appliquée si vous le souhaitez.
4. **Traitement :** le plasma est injecté dans la peau ou le cuir chevelu en de nombreux petits points à l'aide d'une aiguille fine ou d'une canule, ou parfois étalé sur la peau en association avec un microneedling.
5. **Fin du soin :** la zone est nettoyée, une compresse froide est appliquée si nécessaire et des conseils de soins vous sont donnés.

Une cure de **3–4 séances, espacées de 4–6 semaines**, est généralement recommandée, suivie de séances d'entretien tous les 4–6 mois.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Crème anesthésiante (facultative)	Environ 45–60 minutes (préparation comprise)	Le jour même ; courte surveillance après le traitement

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Une peau d'aspect plus frais, plus lumineux et plus ferme, avec des ridules moins visibles
- Des cernes moins foncés et un aspect moins fatigué sous les yeux
- En cas de chute de cheveux, une aide pour réduire la chute et augmenter l'épaisseur des cheveux
- Aucune allergie au plasma lui-même n'est attendue, puisque votre propre sang est utilisé

Les résultats varient d'une personne à l'autre. Les preuves scientifiques diffèrent selon l'objectif : de nombreuses études rapportent des résultats positifs dans la **chute de cheveux androgénétique (héréditaire)**, tandis que les données concernant le rajeunissement cutané sont plus limitées. Les techniques et les kits diffèrent également. L'effet apparaît progressivement et n'est pas permanent ; aucun résultat précis ne peut être garanti.

4 Autres options thérapeutiques

- **Absence de traitement**, ou poursuite de soins réguliers de la peau et d'une protection solaire
- **En cas de chute de cheveux :** recherche d'une cause sous-jacente (fer, thyroïde, hormones) ; médicaments tels que le minoxidil sur avis médical ; mésothérapie du cuir chevelu ; greffe de cheveux dans les cas avancés
- **Pour la peau :** produits topiques, mésothérapie, traitements à l'acide hyaluronique visant la qualité de la peau, peelings chimiques, laser ou microneedling

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si le PRP n'est pas réalisé, votre peau ou vos cheveux poursuivront leur évolution naturelle. Selon sa cause, la chute de cheveux peut progresser ; d'autres options de traitement peuvent toujours être envisagées. Le fait de ne pas réaliser de PRP ne comporte aucun risque pour votre santé.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- **Situations dans lesquelles le PRP n'est pas réalisé :** nombre de plaquettes bas ou dysfonctionnement plaquettaire, troubles de la coagulation ou maladies hémorragiques, anémie importante, infection active ou fièvre, traitement anticancéreux en cours ou antécédent de cancer du sang au cours des dernières années, grossesse et allaitement. Veuillez nous signaler si l'une de ces situations vous concerne.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Si vous prenez des anticoagulants ou antiagrégants (warfarine, rivaroxaban, apixaban, clopidogrel, etc.), informez-en votre médecin avant le traitement ; **n'arrêtez pas ces médicaments de vous-même**.
- Si possible, arrêtez l'aspirine et les anti-inflammatoires (ibuprofène, naproxène, etc.) 1 semaine avant le traitement, après en avoir parlé avec votre médecin ; ces médicaments peuvent diminuer la fonction des plaquettes.
- Signalez-nous si vous avez pris des corticoïdes (cortisone) en comprimés ou en injections au cours des 2–3 dernières semaines ; ils peuvent diminuer l'effet du PRP et le traitement peut devoir être reporté.
- Le jour du traitement, buvez beaucoup d'eau et prenez un repas léger ; venir à jeun augmente le risque d'étourdissement.
- Pour un traitement du cuir chevelu, lavez-vous les cheveux la veille ou le matin du traitement et n'utilisez ni gel, ni laque, ni produits similaires.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières heures	Une rougeur, un léger gonflement, une sensation de tension et de petites élevures aux points de piqûre apparaissent dans la zone traitée. Le point de prélèvement sanguin peut être légèrement sensible.
Premières 24 heures	Ne vous maquillez pas ; évitez le sauna, le hammam, les cabines de bronzage (UV), le sport intense et l'exposition directe au soleil. Après un traitement du cuir chevelu, attendez au moins le lendemain pour vous laver les cheveux.
Jours 2–7	La rougeur et le gonflement disparaissent. Si des ecchymoses **apparaissent** (en particulier sous les yeux), elles s'estompent en 3–7 jours.
Pendant la cure	Les séances sont renouvelées toutes les 4–6 semaines. Les changements de la peau sont généralement remarqués après la 2e ou la 3e séance ; ceux des cheveux en 3–6 mois.
Après la cure	L'effet s'estompe progressivement ; des séances d'entretien tous les 4–6 mois peuvent être recommandées pour le maintenir.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Légère douleur ou sensation de brûlure lors du prélèvement sanguin et des injections

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Rougeur, léger gonflement, sensibilité et tension dans la zone traitée (quelques heures à 2 jours)
- Minuscules points de sang aux points de piqûre

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Ecchymoses** — Peuvent apparaître dans la zone traitée ou au point de prélèvement sanguin ; elles disparaissent d'elles-mêmes en 3–7 jours.
- **Maux de tête ou sensibilité du cuir chevelu** — Peuvent durer 1–2 jours après un traitement du cuir chevelu ; ils passent avec des antalgiques simples (le paracétamol est recommandé plutôt que l'aspirine).
- **Effet moindre que prévu** — Certaines personnes peuvent ne constater aucun changement net, ou l'effet peut être de courte durée.

Situations peu fréquentes

- **Sensation de malaise** — Des vertiges, des sueurs et un bref évanouissement peuvent survenir pendant le prélèvement sanguin ou les injections ; cela passe rapidement en position allongée.
- **Augmentation temporaire de la chute des cheveux** — Une augmentation temporaire de la chute peut survenir au cours des premières semaines après un traitement du cuir chevelu ; elle disparaît généralement d'elle-même.
- **Gonflement prolongé** — Le gonflement, en particulier sous les yeux, peut durer quelques jours.
- **Modification de couleur** — Un assombrissement temporaire aux points de piqûre peut survenir sur les peaux mates à foncées et en cas d'exposition au soleil.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Infection** — Très rare avec une technique stérile ; si elle survient, un traitement antibiotique et, rarement, un drainage du pus peuvent être nécessaires.
- **Allergie aux substances contenues dans le kit** — Une allergie au plasma lui-même n'est pas attendue ; cependant, très rarement, une réaction allergique peut survenir à l'anticoagulant ou à l'activateur contenus dans le kit, à la crème anesthésiante ou à l'antiseptique.
- **Obstruction d'un vaisseau sanguin (occlusion vasculaire)** — Lors d'injections profondes au niveau du visage, de manière **extrêmement rare**, le produit peut pénétrer dans un vaisseau sanguin ou le comprimer, entraînant une altération de la vascularisation de la peau et une cicatrice et, encore plus rarement, des troubles de la vision. Une reconnaissance précoce et un traitement en urgence sont très importants.
- **Irritation d'un nerf** — Si un nerf est touché lors du prélèvement sanguin ou de l'injection, un engourdissement ou des fourmillements temporaires peuvent survenir ; très rarement, ils peuvent durer plus longtemps.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Malaise (réaction vasovagale) :** Des vertiges, des sueurs et un bref évanouissement peuvent survenir pendant une injection ou une prise de sang ; ils passent rapidement en position allongée.
- **Infection :** Grâce à la désinfection de la peau et au matériel stérile, le risque est très faible ; si elle survient, elle est généralement traitée par antibiotiques.
- **Réaction allergique :** Au produit, à l'anesthésique local ou à l'antiseptique utilisé — allant d'une légère rougeur à, très rarement, une réaction allergique grave (anaphylaxie). Notre cabinet dispose du matériel et des médicaments d'urgence.
- **Réactivation d'un bouton de fièvre (herpès) :** Si vous avez déjà eu des boutons de fièvre, ils peuvent réapparaître dans la zone traitée ; merci de nous le signaler.
- **Résultat ne répondant pas aux attentes :** L'intensité et la durée de l'effet varient d'une personne à l'autre ; des séances supplémentaires ou une retouche peuvent être nécessaires.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Douleur intense et soudaine, blanchiment de la peau ou coloration violacée en réseau** pendant ou après le traitement
- **Vision floue, perte de la vue**, vision double ou douleur oculaire
- **Rougeur, chaleur, gonflement ou écoulement d'aspect purulent croissants** dans la zone traitée, ou fièvre supérieure à 38 °C
- Gonflement du visage, des lèvres ou de la langue, **essoufflement**, ou éruption cutanée généralisée avec démangeaisons
- Gonflement, douleur ou engourdissement croissants du bras où le sang a été prélevé

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Ne vous maquillez pas pendant les 24 premières heures ; évitez le sauna, le hammam, les cabines de bronzage (UV), le sport intense et les piscines.
- Pendant les 3 jours qui suivent le traitement, il vous est conseillé de ne pas prendre d'anti-inflammatoires (ibuprofène, naproxène, aspirine) ; en cas de douleur, vous pouvez prendre du paracétamol.
- Utilisez chaque jour une crème solaire à indice de protection élevé pendant la cure ; après un traitement du cuir chevelu, attendez au moins 3 jours avant une coloration ou une permanente.
- Le tabac diminue l'effet des plaquettes et nuit à la cicatrisation ; il est recommandé d'arrêter de fumer si possible.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.

☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

12 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

13 Déclaration du patient

☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.

☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.

☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.

☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.

☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.

☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.

☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.

☐ Je comprends que le PRP sera préparé à partir de mon propre sang, que les informations relatives au kit utilisé seront consignées dans mon dossier et qu'il sera vérifié à chaque étape que les tubes sont bien les miens.

☐ J'ai donné des informations exactes sur les situations pouvant contre-indiquer le traitement par PRP : maladies du sang, antécédents de cancer, prise d'anticoagulants/antiagrégants et grossesse.

☐ Je comprends que l'effet varie d'une personne à l'autre, que plusieurs séances sont nécessaires et que le résultat n'est pas permanent.

☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**

☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

14 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien avec le patient :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.