Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Септопластика

Операция по выпрямлению центральной стенки носа (носовой перегородки)

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Процедуры, выполняемые одновременно:
☐ Уменьшение носовых раковин (радиочастотное / подслизистое)
☐ Эндоскопическая операция на околоносовых пазухах — FESS (по отдельной форме согласия)
☐ Нет _____

Шины / тампоны в носу:
☐ Силиконовые шины ☐ Тампоны ☐ Не требуются
☐ Будет решено во время операции _____

Жалобы пациента (сторона заложенности, храп, головная боль и т. д.): _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Стенка из хряща и тонкой кости, которая разделяет полость носа на правую и левую половины, называется **носовой перегородкой**. Если перегородка изогнута в одну или обе стороны, это называется **искривлением носовой перегородки**. Оно может быть врождённым, развиться в период роста или возникнуть после удара по носу.

Искривлённая перегородка может вызывать заложенность носа, дыхание через рот, храп, плохой сон, сухость во рту, носовые кровотечения, а у некоторых людей — эпизоды синусита или головной боли. Поскольку это структурная проблема, она не устраняется лекарствами. Цель септопластики — выпрямить искривлённые участки, чтобы вы могли **свободно дышать носом**. Эта операция не направлена на изменение внешней формы носа.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как выполняется процедура?

Операция обычно проводится под общей анестезией в операционной, полностью через ноздри. Видимого разреза или рубца на лице не остаётся.

1. **Разрез:** Внутри ноздри делают небольшой разрез слизистой оболочки, покрывающей перегородку.
2. **Отслаивание слизистой:** Слизистую оболочку, покрывающую перегородку с обеих сторон, бережно отделяют от хряща и кости.
3. **Устранение искривления:** Искривлённые фрагменты хряща и кости удаляют, выпрямляют или перемещают. Опорные структуры, которые поддерживают внешнюю форму носа (хрящевой каркас, удерживающий спинку и кончик), сохраняют.
4. **Уменьшение носовых раковин (при необходимости):** Если структуры на боковой стенке носа, называемые носовыми раковинами, увеличены, их уменьшают с помощью радиочастотного воздействия или удаления ткани из-под слизистой оболочки.
5. **Ушивание:** Слизистую оболочку укладывают на место и фиксируют рассасывающимися швами.
6. **Шины/тампоны:** Чтобы перегородка зажила ровно и для предотвращения кровотечения, в нос обычно устанавливают мягкие силиконовые шины с центральным воздушным каналом или тампоны.

Если передняя и наружная часть перегородки также искривлена или если внешняя форма носа способствует заложенности, операцию можно сочетать с ринопластикой (септоринопластика) при условии, что это будет отдельно обсуждено и на это будет дано отдельное согласие.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Общая анестезия (в отдельных случаях — местная анестезия + седация)	Около 45–90 минут	В тот же день или одна ночь в больнице

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Более свободное дыхание через нос и меньше дыхания через рот
- Лучшее качество сна и меньше храпа (у храпа могут быть и другие причины)
- Меньше повторяющихся носовых кровотечений, вызванных искривлением, а у некоторых пациентов — меньше эпизодов синусита
- Лучший доступ для операций на пазухах или других операций на носу, если они потребуются

По данным публикаций, примерно **70–85 из 100** пациентов отмечают явное уменьшение заложенности носа после операции. Если у заложенности есть и другие причины, такие как аллергия, отёк слизистой, слабость крыльев носа или заболевание пазух, может потребоваться их отдельное лечение. В редких случаях перегородка со временем может постепенно снова слегка искривиться.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от операции / наблюдение:** Если симптомы выражены слабо, можно ограничиться наблюдением.
- **Медикаментозное лечение:** Назальные спреи с кортикостероидами, промывания носа и противоаллергические препараты могут облегчить симптомы за счёт уменьшения отёка слизистой, но не исправляют структурное искривление кости и хряща.
- **Носовые полоски / расширители ноздрей:** Могут дать временное облегчение.
- **Сосудосуживающие (деконгестантные) спреи:** Подходят только для применения в течение нескольких дней; длительное использование приводит к зависимости и ещё более сильной заложенности.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если операцию не проводить, искривление само по себе не выпрямится; такие симптомы, как заложенность носа, дыхание через рот и храп, сохранятся и с возрастом могут усилиться. Обычно это не опасно для жизни; решение об операции зависит от того, насколько симптомы влияют на качество вашей жизни.

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией проводятся анализы крови и, при необходимости, компьютерная томография околоносовых пазух и другие обследования; вас также осмотрит врач-анестезиолог.
- В течение **6–8 часов** до операции нельзя ничего есть и пить (пожалуйста, следуйте указаниям анестезиолога).
- Если в дни перед операцией у вас появится простуда, грипп или заболевание с повышением температуры, пожалуйста, сообщите нам; операция может быть отложена.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 48 часов	Из-за шин нос будет ощущаться заложенным; возможны небольшие выделения с примесью крови, головная боль и сухость в горле. Боль обычно слабая. Рекомендуется спать с приподнятой головой. Марлевую повязку под носом, возможно, придётся несколько раз сменить.
3–7-й день	Силиконовые шины или тампоны обычно удаляют на контрольном осмотре **с 3-го по 7-й день**; это вызывает кратковременный дискомфорт. Начинают промывания носа. Большинство людей возвращаются к офисной работе в течение 5–7 дней.
2–4-я недели	В носу могут образовываться корки и ощущаться сухость; при регулярном промывании это проходит. Дыхание постепенно улучшается. Интенсивные физические нагрузки и контактные виды спорта следует отложить примерно на **3–4 недели**.
1–3-й месяцы	Слизистая оболочка носа полностью заживает. Окончательный результат в отношении дыхания обычно оценивают в этот период.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Заложенность носа и дыхание через рот до удаления шин
- Небольшие выделения с примесью крови в первые дни
- Временное онемение верхних передних зубов и верхней губы
- Корки и сухость в носу (в первые недели)
- Временное снижение обоняния

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Длительное образование корок и сухость** — Может сохраняться несколько недель, особенно если выполнялось уменьшение носовых раковин; проходит при промываниях и использовании увлажняющей мази.
- **Длительное онемение верхних зубов и губы** — Обычно проходит в течение нескольких недель; в редких случаях может длиться несколько месяцев.
- **Заложенность проходит не полностью** — Примерно у **15–30 из 100** пациентов дыхание может улучшиться не так сильно, как ожидалось. Часто это связано с дополнительными факторами, такими как аллергия, отёк слизистой или слабость крыльев носа; может потребоваться медикаментозное лечение или дополнительная операция.

Нечастые состояния

- **Носовое кровотечение** — Примерно у **1–3 из 100** пациентов может возникнуть кровотечение, требующее тампонады. Очень редко кровотечение приходится останавливать в операционной.
- **Отверстие в перегородке (перфорация)** — Примерно у **1–3 из 100** пациентов в перегородке может образоваться отверстие. Часто оно не вызывает никаких симптомов; если оно вызывает свист, образование корок или кровотечения, могут потребоваться промывания, установка септального обтуратора («пуговицы») или восстановительная операция.
- **Спайки в полости носа (синехии)** — Примерно у **1–5 из 100** пациентов между перегородкой и боковой стенкой могут образоваться спайки; если они вызывают заложенность, их разделяют с помощью простой процедуры во время контрольного осмотра.
- **Скопление крови или гноя в перегородке (гематома / абсцесс)** — Встречается **менее чем у 1 из 100** пациентов. Проявляется нарастающей заложенностью, болью и повышением температуры в дни после операции. Чтобы не допустить повреждения хряща носа, необходимо **срочное дренирование**; без лечения возможны потеря хряща и западение спинки носа.
- **Инфекция** — Встречается редко; обычно проходит при лечении антибиотиками.
- **Повторное искривление** — Поскольку у хряща есть «память», перегородка со временем может снова слегка искривиться; если это вызывает симптомы, может потребоваться повторная операция.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Западение спинки носа («седловидный нос»)** — Встречается **менее чем у 1 из 100** пациентов. Ослабление опорного хряща перегородки или потеря хряща после гематомы/абсцесса могут привести к западению спинки носа; это меняет внешний вид носа, и для исправления требуется дополнительная операция с хрящевым трансплантатом.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Опущение или изменение формы кончика носа** — Встречается очень редко; может возникнуть, если затронуты опорные структуры.
- **Стойкое снижение или потеря обоняния** — Встречается очень редко.
- **Истечение спинномозговой жидкости (ликворея) и менингит** — Поскольку верхняя часть перегородки граничит с основанием черепа, это крайне редкое осложнение, встречающееся **значительно реже чем в 1 случае из 10 000**. Если оно возникает, может потребоваться госпитализация, дополнительное лечение и восстановительная операция.
- **Синдром «пустого носа»** — Если носовые раковины уменьшить чрезмерно, может появиться ощущение заложенности и сухости, хотя нос свободен. Это встречается очень редко; именно поэтому носовые раковины уменьшают щадяще. Если синдром развивается, он может быть длительным или постоянным и плохо поддаётся лечению.
- **Синдром токсического шока** — Очень редкое, но тяжёлое инфекционное состояние, связанное с использованием носовых тампонов/шин (внезапное повышение температуры, сыпь, низкое артериальное давление), требующее срочного лечения. Оно требует лечения в больнице, иногда в отделении интенсивной терапии, и может угрожать жизни.
- **Нарушение зрения, кровоизлияние вокруг глаза** — При септопластике встречается крайне редко; риск несколько выше при сочетании с операциями на околоносовых пазухах, такими как FESS, и разъясняется в отдельной форме согласия.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Носовое кровотечение, которое не останавливается или очень сильное**, несмотря на прижатие и лёд в течение нескольких минут, или постоянное стекание крови в рот
- **Нарастающая заложенность носа, сильная боль и отёк носа** в дни после операции (может быть признаком гематомы/абсцесса перегородки)
- **Температура выше 38,5 °C** или выделения с неприятным запахом
- **Внезапное повышение температуры, кожная сыпь, головокружение или слабость**, пока в носу стоят тампоны/шины
- **Прозрачные водянистые выделения** из носа, особенно усиливающиеся при наклоне вперёд; сильная головная боль или ригидность (скованность) мышц шеи
- **Нечёткое зрение или двоение в глазах**, либо отёк вокруг глаза
- Одышка или боль в груди

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Не сморкайтесь в первые 2 недели; при чихании держите рот открытым.
- Промывайте нос так, как вам показали, и с рекомендованной частотой.
- В первые 2 недели избегайте горячих ванн, саун, турецких бань (хаммама) и подъёма тяжестей.
- Защищайте нос от ударов как минимум 4 недели.
- Если вы приехали из-за рубежа, перелёт обычно безопасен после удаления шин.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

- ☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).
- ☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.
- ☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что цель этой операции — облегчить дыхание, а не изменить внешнюю форму носа, и что, если у заложенности есть другие причины, может потребоваться дополнительное лечение.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — отношение к пациенту:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

- ☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.
- ☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА СОГЛАСИЯ)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.