Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Ендоларингеална микрохирургия

Микрохирургия на гласните гънки / гръкляна (микроларингоскопия)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Лезия / предварителна диагноза: _____

Страна: ☐ Дясна гласна гънка ☐ Лява гласна гънка ☐ Двустранно
☐ Друга част на гръкляна _____

Планирана техника: ☐ Студени инструменти ☐ CO2 лазер
☐ Ще бъде определена от хирурга по време на операцията

Биопсия / хистологично изследване: ☐ Планира се ☐ При необходимост ☐ Не се планира
_____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Гръклянът (ларинксът) се намира в предната част на шията. Той създава гласа, предпазва дихателните пътища и затваря входа на трахеята по време на преглъщане. Гласните гънки (гласните връзки) са две тънки структури в гръкляна, които трептят и така образуват звука.

По гласните гънки или в друга част на гръкляна могат да се появят **възли (нодули), полипи, кисти, оток на Райнке, папиломи, левкоплакия (бели петна)** или лезия, при която има съмнение за рак. Те могат да причинят дрезгав глас, бърза умора на гласа, усещане за заседнало нещо в гърлото и рядко затруднено дишане. Сред причините са неправилната или прекомерната употреба на гласа, тютюнопушенето, рефлуксът, инфекциите (напр. HPV), а понякога и неизвестни фактори.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Целта на операцията е да се отстрани лезията, като се запази колкото е възможно повече здрава тъкан на гласната гънка, **да се подобри гласът ви**, при необходимост да се разшири дихателният път и чрез **хистологично изследване** на отстранената тъкан да се постави **точна диагноза**.

2 Как се извършва процедурата?

Операцията се извършва под обща анестезия в операционна зала, през устата; на шията не се прави разрез.

1. **Достъп до гръкляна:** След като заспите, през устата се въвежда метална тръба (ларингоскоп), чрез която се достига до гръкляна. Зъбите ви се предпазват със специален протектор.
2. **Оглед под микроскоп:** Гласните гънки се оглеждат подробно под увеличение с операционен микроскоп или ендоскоп. На този етап може да се открият допълнителни находки, които не се виждат при прегледа в кабинета.
3. **Отстраняване на лезията:** Лезията се отстранява с много фини микрохирургични инструменти или с CO2 лазер, като трептящата повърхност на гласната гънка се запазва във възможно най-голяма степен. При нужда се взема само малко парче за диагноза (биопсия).
4. **Допълнителни действия:** В зависимост от ситуацията може да се използват тампони с лекарство за спиране на кървенето, а в гласната гънка да се инжектира лекарство за намаляване на образуването на белег.
5. **Приключване:** Ларингоскопът се изважда, устата и зъбите се проверяват. На шията няма шевове или видим белег.

Много рядко, поради ограничено отваряне на устата, особености на зъбите или анатомията на челюстта или шията, може да не е възможно да се достигне безопасно до гръкляна. В такъв случай процедурата може да бъде прекратена и ще ви бъдат обяснени алтернативни методи.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия	Около 20–60 минути	Обикновено изписване в същия ден или 1 нощ в болница

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Намаляване на дрезгавостта и по-ясен глас, който се уморява по-трудно
- **Точна диагноза** чрез хистологично изследване на отстранената тъкан, така че заболяване, открито в ранен стадий, да бъде лекувано навреме
- По-лесно дишане, ако лезията стеснява дихателния път

При доброкачествени лезии като възли, полипи и кисти гласът се подобрява значително при повечето пациенти. Резултатът обаче зависи от вида и размера на лезията, предишното състояние на гласните гънки, фактори като тютюнопушене и рефлукс, както и от спазването на **гласовия покой и гласовата терапия** след операцията. Някои заболявания, като папиломите, могат да се появят отново и да наложат повече от една операция.

4 Други възможности за лечение

- **Гласова терапия (с логопед/фониатър):** Може да бъде първият избор, особено при възли на гласните гънки, и често прави операцията ненужна.
- **Медикаментозно лечение:** При рефлукс или възпаление могат да помогнат лекарства, които намаляват стомашната киселина или възпалението.
- **Спиране на тютюнопушенето и хигиена на гласа:** Подпомагат обратното развитие на някои лезии (напр. оток на Райнке).
- **Процедура в кабинета под местна анестезия:** При подходящо подбрани малки лезии или биопсия процедурата може да се извърши, докато сте будни, с ендоскоп през носа или устата; не е подходяща за всяка лезия.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Внимателно наблюдение:** Малки лезии без съмнение за рак могат да се проследяват с редовни прегледи.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако операцията не бъде извършена, дрезгавостта може да продължи или да се засили. Тъй като точното естество на лезията не е известно, макар и рядко, поставянето на диагнозата на сериозно основно заболяване (напр. рак в ранен стадий или лезия, която може да се превърне в рак) може да се забави. Нарастващите лезии рядко могат да причинят затруднено дишане.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят кръвни изследвания и ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- През последните **6–8 часа** преди операцията не трябва да ядете и пиете нищо (спазвайте указанията на анестезиолога).
- Задължително ни съобщете за **клатещи се зъби, коронки, мостове, импланти или протези**; подвижните протези се свалят преди операцията.
- Ако ви е препоръчано лечение на рефлукса, може да бъдете помолени да го започнете преди операцията.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 24–48 часа	Може да имате болки или парене в гърлото, лек дискомфорт при преглъщане, дрезгав глас и леко кървенисти храчки. Може да усетите изтръпване на езика, промяна във вкуса или болка в челюстта; те обикновено отшумяват за няколко дни.
1-ва седмица	По препоръка на лекаря обикновено **3–7 дни пълен гласов покой** (без говорене и без шепнене), след което гласът постепенно се натоварва. Повечето хора се връщат на работа в офис след 2–3 дни; хората с гласови професии (учители, певци, служители в кол центрове) трябва да изчакат по-дълго.
2–4-та седмица	Гласът постепенно се подобрява. При нужда се започва гласова терапия. Избягвайте викане, пеене и продължително говорене. Резултатът от хистологичното изследване обикновено е готов в този период и ще бъде обсъден с вас.
1–3-ти месец	Заздравяването на гласните гънки приключва; окончателният глас обикновено се установява в рамките на **6–12 седмици**. При контролния преглед гласните гънки се оглеждат с ендоскоп.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Болки в гърлото и лек дискомфорт при преглъщане (няколко дни)
- Временна дрезгавост или промяна в тембъра на гласа след операцията
- Леко кървенисти храчки (първите 1–2 дни)
- Чувствителност на челюстта, устните или зъбите; малки пукнатини в ъглите на устата

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Изтръпване на езика и промяна във вкуса** — Дължат се на натиска на ларингоскопа върху езика; срещат се при около **5–15 от 100** пациенти и обикновено отшумяват за няколко дни до няколко седмици, много рядко продължават месеци.
- **Болка в челюстната става** — Дължи се на продължителното отваряне на устата; обикновено отминава за няколко дни. При хора с проблеми на челюстната става може да е по-честа и по-продължителна.
- **Гласът не се подобрява толкова, колкото се очаква** — След операцията гласът не винаги се възстановява напълно; може да е необходима гласова терапия или допълнително лечение.

Нечести състояния

- **Увреждане на зъби** — Въпреки използването на протектор при около **1–5 от 100** пациенти може да се получи отчупване, пукване или разклащане на зъб или увреждане на коронка/мост. Рискът е по-висок при клатещи се, кариозни или изкуствени зъби; може да е необходимо стоматологично лечение.
- **Влошаване на гласа или трайна промяна на гласа** — Ако по повърхността на гласната гънка се образува белег, гласът може да стане по-дрезгав, по-слаб или да се уморява по-бързо, отколкото преди операцията. Това може да наложи гласова терапия, а понякога и допълнителни операции; рядко може да е трайно.
- **Повторна поява на лезията** — Лезията може да се появи отново, особено ако неправилната употреба на гласа или тютюнопушенето продължат, или при заболявания като папиломите; може да е необходима повторна операция.
- **Сраствания в предната част на гласните гънки (мембрана)** — Когато се оперира в предната част на двете гласни гънки, те могат да се слепят една с друга; това може да влоши качеството на гласа и да наложи втора операция за разделянето им.
- **Допълнително лечение според хистологичния резултат** — Хистологичният резултат може да се различава от очакваното (напр. лезия със склонност към злокачествено израждане или рак). В такъв случай може да са необходими допълнителна операция, лъчетерапия или внимателно проследяване; това ще ви бъде обяснено подробно.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Оток на гръкляна и затруднено дишане** — След операцията може да се развие оток на гръкляна. Обикновено се повлиява от лекарства; много рядко може да се наложи наблюдение в интензивно отделение или временно отваряне на дихателния път през шията (трахеостомия).

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Кървене** — Значителното кървене е рядко. Поради риска кръв да попадне в дихателните пътища сериозното кървене може да наложи спешна намеса и връщане в операционната.
- **Рискове, свързани с лазера** — При използване на CO2 лазер съществува риск от изгаряне на околните тъкани и много рядко от запалване на интубационната (дихателната) тръба (пожар в дихателните пътища). Прилагат се специфични мерки за безопасност (специална тръба, влажни тампони, защита на очите). Ако такова събитие настъпи, то може да причини сериозни изгаряния на дихателните пътища и да наложи продължително лечение в интензивно отделение и трахеостомия.
- **Нараняване на устата, езика, устните или гълтача** — Малките наранявания от инструментите обикновено заздравяват сами; много рядко може да са необходими шевове. Изключително рядко разкъсване на стената на гълтача може да доведе до навлизане на въздух под кожата на шията (усещане за пукане) или до инфекция на шията; това може да наложи наблюдение в болница, венозни антибиотици и рядко операция.
- **Проблеми с шийните прешлени** — Поради отметнатото назад положение на главата може да се появи болка във врата — особено при заболявания на шийния отдел на гръбначния стълб — и много рядко по-сериозни гръбначни проблеми. Моля, съобщете ни, ако имате дискова херния в шията или сте претърпели операция на шията.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Задух** или свирещ, хриптящ звук при вдишване (стридор)
- **Изкашляне или повръщане на кръв**, или кървенисти храчки, които се увеличават вместо да намаляват
- **Невъзможност за преглъщане** или толкова силна болка или оток, че не можете да преглъщате слюнката си
- **Температура над 38,5 °C** и все по-силна болка в гърлото
- Оток на шията или лицето или усещане за пукане под кожата

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Спазвайте стриктно препоръчания **гласов покой**; шепненето също натоварва гласните гънки. Можете да общувате писмено или чрез приложения на телефона.
- Пийте много вода и поддържайте въздуха в стаята влажен. Избягвайте прочистването на гърлото и кашлянето, доколкото е възможно.
- Стойте далеч от цигарите и тютюневия дим; тютюнопушенето влошава заздравяването и увеличава риска лезията да се появи отново.
- Ако са ви предписани лекарства за рефлукс, приемайте ги за препоръчания срок; не яжте 2–3 часа преди лягане и ограничете лютите и киселите храни.
- Пътуването със самолет обикновено е безопасно от следващия ден; продължете гласовия покой по време на пътуването.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.

☐ Разбирам, че ако по време на операцията се установи, че гръклянът не може да бъде достигнат безопасно, процедурата може да бъде прекратена, както и че в зависимост от хистологичния резултат на отстранената тъкан може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

☐ Разбирам, че окончателният глас зависи и от спазването на гласовия покой, гласовата терапия, спирането на тютюнопушенето и лечението на рефлукса след операцията.

☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**

☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.