Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Липосукция на двойна брадичка

Отстраняване на мастна тъкан под брадичката (субментална липосукция)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Планирана техника:
- ☐ Класическа (тумесцентна)
- ☐ С енергийно устройство (лазер/радиочестота)
- ☐ По преценка на лекаря

Анестезия:
- ☐ Местна анестезия ☐ Местна анестезия + седация
- ☐ Обща анестезия _____

Процедури, извършвани едновременно: ☐ Няма ☐ С отделен формуляр за съгласие: _____

Оплакване и очаквания на пациента: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Мастната тъкан, натрупана под брадичката („двойна брадичка“), може да заличи ъгъла между брадичката и шията, при което линията на долната челюст изглежда неясна, лицето — уморено или по-пълно, отколкото е в действителност. Натрупването на мазнини в тази област често се дължи на **генетична предразположеност** и може да не изчезне напълно дори при отслабване или физически упражнения. Намаляването на еластичността на кожата с възрастта също го прави по-забележимо.

Липосукцията на двойната брадичка представлява отстраняване на **подкожната мастна тъкан** чрез изсмукване с тънки канюли. Целта е да се очертае линията на челюстта и да се постигне **естествен, балансиран ъгъл между брадичката и шията**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Най-важният фактор за резултата е **качеството и еластичността на кожата**. Еластичната кожа се приспособява към новия контур след отстраняването на мазнините; при кожа с ниска еластичност отпуснатостта може да стане по-видима. Дълбоката мастна тъкан под мускула на шията (платизмата), големите слюнчени жлези, изразените ивици на шийния мускул и силно отпуснатата кожа не могат да се коригират с липосукция; в тези случаи може да са необходими други методи, като дълбок лифтинг на шията.

2 Как се извършва процедурата?

Преди операцията областта на брадичката и шията се преглежда, оценява се еластичността на кожата, правят се снимки и зоната, която ще се третира, се маркира в седнало положение.

1. **Обезболяване и вливане на разтвор:** В областта се влива специален (тумесцентен) разтвор, съдържащ местен анестетик и лекарство, което ограничава кървенето. Разтворът предотвратява болката и намалява кървенето и кръвонасяданията.
2. **Малки разрези:** В естествената гънка под брадичката и при нужда зад долната (меката) част на ушите се правят малки входни отвори от около **3–5 мм**.
3. **Отстраняване на мастната тъкан:** Мастната тъкан се изсмуква внимателно и равномерно с тънки канюли (метални тръбички). Под кожата се оставя тънък слой мазнина, за да остане повърхността гладка.
4. **Процедура с енергийно устройство (ако е планирана):** С лазерна или радиочестотна енергия мастната тъкан се омекотява, а кожата се стяга до известна степен. Това може да подобри стегнатостта на кожата, но не премахва изразената отпуснатост.
5. **Затваряне и компресивна превръзка:** Входните отвори се затварят с един шев или се оставят да се затворят сами. В края на операцията около брадичката и шията се поставя **еластична компресивна превръзка (лента за брадичката)**.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Местна анестезия, местна + седация или обща анестезия	Около 45–90 минути (когато се извършва самостоятелно)	Обикновено изписване в същия ден

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Намаляване на излишната мастна тъкан под брадичката
- По-ясно очертана линия на челюстта и ъгъл между брадичката и шията; по-балансиран профил
- **Дълготраен** резултат, докато теглото остава стабилно, тъй като отстранените мастни клетки не се образуват отново (естествените промени в кожата и тъканите с възрастта продължават)

Повечето пациенти с добра еластичност на кожата са доволни от резултата. Той се вижда в рамките на **3–6 месеца**, когато отокът спадне. При около **3–5 от 100** пациенти може да е необходима малка корекция поради неравности, остатъчна мазнина или асиметрия. Значителното покачване на теглото и стареенето могат с времето да повлияят на резултата.

4 Други възможности за лечение

- **Да не се извършва процедурата:** Тъй като процедурата е естетична, винаги имате възможност да не я направите.
- **Отслабване и промени в начина на живот:** Намаляват общото количество мазнини в тялото, но не винаги премахват упоритата мазнина под брадичката.
- **Инжекции за разграждане на мазнини (напр. деоксихолева киселина):** Изискват няколко сеанса, могат да причинят изразен оток и болка и имат по-ограничен ефект.
- **Криолиполиза и апаратни процедури:** Не са хирургични, но изискват няколко сеанса и ефектът им е по-ограничен.
- **Дълбок лифтинг на шията / лифтинг на шията:** По-подходящ вариант при изразена отпуснатост на кожата, ивици на шийния мускул или дълбока мазнина под мускула.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако процедурата не бъде извършена, видът под брадичката ще остане същият и може да се влоши с възрастта или при покачване на теглото. Това не представлява опасност за здравето ви.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят кръвни изследвания; ако се планира седация или обща анестезия, ще бъдете прегледани от анестезиолог и трябва да сте на гладно.
- Препоръчително е теглото ви да е стабилно преди процедурата; ако планирате значителна промяна на теглото в близко бъдеще, обсъдете това с лекаря.
- В деня на операцията не нанасяйте крем или грим на лицето и шията; облечете удобна горна дреха, която се закопчава отпред, вместо дреха с висока яка.
- След седация или обща анестезия не шофирайте; приберете се с придружител.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 48 часа	Под брадичката ще има оток, опъване и лека болка, а от входните отвори може да изтича малко розова течност; това е нормално. Кръвонасядания, **ако се появят**, могат да се разпространят към шията и изчезват за 1–2 седмици. Спете с повдигната глава и носете превръзката непрекъснато.
1-ва седмица	Превръзката обикновено се носи **денонощно през първата седмица**, а след това **нощем още 2–3 седмици**. Ако има шевове, те се свалят на 5–7-ия ден. Повечето пациенти се връщат към офис работа и социален живот в рамките на 3–7 дни.
2–6-а седмица	Отокът до голяма степен изчезва. В областта може да се усещат втвърдяване, малки бучки и изтръпване; с времето те омекват. Интензивни физически упражнения обикновено могат да се подновят след **2–3 седмици**. При препоръка се прави лек масаж.
3–6-и месец	Остатъчният оток и втвърдяванията изчезват, кожата се приспособява към новия контур и резултатът става ясен.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Оток, опъване и лека болка под брадичката и по шията; кръвонасядания, **ако се появят**, изчезват за 1–2 седмици
- Изтичане на розова течност от входните отвори през първите 24–48 часа
- Временно изтръпване и намалена чувствителност в областта
- Леко втвърдяване и малки осезаеми бучки в продължение на няколко седмици

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Продължително втвърдяване и бучки (фиброза)** — По време на заздравяването втвърдяването и бучките под кожата са чести; повечето омекват в рамките на няколко месеца с масаж и с времето.
- **Продължително изтръпване** — Намалената чувствителност на кожата под брадичката може да продължи от няколко седмици до няколко месеца; много рядко е трайна.
- **Лека асиметрия** — Тъй като двете половини на лицето никога не са напълно симетрични, може да останат малки разлики.

Нечести състояния

- **Неравности на контура и вдлъбвания** — При около **2–5 от 100** пациенти може да се появят вълнообразни неравности, вдлъбнатини или остатъчни мастни натрупвания. При отстраняване на твърде много мазнина под брадичката може да се получи хлътнал или „изпит“ вид и по-видими ивици на шийния мускул. За корекция може да са необходими инжектиране на собствена мастна тъкан (липофилинг), допълнителна липосукция или друга процедура.
- **Отпусната кожа или недостатъчно стягане** — Особено при хора с намалена еластичност на кожата, след отстраняването на мазнината кожата може да не се стегне достатъчно и отпуснатостта да изглежда по-изразена. В такъв случай в бъдеще може да е необходим лифтинг на шията.
- **Асиметрия на усмивката (засягане на нервното клонче, което движи долната устна)** — Тънко нервно клонче, което минава по ръба на долната челюст и движи долната устна, може да бъде засегнато от отока или натиска, което води до асиметрия на долната устна при усмивка. Среща се при около **1 от 100** пациенти и почти винаги отзвучава от само себе си **в рамките на няколко седмици до няколко месеца**; трайната слабост е много рядка.
- **Събиране на кръв или течност (хематом, серома)** — Среща се при **по-малко от 1 на 100** пациенти. Малките натрупвания се резорбират от само себе си; по-големите може да се наложи да бъдат изтеглени с игла или отстранени чрез малка процедура.
- **Инфекция** — Среща се при **по-малко от 1 на 100** пациенти; обикновено се повлиява от антибиотици, а рядко може да се наложи дренирание на абсцес.
- **Белези или промяна в цвета на входните отвори** — Малките белези от входните отвори обикновено стават незабележими; рядко може да остане потъмняване, задебеляване или малка вдлъбнатина.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Изгаряне на кожата (при техники с енергийни устройства)** — При използване на лазерна или радиочестотна енергия, въпреки мерките за безопасност, рядко може да се получи изгаряне на кожата, мехури и траен белег; може да са необходими грижи за раната и лечение на белега.
- **Увреждане на кожата или загуба на тъкан** — Много рядко, особено при пушачи, нарушеното кръвоснабдяване на кожата може да доведе до рана и белег.
- **Трайно увреждане на нерв** — Трайната слабост в движенията на долната устна е изключително рядка; ако настъпи, може да е необходимо допълнително лечение.
- **Реакция към местния анестетик** — Възможни са алергия към използвания местен анестетик или — при високо ниво на анестетика в кръвта — световъртеж, шум в ушите, метален вкус в устата и много рядко гърчове или нарушение на сърдечния ритъм. Дозите се поддържат в безопасни граници.
- **Мастна емболия и нараняване на по-дълбоки структури или дихателните пътища** — Попадането на мастни капчици в кръвообращението или нараняването на по-дълбоки структури с канюлата е **изключително рядко** при малкообемната липосукция под брадичката; ако настъпи, може да е необходимо спешно болнично лечение и лечение в интензивно отделение.
- **Психологическа неудовлетвореност** — Въпреки технически успешния резултат човек може трудно да свикне с новия си външен вид. Откритото обсъждане на очакванията преди операцията намалява този риск.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Бързо нарастващ, твърд, напрегнат оток** на шията, особено от едната страна
- **Затруднено дишане или преглъщане** или промяна в гласа
- **Температура над 38,5 °C**, засилваща се болка, зачервяване, затопляне или секреция с неприятна миризма
- Побеляване на кожата или оцветяване в морав до черен цвят; мехури, пълни с течност
- Болка в гърдите, задух или нарушено съзнание (объркване)

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Носете редовно превръзката през препоръчания период; внимавайте да не е нито твърде стегната, нито твърде хлабава.
- През първите 1–2 седмици спете по гръб с повдигната глава; избягвайте резки и прекомерни разтягания на шията.
- През първите 2–3 седмици избягвайте интензивни упражнения, сауна, турска баня и продължителни горещи душове.
- През първите месеци пазете областта от слънце; това намалява риска от белези и промяна в цвета на кожата.
- За запазване на резултата се стремете да поддържате стабилно тегло.
- Ако сте пристигнали от чужбина, пътуването със самолет обикновено е безопасно след 2–3-тия ден.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че резултатът зависи от еластичността на кожата ми и че липосукцията не коригира отпуснатата кожа, ивиците на шийния мускул и дълбоката мазнина под мускула.
- ☐ Разбирам, че носенето на компресивната превръзка и спазването на препоръките пряко влияят на резултата.
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.