Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

**Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

# PRP (плазма, богата на тромбоцити)

Приложение на плазма, приготвена от собствената ви кръв, в кожата или скалпа

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

### ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Място на процедурата: _____

Използван комплект (кит) / LOT №: _____

Количество взета кръв (мл): _____

Активатор / добавка: ☐ Няма ☐ Калциев хлорид ☐ Друго _____

Област на приложение: ☐ Лице ☐ Скалп ☐ Под очите ☐ Шия / деколте ☐ Друго _____

Сеанс № / планиран брой сеанси: _____

## 1 Вашето състояние и целта на процедурата

PRP (Platelet-Rich Plasma — плазма, богата на тромбоцити) е плазма, приготвена **от собствената ви кръв** и обогатена с тромбоцити (кръвни плочици). Тромбоцитите съдържат естествени растежни фактори, които участват във възстановяването на тъканите.

PRP се прилага за подобряване на качеството, сиянието и еластичността на кожата, за намаляване на видимостта на фините бръчки и на уморения вид под очите, за подобряване на вида на белезите от акне или за подкрепа на космените фоликули при **косопад**. Тъй като се приготвя от собствената ви кръв, не се очаква алергия към самия продукт или отхвърлянето му от организма.

**Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

## 2 Как се извършва процедурата?

Процедурата се извършва в нашата клиника при стерилни условия, с **комплекти за еднократна употреба със затворена система**. Наименованието и LOT номерът на комплекта се записват в досието ви.

1. **Вземане на кръв:** От вена на ръката, както при обикновено кръвно изследване, обикновено се вземат 10–30 мл кръв.
2. **Приготвяне:** Кръвта се поставя в специална епруветка, съдържаща вещество против съсирване, и се разделя на съставките си в центрофуга; частта с плазма, богата на тромбоцити, се отделя стерилно. На всеки етап се проверява, че епруветките са ваши.
3. **Подготовка на областта:** Областта се почиства и дезинфекцира с антисептик; по желание се нанася обезболяващ крем.
4. **Приложение:** Плазмата се инжектира в кожата или скалпа в множество малки точки с тънка игла или канюла, а понякога се нанася върху кожата в комбинация с микронидлинг.
5. **Приключване:** Областта се почиства, при нужда се поставя студен компрес и получавате препоръки за грижа.

Обикновено се препоръчва **курс от 3–4 сеанса през 4–6 седмици**, последван от поддържащ сеанс на всеки 4–6 месеца.

| АНЕСТЕЗИЯ | ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ | ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ |
|---|---|---|
| Обезболяващ крем (по желание) | Около 45–60 минути (с подготовката) | Същия ден; кратко наблюдение след процедурата |

## 3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- По-свежа, сияйна и стегната кожа, по-слабо забележими фини бръчки
- По-малко тъмни кръгове и по-малко уморен вид под очите
- При косопад — подкрепа за намаляване на окапването и увеличаване на дебелината на косъма
- Не се очаква алергия към самата плазма, тъй като се използва собствената ви кръв

Резултатите са индивидуални. Научните доказателства се различават според целта: при **андрогенетичния (наследствен) косопад** има много проучвания с положителни резултати, докато данните за подмладяване на кожата са по-ограничени. Използваните техники и комплекти също се различават. Ефектът се проявява постепенно и не е постоянен; определен резултат не може да бъде гарантиран.

## 4 Други възможности за лечение

- **Без лечение** или продължаване с редовна грижа за кожата и защита от слънцето
- **При косопад:** изследване на основната причина (желязо, щитовидна жлеза, хормони); лекарства като миноксидил по лекарска препоръка; мезотерапия на скалпа; при напреднал косопад — трансплантация на коса
- **За кожата:** локални продукти, мезотерапия, процедури с хиалуронова киселина за качество на кожата, химичен пилинг, лазерни процедури или микронидлинг

## 5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако не се приложи PRP, кожата или косата ви ще продължат естественото си развитие. В зависимост от причината косопадът може да напредва; другите възможности за лечение винаги могат да бъдат обсъдени. Отказът от PRP не носи риск за здравето ви.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете,

**Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

## 6 Подготовка за процедурата

- **Състояния, при които PRP не се прилага:** нисък брой или нарушена функция на тромбоцитите, нарушения на кървенето и съсирването, изразена анемия, активна инфекция или температура, активно лечение на рак или прекарано злокачествено заболяване на кръвта през последните години, бременност и кърмене. Ако някое от тях се отнася за вас, задължително ни уведомете.
- Ако приемате лекарства за разреждане на кръвта (варфарин, ривароксабан, апиксабан, клопидогрел и др.), кажете на лекаря преди процедурата; **не спирайте тези лекарства сами**.
- Ако е възможно, след консултация с лекаря спрете аспирин и противовъзпалителни обезболяващи (ибупрофен, напроксен и др.) 1 седмица преди процедурата; тези лекарства могат да намалят функцията на тромбоцитите.
- Уведомете ни, ако през последните 2–3 седмици сте приемали кортикостероиди (кортизон) под формата на таблетки или инжекции; те могат да намалят ефекта на PRP и процедурата може да се наложи да бъде отложена.
- В деня на процедурата пийте достатъчно вода и се нахранете леко; идването на гладно увеличава риска от прималяване.
- При процедура на скалпа измийте косата си предния ден или сутринта на процедурата и не използвайте гел, лак или подобни продукти.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

## 7 Възстановяване: какво да очаквате

| | |
|---|---|
| **Първите часове** | В третираната област се появяват зачервяване, лек оток, усещане за опъване и малки подутини в точките на убождане. Мястото на вземане на кръв може да е леко чувствително. |
| **Първите 24 часа** | Не си слагайте грим; избягвайте сауна, турска баня, солариум, интензивни натоварвания и пряко слънце. След процедура на скалпа измийте косата си най-рано на следващия ден. |
| **2–7-и ден** | Зачервяването и отокът отшумяват. Ако се **появи** кръвонасядане (особено под очите), то изчезва за 3–7 дни. |
| **По време на курса** | Сеансите се повтарят през 4–6 седмици. Промяната в кожата обикновено се забелязва след 2-рия–3-тия сеанс, а в косата — в рамките на 3–6 месеца. |
| **След курса** | Ефектът постепенно отслабва; за поддържането му може да се препоръча сеанс на всеки 4–6 месеца. |

**Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

## 8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

### Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Лека болка или парене при вземането на кръв и при инжекциите
- Зачервяване, лек оток, чувствителност и опъване в третираната област (от няколко часа до 2 дни)
- Малки следи от кръв в точките на убождане

### Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Кръвонасядания** — Могат да се появят в третираната област или на мястото на вземане на кръв; изчезват сами за 3–7 дни.
- **Главоболие или чувствителност на скалпа** — Може да продължи 1–2 дни след процедура на скалпа; отшумява с обикновени обезболяващи (препоръчва се парацетамол вместо аспирин).
- **По-слаб ефект от очаквания** — При някои хора може да няма забележима промяна или ефектът да е краткотраен.

### Нечести състояния

- **Прималяване** — По време на вземането на кръв или инжекциите може да се появят световъртеж, изпотяване и кратка загуба на съзнание; отминава бързо в легнало положение.
- **Временно засилен косопад** — През първите седмици след процедура на скалпа може да се наблюдава временно засилено окапване на косата; обикновено отшумява от само себе си.
- **Продължителен оток** — Отокът, особено под очите, може да продължи няколко дни.
- **Промяна в цвета** — При по-тъмна кожа и излагане на слънце е възможно временно потъмняване в точките на убождане.

### Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Инфекция** — При стерилна техника е много рядка; ако възникне, може да е необходимо лечение с антибиотици и рядко — дренирane.
- **Алергия към вещества в комплекта** — Алергия към самата плазма не се очаква; много рядко обаче може да се развие алергична реакция към веществото против съсирване или активатора в комплекта, към обезболяващия крем или антисептика.
- **Запушване на кръвоносен съд (съдова оклузия)** — При дълбоко инжектиране в областта на лицето **изключително рядко** материалът може да попадне в кръвоносен съд или да го притисне, което да доведе до нарушено кръвоснабдяване на кожата и белег, а още по-рядко — до нарушение на зрението. Ранното разпознаване и спешното лечение са много важни.
- **Засягане на нерв** — Ако по време на вземането на кръв или инжекцията бъде засегнат нерв, може да се появи временно изтръпване или мравучкане; много рядко то продължава по-дълго.

**Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

**Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса**

- **Прималяване (вазовагална реакция):** По време на инжекция или вземане на кръв може да се появят световъртеж, изпотяване и кратка загуба на съзнание; отминава бързо в легнало положение.
- **Инфекция:** Благодарение на дезинфекцията на кожата и стерилните материали рискът е много нисък; ако възникне, обикновено се лекува с антибиотици.
- **Алергична реакция:** Към използвания продукт, местния анестетик или антисептика — от леко зачервяване до, много рядко, тежка алергична реакция (анафилаксия). Клиниката ни разполага с оборудване и лекарства за спешна помощ.
- **Активиране на херпес:** Ако в миналото сте имали херпес, той може да се появи отново в третираната област; моля, уведомете ни.
- **Резултат, който не отговаря на очакванията:** Степента и продължителността на ефекта са индивидуални; може да са необходими допълнителни сеанси или корекция.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

## 9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Внезапна силна болка, побеляване на кожата или мрежовидно моравосиньо оцветяване** по време на или след процедурата
- **Замъглено зрение, загуба на зрение**, двойно виждане или болка в окото
- **Засилващо се зачервяване, затопляне, оток или гнойна секреция** в третираната област, температура над 38 °C
- Оток на лицето, устните или езика, **задух**, обширен сърбящ обрив
- Засилващ се оток, болка или изтръпване на ръката, от която е взета кръв

**Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.**

## 10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Не си слагайте грим през първите 24 часа; избягвайте сауна, турска баня, солариум, интензивен спорт и басейн.
- През първите 3 дни след процедурата се препоръчва да не приемате противовъзпалителни обезболяващи (ибупрофен, напроксен, аспирин); при болка можете да приемете парацетамол.
- По време на курса използвайте всеки ден слънцезащитен крем с висок фактор; след процедура на скалпа изчакайте поне 3 дни преди боядисване или къдрене на косата.
- Тютюнопушенето намалява ефекта на тромбоцитите и влошава заздравяването; препоръчва се, ако е възможно, да го спрете.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.

**Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

## 11 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).

☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.

☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

## 12 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

*Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.*

## 13 Декларация на пациента

☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.

☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.

☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.

☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.

☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.

**Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Знам, че PRP ще бъде приготвена от собствената ми кръв, че данните за използвания комплект ще бъдат записани в досието ми и че на всеки етап ще се проверява, че епруветките са мои.
- ☐ Дадох вярна информация относно кръвни заболявания, прекаран рак, прием на лекарства за разреждане на кръвта и бременност, които биха могли да са пречка за прилагането на PRP.
- ☐ Разбирам, че ефектът е индивидуален, че са необходими няколко сеанса и че резултатът не е постоянен.
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

*Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“*

## 14 Подписи

| | ИМЕ И ФАМИЛИЯ | ПОДПИС | ДАТА / ЧАС |
|---|---|---|---|
| **Пациент** | | | |
| **Законен представител (родител / настойник) — родство:** | | | |
| **Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата** | | | |
| **Преводач (при нужда) — език:** | | | |
| **Свидетел (при нужда)** | | | |

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

**Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“**
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

### ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

### ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.