Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Ринопластика

Естетична операция на носа (при необходимост съчетана с корекция на носното дишане)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Планирана техника: ☐ Отворена техника ☐ Затворена техника ☐ Ще бъде определена от хирурга по време на операцията

Процедури, които ще се извършат едновременно: ☐ Септопластика ☐ Редукция на носните конхи ☐ Няма _____

Източник на хрущялна присадка (графт): ☐ От носа (септума) ☐ От ухото ☐ От ребро ☐ Не се очаква да е необходима _____

Оплаквания и очаквания на пациента: _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Ринопластиката е операция за промяна на външния вид на носа (гърба на носа, гърбица, върха, ширината на носа, ноздрите и хармонията му с лицето). Ако имате изкривяване на носната преграда, което затруднява дишането (девиация на септума), хлътване на носните крила или увеличени носни конхи, те могат да бъдат коригирани по време на същата операция.

Формата на носа се определя от наследствени особености, промени по време на растежа или прекарани травми (удар, счупване). Тези структури не се променят от само себе си. Целта на операцията е да постигнем **реалистичните цели**, които определяме заедно, и нос, който е **естествен, в хармония с лицето ви и през който се диша свободно**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как се извършва процедурата?

Операцията се извършва под обща анестезия в операционна зала. Преди операцията носът ви се преглежда и снима, а планът се изготвя заедно с вас.

1. **Разрез:** При затворената техника всички разрези са вътре в носа и отвън не остава белег. При отворената техника се прави и малък разрез от около 4–5 мм през тънкото кожно мостче между ноздрите (колумелата); с времето този белег обикновено става едва забележим.
2. **Оформяне на носния скелет:** Кожата и меките тъкани се повдигат внимателно. Ако има гърбица, тя се отстранява от костта и хрущяла или се коригира с техники за запазване на гърба на носа. Хрущялите на върха се оформят наново с шевове.
3. **Стесняване/изправяне на костите (остеотомия):** Ако широките или изкривени носни кости трябва да се стеснят или изправят, се правят контролирани срязвания на костта. Тази стъпка може да увеличи вероятността от кръвонасядания (синини) и оток.
4. **Опора и присадки:** За да запази носът формата си в дългосрочен план и дихателният път да остане проходим, при необходимост се използват хрущялни опори (графтове). Хрущялът се взема първо от вътрешността на носа (септума); ако не е достатъчен, може да се използва хрущял от ухото или реброто. Това се обсъжда с вас преди операцията.
5. **Функционална корекция:** При необходимост носната преграда (септумът) се изправя и носните конхи се намаляват.
6. **Затваряне и шина:** Разрезите се затварят с фини шевове. Върху гърба на носа се поставя защитна шина; при нужда в носа се поставят меки силиконови шини или тампони, които позволяват дишане.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия	Около 2–4 часа	Обикновено една нощ в болница

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- По-естествена, балансирана и хармонираща с лицето ви форма на носа
- Отстраняване на запушването на носа, ако има такова, и по-лесно дишане
- Принос към по-доброто ви самочувствие

Повечето пациенти са доволни от резултата. Носът обаче е разположен в центъра на лицето и заздравява дълго; крайният резултат се вижда в рамките на **12–18 месеца**. Според публикуваните данни при около **5–15%** от пациентите може да се наложи малка или по-обширна коригираща операция (ревизия). Резултатът е по-труден за предвиждане при дебела кожа, предишни операции или тежка травма на носа.

4 Други възможности за лечение

- **Без операция:** Тъй като процедурата е естетична, винаги имате възможност да се откажете от нея.
- **Оформяне на носа с филъри („нехирургична ринопластика“):** Може временно да замаскира малка гърбица или вдлъбнатина; не намалява носа, не подобрява дишането и носи собствени рискове, като запушване на кръвоносен съд.
- **Само функционална операция (септопластика/редукция на конхите):** Ако единственият проблем е дишането, тя може да се извърши, без да се променя външната форма на носа.
- **Медикаментозно лечение:** Спреят за нос може да помогне при запушване, дължащо се на алергия или оток на лигавицата; не коригира структурните деформации.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако операцията не бъде извършена, сегашната форма на носа ви ще остане непроменена. Ако имате проблеми с дишането със структурна причина (изкривяване, хлътване на носните крила), те няма да се подобрят от само себе си, но обикновено не представляват непосредствена опасност за здравето ви.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Ако през последните 6–12 месеца сте приемали **изотретиноин** (лекарство против акне, напр. Roaccutane), задължително ни уведомете; той може да повлияе на заздравяването на кожата и времето на операцията може да бъде планирано съобразно това.
- Преди операцията се правят кръвни изследвания и при нужда други изследвания; ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- През последните **6–8 часа** преди операцията не трябва да ядете и пиете нищо (моля, спазвайте указанията на анестезиолога).
- В деня на операцията не използвайте грим, лак за нокти, бижута и контактни лещи. Препоръчително е през първия ден след операцията да имате придружител.
- Операцията може да бъде отложена при активно акне или кожна инфекция на лицето, грип или инфекция на горните дихателни пътища.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 48 часа	Запушен нос, лека секреция, главоболие и оток на лицето са нормални. Болката обикновено е лека до умерена и се овладява с обезболяващи. Спането с повдигната глава и студените компреси намаляват отока. **Ако** се появят кръвонасядания, те са около очите и изчезват за 7–10 дни.
1-ва седмица	Силиконовите шини/тампони в носа, ако има такива, обикновено се отстраняват на 2–5-ия ден, а външната шина и конците — около **7-ия ден**. Ще трябва да промивате носа с физиологичен разтвор. Повечето пациенти се връщат към офис работа и социален живот за 7–10 дни.
2–6-а седмица	По-голямата част от отока отшумява, но втвърдяването на върха и лекото изтръпване може да продължат. Тежките физически натоварвания, контактните спортове и плуването трябва да се отложат за около **4–6 седмици**. Очила не трябва да се носят поне **6 седмици**, освен ако не са прикрепени с лепенка така, че да не притискат гърба на носа.
3–12-и месец	Остатъчният оток, особено на върха, постепенно намалява. През този период формата на носа продължава да се променя; малките неравности, видими в началото, обикновено изчезват.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12–18-и месец	Крайният резултат става видим. Ако се прецени, че е необходима корекция (ревизия), тя обикновено се прави след изчакване от поне 12 месеца.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Запушен нос, лека секреция и кървенисто течение от носа (първите дни)
- Оток на лицето и около очите; **ако** се появят кръвонасядания, те изчезват за 1–2 седмици
- Временно изтръпване на върха на носа и предните зъби; втвърдяване на върха
- Временно намаляване на обонянието (подобрява се с отшумяването на отока)
- Формата на носа продължава да се променя в продължение на месеци

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Продължителен оток** — Особено при дебела кожа отокът на върха може да продължи година или повече. При нужда може да се подпомогне с кортикостероидни инжекции.
- **Лека асиметрия и малки неравности** — Тъй като самото лице не е напълно симетрично, в носа могат да останат леки разлики; възможно е да се опипват малки костни/хрущялни издатини, които обикновено не се виждат.
- **Необходимост от ревизия (корекция)** — При около **5–15 от 100** пациенти може да е необходима коригираща процедура — от малка корекция до по-обширна операция.
- **Крусти и сухота в носа** — Чести през първите седмици; отзвучават с редовно промиване и овлажняване.

Нечести състояния

- **Кървене от носа** — При около **1–3 от 100** пациенти може да настъпи кървене, което налага тампониране или друга намеса. Много рядко кървенето трябва да се спре в операционна зала.
- **Инфекция** — Среща се при **по-малко от 1 до 3 от 100** пациенти. Обикновено отзвучава с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране или отстраняване на присадката.
- **Липса на очакваното подобрение на дишането** — Запушването на носа може да не изчезне напълно или рядко да се засили; може да е необходимо допълнително лечение или операция.
- **Перфорация на носната преграда** — Отвор в носната преграда се образува при около **1 от 100** пациенти. Често не причинява оплаквания; ако предизвиква свистене, крусти или кървене, може да се наложи лечение.
- **Събиране на кръв или гной в септума (хематом / абсцес)** — При операция върху септума се среща при **по-малко от 1 от 100** пациенти. Проявява се със засилващо се запушване, болка и температура в дните след операцията. Трябва да се **дренира спешно**, за да не се увреди хрущялът на носа; без лечение може да настъпи загуба на хрущял и хлътване на гърба на носа (седловиден нос), което може да наложи допълнителна операция за корекция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Сраствания в носа (синехии)** — Слепване на тъканите в носа; ако причиняват запушване, се разделят с проста процедура.
- **Забележим белег** — При отворената техника белегът на колумелата рядко може да остане забележим; ако се стесняват ноздрите, в гънката на носното крило остава тънък белег.
- **Продължително изтръпване** — Намалената чувствителност на върха на носа или предните зъби може да продължи няколко месеца; рядко може да е трайна.
- **Проблеми, свързани с присадката** — С времето хрущялните присадки могат да се изместят, изкривят, частично да се резорбират или да станат видими под кожата. Ако хрущял се взема от ухото или реброто, на това място има риск от болка, белег и кървене, а при реброто много рядко — от увреждане на обвивката на белия дроб (пневмоторакс).

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Кожни проблеми** — Изтъняване на кожата, зачервяване, малки видими капиляри или засилено образуване на белезна тъкан при дебела кожа. Много рядко, особено при пушачи и при повторни операции, нарушеното кръвоснабдяване на кожата може да доведе до рана и загуба на тъкан. В такъв случай може да са необходими продължителни грижи за раната и възстановителна операция, като може да остане траен белег или деформация.
- **Трайно намаляване или загуба на обонянието** — Много рядко.
- **Проблеми със слъзния канал и кървене около окото** — Много рядко, във връзка с остеотомиите, може да се появи сълзене или кървене около окото.
- **Изтичане на гръбначно-мозъчна течност (ликворея), менингит, загуба на зрение** — Изключително редки усложнения — **далеч под 1 на 10 000** случая — свързани с увреждане на тънките кости между носа, основата на черепа и окото. При възникването им може да е необходимо допълнително болнично лечение (понякога в интензивно отделение) и операция; загубата на зрение, ако настъпи, може да е трайна.
- **Синдром на токсичния шок** — Много рядка, но сериозна инфекция, свързана с носните тампони, която налага спешно лечение (внезапна висока температура, обрив, ниско кръвно налягане). Изисква болнично лечение, понякога в интензивно отделение, и може да бъде животозастрашаваща.
- **Психологическа неудовлетвореност** — Въпреки технически успешния резултат човек може трудно да свикне с новия си външен вид. Откритото обсъждане на очакванията преди операцията намалява този риск.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Кървене от носа, което не спира или е много обилно** въпреки няколкоминутен натиск и лед
- **Засилващо се запушване, силна болка и оток на носа** в дните след операцията (може да е признак на хематом/абсцес на септума)
- **Температура над 38,5 °C**, засилваща се болка, зачервяване или зловонна секреция от носа
- **Внезапна висока температура, кожен обрив, световъртеж или отпадналост**, докато тампоните са в носа
- **Бистра, водниста секреция** от носа, особено засилваща се при навеждане напред, или силно главоболие и схванат врат
- **Замъглено или двойно виждане**, или бързо нарастващ оток и болка около окото
- Удар по носа или внезапна промяна на формата му
- Задух или болка в гърдите

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- През първите 2 седмици не издухвайте носа си; ако трябва да кихнете, кихайте с отворена уста.
- Почиствайте носа така, както ви е показано, и толкова често, колкото е препоръчано.
- Поне 6 седмици избягвайте удари по носа, очила, опиращи се на гърба на носа, и спане по корем.
- Пазете кожата на носа от слънце поне 3 месеца (слънцезащитен крем с висок фактор, шапка).
- Ако сте пристигнали от чужбина, пътуването със самолет обикновено е безопасно след отстраняване на шината (около 7-ия ден).
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че сравняването на снимките ми преди и след операцията е част от оценката на резултата и че компютърните симулации или примерните снимки служат само за ориентир и не гарантират резултата.
- ☐ Разбирам, че тази процедура е **с естетическа цел**, че не е медицински необходима и че винаги имам възможност да се откажа от нея. Обсъдих очакванията си с лекаря и ми беше обяснен реалистичният резултат, който може да бъде постигнат.
- ☐ Разбирам, че перфектна симетрия или точно копие на външния вид от снимка не могат да бъдат гарантирани, че крайният резултат зависи от това как заздравяват тъканите ми и че в някои случаи може да е необходима коригираща процедура.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.