Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Септопластика

Операция за изправяне на носната преграда (септума)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Процедури, които ще се извършат едновременно:
- ☐ Редукция на носните конхи (радиочестотна / субмукозна)
- ☐ Ендоскопска синусова хирургия — FESS (с отделен формуляр за съгласие)
- ☐ Няма _____

Шини / тампони в носа:
- ☐ Силиконови шини ☐ Тампони ☐ Не са необходими
- ☐ Ще се реши по време на операцията _____

Оплаквания на пациента (страна на запушването, хъркане, главоболие и др.): _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Стената от хрущял и тънка кост, която разделя носната кухина на лява и дясна половина, се нарича **носна преграда (септум)**. Изкривяването на септума към едната или към двете страни се нарича **девиация на носната преграда**. То може да е вродено, да се развие по време на растежа или след удар в носа.

Изкривеният септум може да причини запушване на носа, дишане през устата, хъркане, нарушен сън, сухота в устата, кървене от носа, а при някои хора — пристъпи на синузит или главоболие. Тъй като е структурен проблем, той не се повлиява от лекарства. Целта на септопластиката е да изправи изкривените части, така че да можете да **дишате свободно през носа**. Тази операция няма за цел да промени външния вид на носа.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как се извършва процедурата?

Операцията обикновено се извършва под обща анестезия в операционна зала, изцяло през ноздрите. По лицето не остава видим разрез или белег.

1. **Разрез:** Прави се малък разрез вътре в ноздрата, в лигавицата, която покрива септума.
2. **Отделяне на лигавицата:** Лигавицата, покриваща двете страни на септума, внимателно се отделя от хрущяла и костта.
3. **Корекция на изкривяването:** Изкривените части от хрущяла и костта се отстраняват, изправят или поставят отново на място. Опорните части, които поддържат външната форма на носа (хрущялната рамка на гърба и върха), се запазват.
4. **Намаляване на носните конхи (при нужда):** Ако разположените по страничната стена на носа структури, наречени конхи, са увеличени, те се намаляват с радиочестотна енергия или чрез намаляване на тъканта под лигавицата.
5. **Затваряне:** Лигавицата се поставя обратно на мястото си и се фиксира с резорбируеми конци.
6. **Шини/тампони:** За да заздравее септумът прав и да се предотврати кървене, в носа обикновено се поставят меки силиконови шини с отвор за дишане или тампони.

Ако е изкривена и предната, външна част на септума или външната форма на носа допринася за запушването, операцията може да се съчетае с ринопластика (септоринопластика), при условие че това се обсъди и за него се даде отделно съгласие.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
Обща анестезия (в отделни случаи местна анестезия + седация)	Около 45–90 минути	Същия ден или една нощ в болница

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- По-лесно дишане през носа и по-малко дишане през устата
- По-качествен сън и по-слабо хъркане (хъркането може да има и други причини)
- По-редки повтарящи се кръвотечения от носа, свързани с изкривяването, а при някои пациенти — по-редки пристъпи на синузит
- По-добър достъп при необходимост от синусова или друга операция на носа

Според публикуваните данни около **70–85 от 100** пациенти съобщават за ясно намаляване на запушването след операцията. Ако запушването има и други причини — алергия, оток на лигавицата, хлътване на носните крила или заболяване на синусите — те може да изискват отделно лечение. Рядко септумът може постепенно да се изкриви леко отново.

4 Други възможности за лечение

- **Без операция / наблюдение:** Ако оплакванията са леки, може само да се наблюдават.
- **Медикаментозно лечение:** Кортикостероидните спрейове за нос, промивките и антиалергичните лекарства могат да облекчат оплакванията, като намалят отока на лигавицата, но не коригират структурното изкривяване на костта и хрущяла.
- **Лентички за нос / разширители за ноздрите:** Могат да дадат временно облекчение.
- **Деконгестантни (отпушващи) спрейове:** Подходящи са само за няколко дни; продължителната употреба води до привикване и по-силно запушване.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Ако операцията не бъде извършена, изкривяването няма да се изправи от само себе си; оплакванията като запушен нос, дишане през устата и хъркане ще продължат и може да се засилят с възрастта. Това обикновено

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

не е опасно за живота; решението за операция зависи от това доколко оплакванията влошават качеството ви на живот.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди операцията се правят кръвни изследвания, при нужда компютърна томография на синусите и други изследвания; ще бъдете прегледани от анестезиолог.
- През последните **6–8 часа** преди операцията не трябва да ядете и пиете нищо (моля, спазвайте указанията на анестезиолога).
- Ако в дните преди операцията се разболеете от настинка, грип или заболяване с температура, моля, уведомете ни; операцията може да бъде отложена.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Първите 48 часа	Заради шините ще имате усещане за запушен нос, леко кървениста секреция, главоболие и сухота в гърлото. Болката обикновено е лека. Препоръчва се да спите с повдигната глава. Марлевият тампон под носа може да се наложи да се сменя няколко пъти.
3–7-и ден	Силиконовите шини или тампоните обикновено се отстраняват на контролен преглед между **3-ия и 7-ия ден**; това причинява краткотраен дискомфорт. Започват се промивки на носа. Повечето хора се връщат към офис работа за 5–7 дни.
2–4-та седмица	В носа може да има крусти и сухота, които намаляват с редовни промивки. Дишането постепенно се подобрява. Тежките физически натоварвания и контактните спортове трябва да се отложат за около **3–4 седмици**.
1–3-ти месец	Лигавицата на носа заздравява напълно. Крайният резултат по отношение на дишането обикновено се оценява през този период.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Запушен нос и дишане през устата до отстраняването на шините
- Леко кървениста секреция през първите дни
- Временно изтръпване на горните предни зъби и горната устна
- Крусти и сухота в носа (първите седмици)
- Временно намаляване на обонянието

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Продължителни крусти и сухота** — Може да продължат няколко седмици, особено ако е извършена редукция на конхите; отзвучават с промивки и овлажняващ мехлем.
- **Продължително изтръпване на горните зъби и устната** — Обикновено изчезва за няколко седмици; рядко може да продължи няколко месеца.
- **Запушването не изчезва напълно** — При около **15–30 от 100** пациенти дишането може да не се подобри толкова, колкото се очаква. Причината често са допълнителни фактори като алергия, оток на лигавицата или слабост на носните крила; може да е необходимо медикаментозно лечение или допълнителна операция.

Нечести състояния

- **Кървене от носа** — При около **1–3 от 100** пациенти може да настъпи кървене, което налага тампониране. Много рядко кървенето трябва да се спре в операционна зала.
- **Перфорация на носната преграда** — При около **1–3 от 100** пациенти в септума може да се образува отвор. Често не причинява оплаквания; ако предизвиква свистене, крусти или кървене, може да са необходими промивки, септален обтуратор (бутон) или възстановителна операция.
- **Сраствания в носа (синехии)** — При около **1–5 от 100** пациенти може да се образуват сраствания между септума и страничната стена; ако причиняват запушване, се разделят с проста процедура при контролен преглед.
- **Събиране на кръв или гной в септума (хематом / абсцес)** — Среща се при **по-малко от 1 от 100** пациенти. Проявява се със засилващо се запушване, болка и температура в дните след операцията. Трябва да се **дренира спешно**, за да не се увреди хрущялът на носа; без лечение може да настъпи загуба на хрущял и хлътване на гърба на носа.
- **Инфекция** — Рядка; обикновено отзвучава с антибиотици.
- **Повторно изкривяване** — Поради „паметта“ на хрущяла септумът може с времето леко да се изкриви отново; ако това причинява оплаквания, може да е необходима втора операция.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Хлътване на гърба на носа (седловиден нос)** — Среща се при **по-малко от 1 от 100** пациенти. Отслабването на опорния хрущял на септума или загубата на хрущял след хематом/абсцес може да доведе до хлътване на гърба на носа; това променя външния вид на носа и за корекцията му е необходима допълнителна операция с хрущялна присадка.
- **Спадане или промяна във формата на върха на носа** — Много рядко; може да се получи при засягане на опорните структури.
- **Трайно намаляване или загуба на обонянието** — Много рядко.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Изтичане на гръбначно-мозъчна течност (ликворея) и менингит** — Тъй като горната част на септума граничи с основата на черепа, това е изключително рядко усложнение — **далеч под 1 на 10 000** случая. При възникването му може да са необходими хоспитализация, допълнително лечение и възстановителна операция.
- **Синдром на празния нос** — При прекомерно намаляване на конхите може да се появи усещане за запушване и сухота, въпреки че носът е проходим. Много рядко е; затова конхите се намаляват щадящо. Ако се развие, може да бъде продължителен или траен и се лекува трудно.
- **Синдром на токсичния шок** — Много рядка, но сериозна инфекция, свързана с носните тампони/шини, която налага спешно лечение (внезапна висока температура, обрив, ниско кръвно налягане). Изисква болнично лечение, понякога в интензивно отделение, и може да бъде животозастрашаваща.
- **Нарушение на зрението, кървене около окото** — Изключително рядко при септопластика; рискът е малко по-висок при съчетаване със синусова операция (FESS) и се обяснява в отделен формуляр за съгласие.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- **Кървене от носа, което не спира или е много обилно** въпреки няколкоминутен натиск и лед, или постоянно стичане на кръв в устата
- **Засилващо се запушване, силна болка и оток на носа** в дните след операцията (може да е признак на хематом/абсцес на септума)
- **Температура над 38,5 °C** или зловонна секреция
- **Внезапна висока температура, кожен обрив, световъртеж или отпадналост**, докато тампоните/шините са в носа
- **Бистра, водниста секреция** от носа, особено засилваща се при навеждане напред, силно главоболие или схванат врат
- **Замъглено или двойно виждане** или оток около окото
- Задух или болка в гърдите

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- През първите 2 седмици не издухвайте носа си; кихайте с отворена уста.
- Промивайте носа така, както ви е показано, и толкова често, колкото е препоръчано.
- През първите 2 седмици избягвайте горещи вани, сауна, турска баня и вдигане на тежести.
- Пазете носа от удари поне 4 седмици.
- Ако сте пристигнали от чужбина, пътуването със самолет обикновено е безопасно след отстраняване на шините.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.
- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.

☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.

☐ Разбирам, че целта на тази операция е да подобри дишането, а не да промени външния вид на носа, и че може да е необходимо допълнително лечение, ако запушването има и други причини.

☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**

☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.