Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Специалист по оториноларингология и хирургия на главата и шията

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Поставяне на вентилационна тръбичка / Миринготомия

Поставяне на тръбичка в тъпанчето / разрез на тъпанчето за изтегляне на течност (парацентеза)

Уважаеми пациенти, този формуляр е изготвен, за да ви обясни на **ясен и разбираем език** какво трябва да знаете за препоръчаната ви процедура. Целта му не е да ви уплаши, а да ви помогне да вземете решението си **свободно и информирано**.

Моля, прочетете формуляра спокойно. Попитайте лекаря си за всичко, което не разбирате. Лекарят ще ви обясни и устно рисковете, които се отнасят конкретно за вас. Дали да дадете съгласие, или не, е изцяло ваше право.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА И ПРОЦЕДУРАТА

Име и фамилия: _____ Дата на раждане: _____

ЕГН / № на паспорт: _____ № на досие / протокол: _____

Телефон: _____ Дата на информиране: _____

Планирана дата: _____

Формулярът е предоставен за първи път (дата / имейл, WhatsApp, лично): _____

Лекар, който ще извърши процедурата и предоставя информацията: **д-р Мурат Аята (Op. Dr. Murat Ayata)**

Болница / лечебно заведение, където ще се извърши процедурата: _____

Страна: ☐ Дясно ☐ Ляво ☐ Двустранно

Планирана процедура:
☐ Миринготомия + вентилационна тръбичка
☐ Само миринготомия (без тръбичка)

Вид тръбичка:
☐ Краткосрочна тръбичка
☐ Дългосрочна тръбичка (Т-тръбичка и др.) _____

Допълнителни процедури по време на същата операция: ☐ Аденоидектомия ☐ Тонзилектомия ☐ Няма _____

1 Вашето състояние и целта на процедурата

Средното ухо е малко пространство зад тъпанчето (тъпанчевата мембрана), което нормално е изпълнено с въздух. То се вентилира чрез **Евстахиевата тръба**, която се отваря в задната част на носа. Когато Евстахиевата тръба не функционира добре (особено при деца — поради уголемени аденоиди, алергия или чести настинки), в средното ухо се **натрупва течност** (секреторен отит).

Тази течност може да причини **намален слух**, а при децата — **забавяне в развитието на говора и езика**, проблеми с вниманието, нарушено равновесие и **повтарящи се възпаления на ушите**. Ако течността се задържи дълго, тъпанчето може да изтънее, да хлътне и да претърпи трайни промени. Подобни проблеми могат да възникнат и при възрастни, например поради промени в налягането при полет или гмуркане или поради заболявания в задната част на носа.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Целта на процедурата е чрез малък отвор в тъпанчето да се изтегли течността и с поставената в него малка тръбичка да се осигури вентилация на средното ухо — така **слухът се подобрява, а възпаленията стават по-редки.**

2 Как се извършва процедурата?

При децата процедурата обикновено се извършва под кратка обща анестезия, а при възрастните най-често под местна анестезия. Тя се прави през ушния канал под микроскоп; **отвън няма разрези или белези.**

1. **Почистване на ушния канал:** Под микроскоп ушният канал се почиства от ушна кал и тъпанчето се оглежда.
2. **Миринготомия:** На тъпанчето се прави малък разрез с размер около 1–2 мм в участък, където няма да повлияе на слуха.
3. **Изтегляне на течността:** Течността в средното ухо (която може да бъде бистра, гъста или гнойна) се изтегля с тънка аспирационна канюла. При нужда може да се вземе проба за микробиологично изследване.
4. **Поставяне на тръбичката:** В разреза се поставя малка тръбичка с форма на макара и размер няколко милиметра. Тя временно поема функцията на Евстахиевата тръба и осигурява вентилация на средното ухо.
5. **Приключване:** При нужда се поставят ушни капки. Обикновено в ухото не се слага тампон или се поставя само малко памуче.

Краткосрочните тръбички обикновено се изтласкват от само себе си в рамките на **6–18 месеца**, докато тъпанчето заздравява, и падат в ушния канал; често това остава незабелязано. **Дългосрочните тръбички** остават по-дълго на мястото си и понякога е необходимо да бъдат извадени с отделна процедура.

Когато се извършва само миринготомия (без тръбичка), отворът в тъпанчето се затваря за няколко дни и течността може отново да се натрупа.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ	ПРЕСТОЙ В БОЛНИЦА / ИЗПИСВАНЕ
При деца обща анестезия; при възрастни обикновено местна анестезия	Около 10–20 минути за двете уши	Обикновено изписване в същия ден

3 Очаквани ползи и вероятност за успех

- Слухът обикновено се подобрява веднага или за кратко време
- При децата — положителен ефект върху говора, езиковото развитие, вниманието и успеха в училище
- По-редки и по-леки възпаления на ушите; когато възникне възпаление, то обикновено може да се лекува с ушни капки вместо с антибиотици през устата
- По-нисък риск от трайно увреждане на тъпанчето; изчезване на усещането за натиск и запушване в ухото

Докато тръбичката е на мястото си и е проходима, при повечето пациенти слухът се подобрява и възпаленията на ушите стават по-редки. Ако до изпадането на тръбичката Евстахиевата тръба се е развила достатъчно, течността обикновено не се натрупва отново. При някои деца (около **20–30 на 100**) обаче течността се появява отново и може да е необходимо **повторно поставяне на тръбички**.

4 Други възможности за лечение

- **Наблюдение:** При много деца течността в средното ухо изчезва сама в рамките на 3 месеца. Ако намаляването на слуха е леко и няма рискови фактори, е възможно наблюдение с редовни слухови изследвания.
- **Автоинсуфлация (отоинфлация):** Особено при по-големите деца надуването на специален балон през носа може да помогне за отварянето на Евстахиевата тръба.
- **Слухов апарат:** При пациенти, които не желаят или не са подходящи за операция, може да бъде временно решение, докато течността се задържа.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Медикаментозно лечение:** При наличие на алергия или заболяване на носа и синусите те се лекуват; данните обаче, че антибиотици, кортикостероиди или назални спрейове трайно премахват течността в средното ухо, са ограничени.
- **Аденоидектомия:** При подходящи деца може да се препоръча заедно с тръбичките или когато е необходимо повторно поставяне.

5 Какво ще стане, ако процедурата не бъде извършена?

Без процедурата течността може да изчезне сама при някои пациенти; ако обаче се задържи, намаленият слух, забавянето в развитието на говора и езика при децата, проблемите с вниманието и в училище, нарушеното равновесие и повтарящите се възпаления на ушите може да продължат. Продължително задържащата се течност може да доведе до хлътване (ретракция) на тъпанчето, трайни промени в него, увреждане на слуховите костици и рядко до по-сериозни ушни заболявания, налагащи операция, като **холестеатом**.

Имате право да откажете препоръчаната процедура, да я отложите или да потърсите второ лекарско мнение. Това решение по никакъв начин няма да повлияе на другите медицински грижи, които ви се предлагат. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време преди началото на процедурата; трябва обаче да знаете, че след като процедурата започне, може да има етапи, на които прекъсването ѝ би било нежелателно от медицинска гледна точка.

6 Подготовка за процедурата

- Преди процедурата се правят изследване на слуха (аудиометрия) и изследване на налягането в средното ухо (тимпанометрия).
- Ако е планирана обща анестезия, ще бъдете прегледани от анестезиолог; през последните **6 часа** преди операцията не трябва да се дава твърда храна и мляко, а за бистрите течности спазвайте срока, определен от анестезиолога.
- Уведомете ни, ако през последните 2 седмици преди процедурата е имало температура, кашлица или грип; процедурата може да бъде отложена.
- Ако има изтичане от ухото или активно възпаление, може да е необходимо то да бъде лекувано преди процедурата.
- Съобщете на лекаря си за **всички лекарства**, които приемате (включително средства за разреждане на кръвта, аспирин, обезболяващи, лекарства за отслабване и хормонални препарати), както и за **билкови продукти и хранителни добавки** (омега-3, витамин Е, гинко, чесън, женшен, рибено масло и др.). Не спирайте сами никое лекарство без съвет от лекаря.
- Задължително ни информирайте за **алергии**, проблеми с кървенето или съсирването на кръвта, сърдечни и белодробни заболявания, диабет, високо кръвно налягане, заболявания на щитовидната жлеза, предишни операции и проблеми при предишни анестезии.
- Ако има вероятност да сте бременна или кърмите, кажете ни преди процедурата.
- Тютюнопушенето и никотиновите продукти значително влошават заздравяването на раните. Препоръчително е да ги спрете поне 2–4 седмици преди процедурата и да не пушите по време на възстановяването.

7 Възстановяване: какво да очаквате

Денят на процедурата	Повечето пациенти се прибират у дома след няколко часа. Може да има лека болка или усещане за запушване в ухото, които отминават с обикновени обезболяващи. Няколко дни от ухото може да изтича слабо кървениста или водниста секреция. Повечето пациенти **веднага чуват звуците по-силно**; в първите дни това може да е неприятно.
Първата седмица	

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	Ако лекарят е препоръчал, се използват ушни капки. Децата могат да се върнат на училище/детска градина, а възрастните — на работа след 1–2 дни. Трябва да се внимава в ухото да не попада вода.
4–8-а седмица	Извършва се първият контролен преглед; проверява се дали тръбичката е на мястото си и е проходима и се повтаря изследването на слуха.
Докато тръбичката е на място (6–18 месеца)	Препоръчват се контролни прегледи на около **всеки 3–6 месеца**. Възпалението на ухото се проявява с изтичане и обикновено се лекува с ушни капки. Полетите със самолет обикновено се понасят по-леко, докато тръбичката е на място.
След изпадане на тръбичката	Проверява се дали отворът в тъпанчето се е затворил и дали в средното ухо няма течност; прави се изследване на слуха.

8 Възможни рискове и усложнения

Както всяка медицинска процедура, и тази носи определени рискове. По-долу **очакваните временни ефекти** и **усложненията** са описани отделно и са групирани според това колко често се срещат. Посочените стойности са **приблизителни** и се основават на медицинската литература; вашият личен риск може да бъде по-нисък или по-висок в зависимост от възрастта, общото здравословно състояние, тютюнопушенето и предишните операции.

По-голямата част от усложненията са **временни** и отзвучават при подходящо лечение. В списъка са включени и много редки, но сериозни състояния; това, че са описани, не означава, че ще се случат при вас, но трябва да знаете за тях, за да вземете информирано решение.

Очаквани временни ефекти (не са усложнения — естествена част от заздравяването)

- Лека болка и усещане за запушване в ухото (1–2 дни)
- Слабо кървениста или водниста секреция от ухото няколко дни
- Временно усещане, че звуците са много силни или ехтят
- Временно гадене или неспокойствие след обща анестезия

Чести състояния (повечето са временни или отзвучават с лечение)

- **Изтичане от ухото (оторея)** — Около **10–25 на 100** пациенти с тръбички имат поне един епизод на изтичане от ухото, обикновено след настинка или попадане на вода в ухото. В повечето случаи отминава за няколко дни с ушни капки с антибиотик. Рядко изтичането може да е упорито и да наложи лекарства през устата, почистване на ухото или изваждане на тръбичката.
- **Бели петна по тъпанчето (тимпаносклероза)** — Варовикови бели петна по тъпанчето се срещат често (при около **10–30+ на 100** уши). В повечето случаи не влияят на слуха.
- **Ранно изпадане или запушване на тръбичката** — Тръбичката може да изпадне по-рано от очакваното или да се запуши от засъхнала кръв или секрет. В такъв случай се опитва отпушване с капки; при нужда тръбичката се сменя.
- **Необходимост от повторно поставяне** — Ако след изпадането на тръбичката течността се натрупа отново, при около **20–30 на 100** деца може да е необходимо второ поставяне на тръбички (понякога заедно с аденоидектомия).

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Нечести състояния

- **Трайна перфорация (дупка) на тъпанчето** — След изпадането на тръбичката отворът в тъпанчето може да не се затвори: при около **1–3 на 100** пациенти с краткосрочни тръбички и по-често при дългосрочните (около **10–20 на 100**). Малките перфорации често не причиняват оплаквания; ако водят до повтарящо се изтичане или намален слух, може да е необходимо **затварянето им с отделна операция (тимпанопластика/миринготомия)**.
- **Изтъняване или хлътване на тъпанчето** — На мястото на тръбичката тъпанчето може да изтънее или да хлътне навътре; може да е необходимо проследяване.
- **Тръбичката не изпада** — Ако тръбичката не изпадне в очаквания срок (обикновено ако остане повече от 2–3 години), може да се наложи да бъде извадена с кратка процедура; при децата тя обикновено се извършва под обща анестезия.
- **Разрастване на тъкан в ушния канал (гранулации)** — Около тръбичката може да се образува червена възпалителна тъкан; тя може да причини кървениста секреция и се лекува с капки или с малка процедура.

Редки или много редки, но потенциално сериозни състояния

- **Попадане на тръбичката в средното ухо** — Много рядко, вместо да изпадне навън, тръбичката може да се плъзне зад тъпанчето в средното ухо; за изваждането ѝ може да е необходима отделна процедура.
- **Холестеатом** — Заболяване, подобно на киста, което се образува, когато кожният слой на тъпанчето врасне в средното ухо. Във връзка с поставянето на тръбички се среща **много рядко**. Ако се развие, е необходимо хирургично лечение.
- **Загуба на слуха, шум в ухото или световъртеж** — Трайна загуба на слуха, шум в ухото или световъртеж поради засягане на вътрешното ухо или слуховите костици са **изключително редки**.
- **Нараняване на ушния канал и кървене** — При тесен ушен канал може да се получат малки наранявания; много рядко са описани сериозни увреждания, свързани с анатомични варианти на лицевия нерв, вътрешното ухо или големите кръвоносни съдове.

Общи рискове при всяка хирургична / медицинска намеса

- **Рискове от анестезията:** Ако се използва обща анестезия или седация, рисковете (гадене, болки в гърлото, увреждане на зъб, алергична реакция и много рядко сърдечни или белодробни проблеми) ще ви бъдат обяснени отделно от анестезиолога, а съгласието ви ще бъде взето с **отделен формуляр за анестезия**.
- **Кървене и кръвопреливане:** Необходимостта от кръвопреливане при тези процедури е много рядка. При сериозно кървене може да се наложи прилагане на кръв или кръвни продукти; те носят собствени много редки рискове (напр. алергия или инфекция).
- **Инфекция:** Инфекцията на раната след операция обикновено се лекува с антибиотици; рядко може да се наложи дрениране (отстраняване на натрупаната гной).
- **Кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза) и в белите дробове (белодробна емболия):** Много редки при кратки операции в областта на главата и шията. Ранното раздвижване намалява риска. Хормоналните лекарства, тютюнопушенето, затлъстяването и предишни тромбози увеличават риска.
- **Алергия към лекарства:** Може да се развие алергична реакция към използваните лекарства, антисептици, лепенки или конци.
- **Белези и проблеми със заздравяването:** Белезите са различни при различните хора; много рядко може да се образува задебелен (хипертрофичен) белег или келоид.
- **Риск за живота:** Смъртният изход при планови операции в областта на главата и шията днес е изключително рядък; нито една хирургична намеса обаче не е напълно без риск. При сериозно усложнение може да се наложи лечение в интензивно отделение и да остане трайно увреждане.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Този списък не обхваща всички възможни усложнения; могат да възникнат и други непредвидими и много редки състояния. Ако се развие усложнение, лекарят ви ще планира необходимото лечение и проследяване; това може да наложи допълнително лечение, лекарства, процедури или повторна операция.

9 Кога да се свържете с нас незабавно

- Обилно изтичане или изтичане с неприятна миризма от ухото, което продължава **повече от 3–5 дни** въпреки капките
- **Температура над 38,5 °C**, силна болка в ухото
- Зачервяване или оток зад ухото, изместване на ушната мида напред
- **Внезапна загуба на слуха**, силен световъртеж, нестабилност или повръщане
- Асиметрия на лицето, увисване на ъгъла на устата или невъзможност за затваряне на окото
- Обилно кървене от ухото

Ако се появи някое от тези състояния, обадете се незабавно на лекаря си: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Ако не можете да се свържете с нас, отидете в най-близкото спешно отделение или се обадете на 112.

10 Препоръки относно лекарства и ежедневие

- Докато тръбичката е на място, **избягвайте попадане на мръсна вода (езеро, море, басейн, вода от вана) в ухото.** Под душа и във ваната може да се използва памук, намазан с вазелин, или тапи за уши. Относно плуването следвайте съвета на лекаря; обикновено е разрешено плуване на повърхността с тапи за уши и/или шапка за плуване, но гмуркането не се препоръчва.
- Не почиствайте вътрешността на ушния канал с клечки за уши.
- При изтичане от ухото внимателно забършете секрета отвън, използвайте препоръчаните ви капки и уведомете лекаря. Не използвайте сами други ушни капки; някои капки не са подходящи за средното ухо.
- Продължавайте да идвате на контролни прегледи и след изпадането на тръбичката; важно е да се проследяват слухът и състоянието на тъпанчето.
- Приемайте предписаните ви лекарства (антибиотици, обезболяващи и др.) в препоръчаната доза и за препоръчания срок. Не приемайте аспирин или подобни лекарства, които могат да засилят кървенето, без да се консултирате с лекаря.
- При полет или пътуване по-дълго от 4 часа след операцията пийте достатъчно вода, раздвижвайте се често и при препоръка носете компресивни чорапи; това намалява риска от образуване на кръвни съсиреци в краката.
- По време на възстановяването се препоръчва да не консумирате алкохол и да избягвате тютюнопушене и никотинови продукти.
- Моля, явявайте се на всички контролни прегледи. Ако сте пристигнали от чужбина, проследяването след завръщането ви може да продължи чрез онлайн консултации и снимки/видео; ако се наложи да посетите местен лекар, ще получите писмена епикриза с описание на операцията и нашите препоръки.

11 Непредвидени ситуации по време на процедурата, тъканни проби и кръвни продукти

Ако по време на процедурата възникне непредвидена ситуация, лекарят ще остане в рамките на процедурата, за която сте дали съгласие с този формуляр. **Освен при опасност за живота или риск от сериозно увреждане на орган**, няма да бъде извършена допълнителна процедура, за която не сте дали съгласие; в такъв случай процедурата ще бъде приключена на подходящ етап, ще бъдете информирани след това и решението ще бъде взето заедно с вас. При опасност за живота ще бъде извършена спешната намеса, необходима за опазване на живота или органа ви.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Отстранените по време на процедурата тъкани при необходимост се изпращат за **хистологично (патологично) изследване** за потвърждаване на диагнозата. В зависимост от резултата може да е необходимо допълнително лечение или проследяване.

Кръвопреливане при тези процедури се налага много рядко и се извършва само когато е жизнено необходимо. Ако не приемате кръв или кръвни продукти (например по религиозни причини), задължително ни уведомете преди процедурата; възможните последици от това решение ще бъдат обсъдени с вас отделно и записани в раздел „Информация, специфична за вас“.

12 Снимки, видеозаписи и вашите лични данни

Преди и след процедурата може да бъдат направени **снимки/видеозаписи** с цел планиране, проследяване и оценка на резултата. Тези записи са част от медицинското ви досие и се пазят поверително. Изображенията ви **в никакъв случай няма да бъдат използвани за реклама, промоция или в социалните мрежи.**

Изображенията ви могат да бъдат използвани за други цели **само с вашето отделно и изрично разрешение**. Отказът ви по никакъв начин няма да повлияе на лечението, а даденото разрешение можете да оттеглите по всяко време:

- ☐ Съгласен/съгласна съм изображенията ми да се използват **само за медицинската документация и проследяване на лечението**.
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, който не позволява да бъда разпознат/а** (с покрито лице/очи).
- ☐ Разрешавам изображенията ми да се използват за научни публикации и медицинско обучение **по начин, по който мога да бъда разпознат/а**.
- ☐ **Не разрешавам** използване за научни/образователни цели.

Вашите лични и здравни данни се обработват съгласно турския Закон за защита на личните данни № 6698 (KVKK) и приложимото здравно законодателство, за целите на диагностиката, лечението и законовите задължения, от лица, обвързани с професионална тайна. Подробна информация можете да намерите в нашето Уведомление за защита на личните данни.

13 Информация и бележки, специфични за вас (попълва се от лекаря)

Допълнителни рискове, специфични за пациента (придружаващи заболявания, лекарства, предишни операции), подробности за плана, очаквания на пациента, зададени въпроси и дадени отговори. Ако няма какво да се добави, пише се „няма“.

14 Декларация на пациента

- ☐ Прочетох и разбрах този формуляр на моя език. Беше ми дадено достатъчно време за размисъл; имах възможност да задам въпроси и получих задоволителни отговори.
- ☐ Бяха ми обяснени устно и писмено моето състояние, целта на препоръчаната процедура, как, от кого и къде ще бъде извършена, приблизителната ѝ продължителност, очакваните ползи, вероятността за успех, алтернативите и какво може да се случи, ако не бъде извършена.
- ☐ Бяха ми обяснени честите и потенциално сериозните рискове, както и възможните последици от тези усложнения (включително че може да се наложи допълнително лечение или повторна процедура/операция). Разбирам, че резултатът от никоя медицинска процедура **не може да бъде гарантиран на 100%**.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Дадох вярна и пълна информация за здравословното си състояние, лекарствата, които приемам, алергиите и прекараните заболявания. Разбирам, че непълната или невярна информация може да увеличи рисковете.
- ☐ Разбирам, че спазването на указанията преди и след процедурата е част от резултата и че явяването на контролни прегледи е важно.
- ☐ Знам, че мога да оттегля съгласието си по всяко време преди началото на процедурата. Разбирам, че подписването на този формуляр не освобождава лекаря от задължението му да полага дължимата грижа.
- ☐ Вземам това решение по собствена свободна воля, без натиск от когото и да било.
- ☐ Разбирам, че тръбичката ще изпадне сама след определено време, че при повторно натрупване на течност може да е необходимо ново поставяне и че ако в тъпанчето остане трайна перфорация, за затварянето ѝ може да е необходима отделна операция.

- ☐ **ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура.**
- ☐ **НЕ ДАВАМ СЪГЛАСИЕ за извършване на описаната по-горе процедура. Бяха ми обяснени възможните последици от отказа.**

Препоръчва се пациентът да напише собственоръчно: „Прочетох и разбрах този формуляр и давам съгласието си.“

15 Подписи

	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ДАТА / ЧАС
Пациент			
Законен представител (родител / настойник) — родство:			
Лекар, предоставил информацията и извършващ процедурата			
Преводач (при нужда) — език:			
Свидетел (при нужда)			

Декларация на преводача: Преведох пълно и точно този формуляр и устните обяснения на лекаря на пациента / законния представител на език, който той/тя разбира.

Частна клиника „Op. Dr. Murat Ayata“
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ЗА ПАЦИЕНТИ ПОД 18 ГОДИНИ ИЛИ С ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При пациенти под 18 години съгласието се дава от **родител или настойник**. Детето се информира по начин, съобразен с възрастта и зрелостта му, и се взема предвид неговото мнение. При пациенти с ограничена дееспособност съгласието се дава от законния представител.

☐ Ако упражняваме родителските права съвместно, декларирам, че другият родител е информиран и е съгласен с тази процедура.

☐ Декларирам, че няма съдебно решение или спор относно родителските права / настойничеството (ако има, съответният документ е показан на лекаря).

Детето е информирано по подходящ за възрастта му начин; мнение на детето: _____

Този формуляр е изготвен в два екземпляра: единият се съхранява в досието на пациента, а другият се предоставя на пациента / законния представител.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО (ПОПЪЛВА СЕ САМО АКО СЕ ОТКАЖЕТЕ)

Оттеглям даденото по-горе съгласие. Бяха ми обяснени възможните последици от оттеглянето.

Име, подпис, дата и час на пациента/представителя, оттеглящ съгласието: _____

Този формуляр е изготвен в съответствие с Наредбата за правата на пациентите на Република Турция и принципите на Турския лекарски съюз за информирано съгласие. Той допълва, но не заменя устното обяснение на вашия лекар.