Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Endolaryngeale Mikrochirurgie

Mikrochirurgie an den Stimmlippen / am Kehlkopf (Mikrolaryngoskopie)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Befund / vorläufige Diagnose: _____

Seite: ☐ Rechte Stimmlippe ☐ Linke Stimmlippe ☐ Beidseitig ☐ Anderer Bereich des Kehlkopfs _____

Geplante Technik: ☐ Kalte Instrumente ☐ CO2-Laser ☐ Wird von der Operateurin/dem Operateur während der Operation entschieden

Biopsie / feingewebliche Untersuchung: ☐ Geplant ☐ Falls für notwendig erachtet ☐ Nicht geplant _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Der Kehlkopf (Larynx) liegt vorn am Hals. Er erzeugt die Stimme, schützt die Atemwege und verschließt beim Schlucken die Luftröhre. Die Stimmlippen (Stimmbänder) sind zwei dünne Strukturen im Inneren des Kehlkopfs, die durch Schwingung den Ton erzeugen.

An den Stimmlippen oder an anderen Stellen des Kehlkopfs können sich Veränderungen wie **Knötchen, Polypen, Zysten, Reinke-Ödem, Papillome oder Leukoplakien (weiße Beläge)** oder ein krebsverdächtiger Befund bilden. Diese können Heiserkeit, eine schnell ermüdende Stimme, ein Fremdkörpergefühl im Hals und selten Atemnot verursachen. Ursachen sind unter anderem falscher oder übermäßiger Stimmgebrauch, Rauchen, Reflux, Infektionen (z. B. HPV) und manchmal unbekannte Faktoren.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ziel der Operation ist es, den Befund unter größtmöglicher Schonung des gesunden Stimmlippengewebes zu entfernen, **Ihre Stimme zu verbessern**, bei Bedarf die Atemwege zu erweitern und **eine sichere Diagnose durch die feingewebliche (pathologische) Untersuchung** des entfernten Gewebes zu stellen.

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation wird in Vollnarkose im Operationssaal durch den Mund durchgeführt; am Hals wird kein Schnitt gesetzt.

1. **Zugang zum Kehlkopf:** Wenn Sie schlafen, wird ein Metallrohr (Laryngoskop) durch den Mund bis zum Kehlkopf eingeführt. Ihre Zähne werden durch einen speziellen Zahnschutz geschützt.
2. **Untersuchung unter dem Mikroskop:** Die Stimmlippen werden mit einem Operationsmikroskop oder Endoskop vergrößert und genau untersucht. Dabei können zusätzliche Befunde entdeckt werden, die bei der Untersuchung in der Praxis nicht sichtbar waren.
3. **Entfernung des Befundes:** Der Befund wird mit sehr feinen mikrochirurgischen Instrumenten oder einem CO2-Laser entfernt, wobei die schwingende Oberfläche der Stimmlippe so weit wie möglich erhalten wird. Bei Bedarf wird nur eine kleine Gewebeprobe zur Diagnose entnommen (Biopsie).
4. **Zusätzliche Maßnahmen:** Je nach Situation können kleine, mit Medikamenten getränkte Tupfer zur Blutstillung verwendet und ein Medikament in die Stimmlippe gespritzt werden, um die Narbenbildung zu verringern.
5. **Abschluss:** Das Laryngoskop wird entfernt, und Mund und Zähne werden kontrolliert. Am Hals gibt es keine Nähte und keine sichtbaren Narben.

Sehr selten ist es wegen einer eingeschränkten Mundöffnung, der Form der Zähne oder der Anatomie von Kiefer oder Hals nicht möglich, den Kehlkopf sicher zu erreichen. In diesem Fall kann der Eingriff abgebrochen werden, und es werden Ihnen alternative Verfahren erläutert.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose	Etwa 20–60 Minuten	In der Regel Entlassung am selben Tag oder eine Nacht im Krankenhaus

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Weniger Heiserkeit und eine klarere, weniger schnell ermüdende Stimme
- Eine **sichere Diagnose** durch die feingewebliche Untersuchung des entfernten Gewebes, sodass eine früh erkannte Erkrankung rechtzeitig behandelt werden kann
- Leichteres Atmen, wenn der Befund die Atemwege einengt

Bei gutartigen Befunden wie Knötchen, Polypen und Zysten bessert sich die Stimme bei den meisten Patienten deutlich. Das Ergebnis hängt jedoch von Art und Größe des Befundes, dem vorherigen Zustand der Stimmlippen, Faktoren wie Rauchen und Reflux sowie davon ab, wie konsequent **Stimmruhe und Stimmtherapie** nach der Operation eingehalten werden. Manche Erkrankungen, wie z. B. Papillome, können wiederkehren und mehr als eine Operation erforderlich machen.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Stimmtherapie (bei einer Logopädin/einem Logopäden):** Kann insbesondere bei Stimmlippenknötchen die erste Wahl sein und macht eine Operation oft überflüssig.
- **Medikamente:** Medikamente, die die Magensäure verringern und Entzündungen hemmen, können helfen, wenn Reflux oder eine Entzündung die Ursache ist.
- **Rauchstopp und gute Stimmhygiene:** Tragen bei manchen Befunden (z. B. Reinke-Ödem) zur Rückbildung bei.
- **Ambulanter Eingriff in örtlicher Betäubung:** Bei geeignet ausgewählten kleinen Befunden oder für Biopsien kann ein Eingriff im Wachzustand mit einem Endoskop durch Nase oder Mund durchgeführt werden; dies ist nicht für jeden Befund geeignet.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Engmaschige Beobachtung:** Kleine Befunde ohne Krebsverdacht können mit regelmäßigen Untersuchungen überwacht werden.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Ohne Operation kann Ihre Heiserkeit fortbestehen oder sich verschlimmern. Da die genaue Art des Befundes nicht bekannt ist, kann sich – wenn auch selten – die Diagnose einer zugrunde liegenden ernsten Erkrankung (z. B. Krebs im Frühstadium oder eine Veränderung, die bösartig werden kann) verzögern. Wachsende Befunde können selten Atemnot verursachen.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen durchgeführt, und Sie werden von der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt untersucht.
- In den **6–8 Stunden** vor der Operation dürfen Sie nichts essen und nichts trinken (befolgen Sie die Anweisungen der Narkoseärztin bzw. des Narkosearztes).
- Teilen Sie uns unbedingt **lockere Zähne, Kronen, Brücken, Implantate oder Zahnprothesen** mit; herausnehmbarer Zahnersatz wird vor der Operation entfernt.
- Wurde Ihnen eine Refluxbehandlung empfohlen, werden Sie möglicherweise gebeten, bereits vor der Operation damit zu beginnen.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 24–48 Stunden	Es können Halsschmerzen oder ein Brennen im Hals, leichte Beschwerden beim Schlucken, Heiserkeit und etwas blutig tingierter Schleim auftreten. Möglicherweise bemerken Sie ein Taubheitsgefühl der Zunge, einen veränderten Geschmack oder Kieferschmerzen; diese klingen meist innerhalb weniger Tage ab.
1. Woche	Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt wird in der Regel **3–7 Tage vollständige Stimmruhe** (nicht sprechen, nicht flüstern) empfehlen, gefolgt von einer schrittweisen Rückkehr zum Stimmgebrauch. Die meisten Patienten können innerhalb von 2–3 Tagen wieder einer Bürotätigkeit nachgehen; Menschen in Sprechberufen (Lehrkräfte, Sängerinnen und Sänger, Callcenter-Mitarbeitende) sollten länger warten.
2.–4. Woche	Die Stimme bessert sich allmählich. Bei Bedarf wird eine Stimmtherapie begonnen. Vermeiden Sie Schreien, Singen und langes Sprechen. Das Ergebnis der Pathologie liegt meist in diesem Zeitraum vor und wird mit Ihnen besprochen.
1.–3. Monat	

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Die Heilung der Stimmlippen wird abgeschlossen; die endgültige Stimme zeigt sich in der Regel innerhalb von **6–12 Wochen**. Bei der Kontrolluntersuchung werden die Stimmlippen mit einem Endoskop beurteilt.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Halsschmerzen und leichte Beschwerden beim Schlucken (einige Tage)
- Vorübergehende Heiserkeit oder Veränderung der Stimmlage nach der Operation
- Etwas blutig tingierter Schleim (erste 1–2 Tage)
- Empfindlichkeit von Kiefer, Lippen oder Zähnen; kleine Einrisse in den Mundwinkeln

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Taubheitsgefühl der Zunge und Geschmacksveränderung** — Entsteht durch den Druck des Laryngoskops auf die Zunge; tritt bei etwa **5–15 von 100** Patienten auf und bildet sich meist innerhalb von wenigen Tagen bis einigen Wochen zurück, sehr selten hält es mehrere Monate an.
- **Kiefergelenkschmerzen** — Entstehen dadurch, dass der Mund längere Zeit geöffnet gehalten wird; vergehen meist innerhalb weniger Tage. Bei Menschen mit bestehenden Kiefergelenkproblemen können sie häufiger auftreten und länger anhalten.
- **Stimme bessert sich weniger als erwartet** — Die Stimme normalisiert sich nach der Operation nicht immer vollständig; eine Stimmtherapie oder eine weitere Behandlung kann erforderlich sein.

Gelegentliche Beschwerden

- **Zahnschäden** — Trotz Zahnschutz kann es bei etwa **1–5 von 100** Patienten zu einem abgesplitterten, gesprungenen oder gelockerten Zahn oder zur Beschädigung einer Krone/Brücke kommen. Bei lockeren, kariösen oder künstlichen Zähnen ist das Risiko höher; eine zahnärztliche Behandlung kann erforderlich sein.
- **Verschlechterung der Stimme oder dauerhafte Stimmveränderung** — Bildet sich Narbengewebe auf der Oberfläche der Stimmlippe, kann die Stimme heiserer, schwächer oder schneller ermüdbar werden als vor der Operation. Dies kann eine Stimmtherapie und manchmal weitere Operationen erfordern; selten kann es dauerhaft sein.
- **Wiederauftreten des Befundes** — Der Befund kann wiederkehren, insbesondere wenn die Stimme weiterhin falsch belastet oder weiter geraucht wird, oder bei Erkrankungen wie Papillomen; eine erneute Operation kann dann erforderlich sein.
- **Segelbildung (Synechie) im vorderen Stimmlippenbereich** — Werden beide Stimmlippen nahe am vorderen Ende behandelt, können sie miteinander verkleben; dies kann die Stimmqualität beeinträchtigen, und eine zweite Operation zu ihrer Trennung kann erforderlich sein.
- **Weitere Behandlung je nach feingeweblichem Befund** — Der feingewebliche Befund kann anders ausfallen als erwartet (z. B. eine Veränderung mit Neigung zur bösartigen Entartung oder Krebs). In diesem Fall können eine weitere Operation, eine Strahlentherapie oder engmaschige Kontrollen erforderlich sein; dies wird Ihnen ausführlich erläutert.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Schwellung (Ödem) des Kehlkopfs und Atemnot** — Nach der Operation kann sich eine Schwellung des Kehlkopfs entwickeln. Sie bessert sich meist mit Medikamenten; sehr selten kann eine Überwachung auf der Intensivstation oder eine vorübergehende Öffnung am Hals zur Sicherung der Atemwege (Tracheotomie) erforderlich sein.
- **Blutung** — Stärkere Blutungen sind selten. Wegen der Gefahr, dass Blut in die Atemwege gelangt, kann eine ernste Blutung ein rasches Eingreifen und eine erneute Operation erfordern.
- **Laserbedingte Risiken** — Beim Einsatz eines CO2-Lasers besteht das Risiko von Verbrennungen des umgebenden Gewebes und sehr selten einer Entzündung des Beatmungsschlauchs (Atemwegsbrand). Es werden laserspezifische Sicherheitsmaßnahmen (spezieller Tubus, feuchte Tupfer, Augenschutz) angewendet. Käme es dazu, könnte dies schwere Verbrennungen der Atemwege verursachen und eine längere intensivmedizinische Behandlung sowie eine Tracheotomie erforderlich machen.
- **Verletzung von Mund, Zunge, Lippen oder Rachen** — Kleine Verletzungen durch die Instrumente heilen meist von selbst; sehr selten muss genäht werden. Äußerst selten kann ein Einriss der Rachenwand dazu führen, dass Luft unter die Haut des Halses austritt (knisterndes Gefühl), oder eine Infektion am Hals verursachen; dies kann eine Überwachung im Krankenhaus, Antibiotika über die Vene und selten eine Operation erforderlich machen.
- **Probleme der Halswirbelsäule** — Da der Kopf nach hinten geneigt gelagert wird, können – besonders bei Menschen mit Erkrankungen der Halswirbelsäule – Nackenschmerzen und sehr selten ernstere Wirbelsäulenprobleme auftreten. Bitte teilen Sie uns einen früheren Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule oder eine Operation an der Halswirbelsäule mit.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Atemnot** oder ein pfeifendes bzw. raues Geräusch beim Einatmen (Stridor)
- **Abhusten oder Erbrechen von Blut** oder blutig tingierter Schleim, der zunimmt statt abnimmt
- **Unfähigkeit zu schlucken** oder so starke Schmerzen oder Schwellung, dass Sie Ihren Speichel nicht schlucken können
- **Fieber über 38,5 °C** mit immer stärker werdenden Halsschmerzen
- Schwellung an Hals oder Gesicht oder ein knisterndes Gefühl unter der Haut

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Halten Sie die empfohlene **Stimmruhe** strikt ein; auch Flüstern belastet die Stimmlippen. Sie können sich schriftlich oder mit Apps auf dem Telefon verständigen.
- Trinken Sie reichlich Wasser und sorgen Sie für eine feuchte Raumluft. Vermeiden Sie Räuspern und Husten so weit wie möglich.
- Meiden Sie das Rauchen und Zigarettenrauch; Rauchen beeinträchtigt die Heilung und erhöht das Risiko, dass der Befund wiederkehrt.
- Wurden Ihnen Refluxmedikamente verordnet, nehmen Sie diese über den empfohlenen Zeitraum ein; essen Sie in den 2–3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts und schränken Sie scharfe und saure Speisen ein.
- Flugreisen sind in der Regel ab dem folgenden Tag unbedenklich; halten Sie während der Reise weiterhin Stimmruhe ein.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.
- ☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.
- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich habe verstanden, dass der Eingriff abgebrochen werden kann, wenn sich während der Operation zeigt, dass der Kehlkopf nicht sicher erreicht werden kann, und dass je nach feingeweblichem Befund des entfernten Gewebes eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein kann.
- ☐ Ich habe verstanden, dass die endgültige Stimme auch davon abhängt, dass ich nach der Operation Stimmruhe, Stimmtherapie, Rauchstopp und Refluxbehandlung einhalte.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

- ☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.
- ☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.