Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Traitement par toxine botulique (Botox)

Traitement par injection des rides d'expression, de l'hypertrophie du muscle de la mâchoire (masséter) ou de la transpiration excessive

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Lieu de réalisation de l'acte : _____

Nom du produit / marque : _____

Numéro de LOT et date de péremption : _____

Nombre total d'unités et dilution : _____

Zones traitées :
☐ Front ☐ Rides du lion ☐ Pattes d'oie
☐ Masséter (muscle de la mâchoire) ☐ Cou
☐ Transpiration (aisselles / mains) ☐ Autre _____

Objectif du traitement :
☐ Esthétique ☐ Médical (bruxisme, transpiration, etc.) _____

Zone(s) traitée(s) hors indication approuvée :
☐ Aucune ☐ Oui — zone : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

La toxine botulique est une protéine purifiée qui diminue temporairement la liaison entre le muscle injecté et son nerf, de sorte que le muscle se contracte moins fortement. À visée esthétique, elle est utilisée pour adoucir les **rides d'expression** du front, de l'espace entre les sourcils et du contour des yeux. Elle est également utilisée comme traitement médical du grincement des dents (bruxisme) et de l'hypertrophie du muscle de la mâchoire (masséter), des cordes du cou et de la **transpiration excessive** (hyperhidrose).

Les rides d'expression se forment au fil des années, à mesure que les mêmes muscles se contractent encore et encore et que la peau perd de son élasticité. L'effet est **temporaire** : le muscle retrouve progressivement sa fonction et, si le traitement n'est pas renouvelé, l'aspect revient lentement à son état antérieur. L'objectif est un aspect **naturel et reposé**, sans figer les expressions de votre visage.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

Le traitement est réalisé au cabinet, après un bref entretien et un examen. Les mouvements de votre visage sont évalués, les points d'injection sont marqués et, si nécessaire, des photographies sont prises avant le traitement.

1. **Préparation :** le maquillage est retiré et la peau est nettoyée avec une solution antiseptique. Si vous êtes sensible à la douleur, de la glace ou une crème anesthésiante peuvent être appliquées.
2. **Injection :** une petite quantité de produit est injectée à l'aide d'une aiguille très fine dans les points marqués. Chaque injection dure quelques secondes ; vous ressentirez une légère piqûre ou une sensation de brûlure.
3. **Fin du soin :** une légère pression est exercée sur les points d'injection. Les petites papules disparaissent en quelques minutes.
4. **Traçabilité :** le nom du produit, le numéro de LOT, le nombre total d'unités et les zones traitées sont consignés dans votre dossier.

Certaines zones et indications de traitement peuvent ne pas figurer dans la notice d'utilisation approuvée du produit en Türkiye (**utilisation hors indication approuvée, ou « off-label »**) ; par exemple, le traitement du masséter (muscle de la mâchoire) et du bruxisme, du cou et de la transpiration des paumes ne fait pas partie des indications approuvées de nombreux produits. Bien que ce type d'utilisation soit répandu et reconnu dans la littérature médicale, votre médecin vous expliquera séparément si la zone prévue pour vous entre dans cette catégorie, et cela sera consigné dans le champ correspondant de ce formulaire.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Généralement inutile ; glace ou crème anesthésiante sur demande	Environ 10–20 minutes	Le jour même ; 15–30 minutes de surveillance après le traitement

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Adoucissement des rides d'expression du front, de l'espace entre les sourcils et du contour des yeux, pour un aspect plus reposé
- Avec le traitement du masséter, diminution des symptômes du bruxisme et affinement de l'ovale de la mâchoire
- Avec le traitement de la transpiration, diminution nette de la transpiration
- Un geste court, sans incision chirurgicale, après lequel vous pouvez reprendre immédiatement vos activités quotidiennes

L'effet commence généralement en **3–14 jours**, atteint son maximum vers 2 semaines et dure en moyenne **3–4 mois** dans les zones d'expression (il peut durer plus longtemps pour le traitement de la transpiration et du masséter). L'intensité et la durée de l'effet varient d'une personne à l'autre. Des rides très profondes et installées peuvent ne pas disparaître complètement. Si nécessaire, un contrôle est organisé vers 2 semaines et, lorsque votre médecin le juge approprié, une petite injection complémentaire (retouche) peut être réalisée.

4 Autres options thérapeutiques

- **Absence de traitement :** s'agissant d'une intervention esthétique, vous avez toujours la possibilité de ne pas la réaliser.
- **Produits de comblement (fillers) :** peuvent être plus adaptés aux rides dues à une perte de volume plutôt qu'au mouvement.
- **Soins de la peau et techniques de rajeunissement cutané :** les crèmes aux rétinoïdes, les peelings chimiques, le laser ou la mésothérapie peuvent améliorer la qualité de la peau, mais ne diminuent pas le mouvement des muscles du visage.
- **Chirurgie :** des interventions telles qu'un lifting des sourcils ou un lifting du visage peuvent offrir une solution plus durable en cas de relâchement.
- **Pour les indications médicales :** une gouttière de nuit pour le bruxisme ; des antitranspirants et des médicaments pour la transpiration.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si le traitement n'est pas réalisé, votre aspect actuel ou vos symptômes suivront leur évolution naturelle. Les rides d'expression peuvent devenir progressivement plus visibles avec l'âge ; cela ne représente pas de danger pour votre santé.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Le traitement **n'est pas réalisé, ou est reporté,** dans les situations suivantes : grossesse, allaitement, maladies neuromusculaires telles que la **myasthénie (myasthenia gravis)**, la SLA ou le syndrome de Lambert-Eaton, infection active dans la zone à traiter, allergie connue au produit ou, pour certains produits, allergie aux protéines de lait de vache. Veuillez nous signaler si l'une de ces situations vous concerne.
- Les **antibiotiques de la famille des aminosides** (par ex. la gentamicine) et certains myorelaxants peuvent augmenter l'effet de la toxine botulique ; veuillez nous signaler si vous en prenez.
- Si vous avez déjà reçu de la toxine botulique, indiquez-nous quand, avec quel produit et quel en a été le résultat.
- Pour réduire le risque d'ecchymoses, si possible et après en avoir parlé avec votre médecin, interrompez l'aspirine et les médicaments similaires quelques jours avant le traitement.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

4 premières heures	Ne vous allongez pas et ne massez ni n'appuyez sur la zone traitée. Cela aide le produit à rester là où il a été injecté. Une légère rougeur et de petites papules peuvent être observées aux points d'injection.
Premier jour	Évitez le sport intense, le sauna, le hammam, les cabines de bronzage (UV) et les environnements très chauds. Le maquillage peut être appliqué après quelques heures. De légers maux de tête peuvent survenir ; ils passent avec des antalgiques simples.
Jours 3–14	L'effet s'installe progressivement. **Si** de petites ecchymoses apparaissent aux points d'injection, elles s'estompent en une semaine. Ne faites pas de soins du visage, de soins de la peau ni de massage du visage pendant cette période.
2e semaine	L'effet atteint son maximum. Un contrôle est organisé si nécessaire ; en cas d'asymétrie ou d'effet insuffisant, une petite injection complémentaire peut être prévue après évaluation par le médecin.
3e–4e mois et au-delà	L'effet diminue progressivement. Un intervalle d'au moins 3 mois entre deux traitements est généralement recommandé.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Légère douleur, rougeur et petites papules aux points d'injection (disparaissent en quelques minutes à quelques heures)
- Petites ecchymoses ; **si** des ecchymoses apparaissent, elles s'estompent en quelques jours à une semaine
- Légère sensation de lourdeur ou de tension du front (1–2 premières semaines)

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Maux de tête** — En particulier après un premier traitement, environ **1–10 patients sur 100** ont de légers maux de tête au cours des premiers jours ; ils disparaissent généralement en quelques jours.
- **Légère asymétrie ou effet insuffisant** — La force musculaire variant d'une personne à l'autre, de petites différences entre les deux côtés peuvent persister ou l'effet peut être moindre que prévu. Cela est évalué lors du contrôle à 2 semaines.
- **Queue du sourcil trop relevée (« sourcil de Spock »)** — Après un traitement du front, l'extrémité externe du sourcil peut se relever exagérément ; cela se corrige généralement par une petite injection complémentaire.

Situations peu fréquentes

- **Chute de la paupière supérieure (ptosis)** — Après un traitement de l'espace entre les sourcils ou du front, environ **1–5 patients sur 100** peuvent présenter une légère chute d'une paupière supérieure. Elle est **temporaire** et disparaît généralement en 2–6 semaines. Pendant cette période, des gouttes oculaires qui relèvent temporairement la paupière et améliorent son aspect peuvent être prescrites.
- **Chute du sourcil et lourdeur du front** — Due à un relâchement excessif du muscle frontal ; s'améliore à mesure que l'effet s'estompe (quelques semaines à quelques mois).
- **Sourire asymétrique, faiblesse des mouvements des lèvres, écoulement de salive** — Peuvent survenir lors du traitement du bas du visage et du masséter si le produit agit sur les muscles voisins ; temporaires, mais peuvent durer de plusieurs semaines à quelques mois.
- **Sécheresse oculaire, larmoiement ou vision double** — Peu fréquents lors du traitement du contour des yeux ; temporaires. Prévenez votre médecin si vous avez une vision double.
- **Difficulté à avaler, faiblesse du cou** — Peuvent survenir lors du traitement du cou ; généralement légères et temporaires.
- **Diminution de la force de mastication, joues d'aspect creusé** — Après un traitement du masséter, mastiquer des aliments durs peut être fatigant pendant un certain temps ; très rarement, la joue peut paraître légèrement creusée ou le sourire irrégulier.
- **Faiblesse de la main après traitement des paumes** — Après des injections dans les paumes pour la transpiration, la force de préhension des doigts peut être temporairement diminuée, et les injections elles-mêmes peuvent être assez douloureuses. La faiblesse disparaît généralement en quelques semaines.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Diffusion de l'effet à distance** — Très rarement, en particulier à fortes doses, l'effet du produit peut s'étendre au-delà de la zone traitée et provoquer une faiblesse musculaire générale, des troubles de la vision ou des **difficultés à parler, à avaler ou à respirer**. Cette situation nécessite un **traitement en urgence** ; une hospitalisation et une assistance respiratoire peuvent être nécessaires. Aux doses utilisées en esthétique, cela est extrêmement rare.
- **Réaction allergique grave** — Une réaction allergique sévère (anaphylaxie) avec urticaire, gonflement du visage et des lèvres ou essoufflement est extrêmement rare ; elle nécessite un traitement en urgence.
- **Perte d'efficacité (formation d'anticorps)** — Très rarement, l'organisme fabrique des anticorps contre le produit et les traitements ultérieurs peuvent ne plus agir. Des traitements fréquents et à fortes doses augmentent ce risque.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Malaise (réaction vasovagale) :** Des vertiges, des sueurs et un bref évanouissement peuvent survenir pendant une injection ou une prise de sang ; ils passent rapidement en position allongée.
- **Infection :** Grâce à la désinfection de la peau et au matériel stérile, le risque est très faible ; si elle survient, elle est généralement traitée par antibiotiques.
- **Réaction allergique :** Au produit, à l'anesthésique local ou à l'antiseptique utilisé — allant d'une légère rougeur à, très rarement, une réaction allergique grave (anaphylaxie). Notre cabinet dispose du matériel et des médicaments d'urgence.
- **Réactivation d'un bouton de fièvre (herpès) :** Si vous avez déjà eu des boutons de fièvre, ils peuvent réapparaître dans la zone traitée ; merci de nous le signaler.
- **Résultat ne répondant pas aux attentes :** L'intensité et la durée de l'effet varient d'une personne à l'autre ; des séances supplémentaires ou une retouche peuvent être nécessaires.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Difficulté à avaler, à parler ou à respirer**, ou faiblesse musculaire marquée
- **Vision floue ou double**, ou impossibilité totale d'ouvrir une paupière
- Gonflement d'apparition rapide du visage, des lèvres ou de la langue, urticaire ou essoufflement (réaction allergique)
- Douleur, rougeur, chaleur croissantes ou écoulement de pus au niveau de la zone traitée

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Ne vous allongez pas et ne massez pas la zone pendant les 4 premières heures ; évitez le sport intense, le sauna et le hammam le premier jour.
- Tant que l'effet persiste, si vous devez recevoir de la toxine botulique, un massage du visage ou des soins de la peau chez un autre médecin, informez-le de ce traitement.
- Si vous envisagez une grossesse pendant la période de traitement, parlez-en à votre médecin.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).

☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.

☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

12 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

13 Déclaration du patient

☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.

☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.

☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ J'ai été interrogé(e) sur les situations qui contre-indiqueraient le traitement (grossesse, allaitement, maladies neuromusculaires, médicaments) et j'ai donné des informations exactes.
- ☐ Je comprends que l'effet de la toxine botulique est temporaire et que le traitement doit être renouvelé à intervalles réguliers pour être maintenu. Il m'a été expliqué que certaines zones de traitement peuvent se situer en dehors des indications approuvées dans la notice d'utilisation du produit.
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

14 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.